

模拟试卷

第一单元

1. RPI 卡环采用近中殆支托的主要作用是

- A. 美观
- B. 增强固位
- C. 防止食物嵌塞
- D. 减少基牙所受扭力
- E. 降低患龋率

2. 可摘局部义齿铸造基托厚度约为

- A. 0.5 mm
- B. 1.0 mm
- C. 1.5 mm
- D. 2.0 mm
- E. 2.5 mm

3. 可摘局部义齿基托边缘应位于天然牙轴面的

- A. 殆缘
- B. 非倒凹区
- C. 外形高点线
- D. 倒凹区
- E. 颈缘

4. 用来确定垂直距离的方法是

- A. 卷舌后舔法
- B. 哥特式弓描记法
- C. 息止颌位法
- D. 外耳道触诊法
- E. 颞肌扪诊法

5. 下列可用翼上颌切迹来确定的是

- A. 后牙排列位置
- B. 后牙高度
- C. 义齿咬合平面
- D. 基托后缘位置
- E. 基托边缘厚度

6. 下列关于印模膏的描述, 正确的是

A. 是一种可逆性的弹性材料

B. 导热性较差

C. 流动性和可塑性好

D. 不容易变形

E. 能反映组织的倒凹部分

7. 半解剖式人工牙牙尖斜度约为

- A. 0°
- B. 10°
- C. 20°
- D. 30°
- E. 40°

8. 正中殆时, 全口义齿前牙的排列要求是

- A. 浅覆殆, 浅覆盖, 上下前牙紧密接触
- B. 浅覆殆, 浅覆盖, 上下前牙不接触
- C. 深覆殆, 浅覆盖, 上下前牙不接触
- D. 浅覆殆, 深覆盖, 上下前牙不接触
- E. 深覆殆, 深覆盖, 上下前牙紧密接触

9. 全口义齿下前牙大小选择的参考标准是下唇线(唇低线)至殆平面距离为

- A. 下中切牙切 1/2 的高度
- B. 下中切牙切 1/3 的高度
- C. 下中切牙切 2/3 的高度
- D. 下侧切牙切 1/3 的高度
- E. 下侧切牙切 1/2 的高度

10. 无牙颌牙槽嵴吸收严重时, 人工后牙排列时应

- A. 将非功能尖尽量排在牙槽嵴顶
- B. 将功能尖尽量排在牙槽嵴顶
- C. 将殆力最大处放在牙槽嵴最低处
- D. 将后牙排成反殆关系
- E. 将后牙排成对刃殆关系

11. 下列不常用于控制菌斑的是

- A. 香精油

- B. 氟化亚锡
C. 氟化钠
D. 三氯氢苯醚
E. 氯己定
12. 大多数脱氢酶的辅酶是
A. CoA
B. NAD⁺
C. NADP⁺
D. FADH₂
E. Cyt_c
13. 长期饥饿时糖异生的生理意义之一是
A. 有利于脂酸合成
B. 有利于脂肪合成
C. 有利于必需氨基酸合成
D. 有利于补充血糖
E. 有利于排钠保钾
14. 谷类和豆类食物的营养互补氨基酸是
A. 赖氨酸和谷氨酸
B. 赖氨酸和酪氨酸
C. 赖氨酸和色氨酸
D. 赖氨酸和丙氨酸
E. 赖氨酸和甘氨酸
15. 细胞内含量最丰富的 RNA 是
A. mRNA
B. rRNA
C. tRNA
D. hnRNA
E. miRNA
16. 能够诱导 UDP-葡萄糖醛酸基转移酶合成从而减轻黄疸的药物
A. 阿司匹林
B. 青霉素
C. 磺胺嘧啶
D. 苯巴比妥
E. 氢氯噻嗪
17. 治疗急性肺水肿的首选药是
A. 呋塞米
B. 氨苯蝶啶
C. 乙酰唑胺
D. 氢氯噻嗪
E. 螺内酯
18. 奥美拉唑的临床应用是
A. 消化道功能紊乱
B. 胃肠平滑肌痉挛
C. 萎缩性胃炎
D. 消化性溃疡
E. 慢性腹泻
19. 能诱发“流感综合征”的药物是
A. 利福平
B. 链霉素
C. 哌拉西林
D. 头孢孟多
E. 多黏菌素
20. 明显扩张肾血管并增加尿量的药物是
A. 肾上腺素
B. 阿托品
C. 异丙肾上腺素
D. 多巴胺
E. 去甲肾上腺素
21. 低甜度的糖代用品是
A. 环拉酸盐
B. 果糖
C. 甜菊糖
D. 木糖醇
E. 乳糖
22. 理想的牙刷刷毛特点不包括
A. 无臭无味
B. 容易干燥
C. 吸水性好
D. 回弹力好
E. 容易清洁
23. 牙骨质有不断新生的特性,其功能是
A. 产生新的牙周膜纤维
B. 补偿牙颌面磨损
C. 修复牙周袋
D. 修复受损牙槽骨
E. 稳固松牙
24. 在牙周膜的功能中,属于连接牙和牙

槽骨、调节和缓冲牙受到的各种压力的是

- A. 支持功能
- B. 稳定功能
- C. 营养功能
- D. 感觉功能
- E. 形成功能

25. 成簇的粟粒状淡黄色小颗粒, 即福代斯斑见于

- A. 舌黏膜
- B. 颊黏膜
- C. 软腭黏膜
- D. 牙槽黏膜
- E. 口底黏膜

26. 基底部有垂直于基底面纵纹的细胞是

- A. 浆液性腺泡细胞
- B. 黏液性腺泡细胞
- C. 闰管细胞
- D. 分泌管细胞
- E. 排泄管细胞

27. 牙髓发育完成的标志是

- A. 釉质开始形成
- B. 牙本质开始形成
- C. 根部牙本质开始形成
- D. 原发性牙本质完全形成
- E. 牙乳头周围有牙本质形成

28. 牙本质龋中的坏死灶和裂隙见于

- A. 透明层
- B. 暗层
- C. 脱矿层
- D. 细胞侵入层
- E. 坏死崩解层

29. 根尖周肉芽肿内的上皮多来源于

- A. 缩余釉上皮
- B. 呼吸道上皮
- C. 口腔黏膜上皮
- D. 牙板上皮
- E. Malassez 上皮

30. 慢性牙龈炎的病理变化不包括

- A. 胶原丧失

B. 血管扩张充血

C. 组织水肿

D. 结合上皮向根方增殖

E. 大量炎症细胞浸润

31. 不能用充填方法治疗的牙体缺损是

- A. 后牙骀面洞
- B. 后牙邻骀面洞
- C. 骀面重度磨损
- D. 前牙舌面洞
- E. 楔状缺损

32. 固定修复体采用龈下边缘设计的缺点是

- A. 易导致牙龈炎症
- B. 固位差
- C. 不美观
- D. 边缘强度差
- E. 易形成肩合

33. 下列不属于全冠修复时防止食物嵌塞措施的是

- A. 恢复邻接关系
- B. 骀平面与邻牙一致
- C. 加深颊舌沟
- D. 去除骀接触
- E. 去除对骀充填式牙尖

34. 下列关于邻骀面嵌体鸠尾固位形的说法, 错误的是

- A. 防止修复体的侧向脱位
- B. 增加修复体的固位力
- C. 对预备体的抗力有影响
- D. 鸠尾峡的宽度约为骀面宽度的 1/4
- E. 鸠尾峡尽量位于骀面牙尖三角嵴之间

35. 下列属于第三类根分叉受累的是

- A. 根分叉水平方向不穿通, 可探入 0.5 mm
- B. 根分叉水平方向不穿通, 可探入 1 mm
- C. 根分叉水平方向不穿通, 可探入 1.5 mm
- D. 根分叉水平方向穿通, 只能用器械穿透
- E. 根分叉水平方向穿通, 可凭肉眼感知

36. 下列关于铸造合金的描述, 正确的是

- A. 高熔合金的熔点在 1 200 °C 以上

- B.金合金的抗腐蚀性能比钴合金优良
 C.金合金的熔点为 950 ℃ ~1 050 ℃
 D.铜基合金含 50%的铜和 20%的银
 E.不锈钢的布氏硬度略高于釉质的硬度
- 37.引起全冠翘动的原因不包括
 A.邻接过紧
 B.组织面有支点
 C.轴壁聚合度大
 D.组织面有金属瘤
 E.石膏代型受损
- 38.修复体黏固前牙体组织消毒常用的消毒剂是
 A.甲醛甲酚
 B.樟脑酚
 C.木溜油
 D.碘伏
 E.75%酒精
- 39.下列关于金属嵌体的牙体预备,描述正确的是
 A.洞壁有倒凹利于固位
 B.洞缘有斜面利于就位
 C.可余留少量腐质防止穿髓
 D.颊舌壁向殆面外展 2~5°
 E.殆面洞深 0.5~1 mm
- 40.暂时冠常用的黏固剂是
 A.磷酸锌黏固剂
 B.硅酸乙酯黏固剂
 C.氧化锌丁香油黏固剂
 D.玻璃离子黏固剂
 E.树脂黏固剂
- 41.下列情况中最直接导致牙列缺损的是
 A.拔出阻生智牙
 B.恒牙萌出导致乳牙脱落
 C.牙齿的增龄性变化
 D.外伤导致的根折
 E.深髓进展至慢性牙髓炎
- 42.固定桥基牙为活髓牙时,黏固后最可能出现的情况是
 A.短期内出现咬合痛
 B.较长时间后出现咬合痛
 C.牙髓炎症
 D.冷热敏感
 E.黏膜炎症
- 43.能否采用固定义齿修复牙列缺损主要取决于
 A.基牙的咬合力
 B.基牙的牙周膜储备力
 C.生育牙槽嵴高度
 D.患者的美观要求
 E.患者的舒适度
- 44.固定桥修复缺牙时,对基牙条件的要求不包括
 A.牙冠殆龈高度适当
 B.牙根粗壮并有足够的长度
 C.活髓牙去髓治疗
 D.牙周组织健康
 E.位置基本正常
- 45.下列有关固定义齿修复的描述中,正确的是
 A.固位体以焊接的方式与基牙相连接
 B.殆力通过连接体和固位体传递到基牙
 C.粘接固定桥的牙体预备量较多
 D.桥体的形态和强度应与天然牙一致
 E.复合固定桥的基牙所承受的殆力比较均匀
- 46.下列属于复合固定桥设计要求的是
 A.缺牙区牙槽嵴高度正常时一般采用悬空式桥体
 B.盖嵴式桥体的颊侧呈三角形开放
 C.鞍式桥体与黏膜接触范围较小
 D.船底式桥体容易清洁
 E.前牙区主要采用船底式桥
- 47.固定桥殆面设计时应该
 A.增大牙尖斜度
 B.减少食物排溢道
 C.减少殆面宽度
 D.建立侧方平衡殆
 E.增大牙尖高度
- 48.下列牙列缺损属于 Kennedy 分类第一类的是

A. 54|6 缺失

B. 78 缺失

C. 12 缺失

D. 876|178 缺失

E. 61|1678 缺失

49.关于牙列缺损 Kennedy 分类的叙述,正确的是

A.第一类是单侧远中游离端缺牙

B.第二类是单侧缺隙前后都有基牙

C.第三类为牙弓前部不越过中线的连续缺牙

D.第四类为越过中线的前部单个缺牙间隙

E.第二磨牙缺失后即使不修复也应纳入分类

50.可摘局部义齿的组成不包括

A.人工牙

B.基托

C.连接体

D.固位体

E.桥体

51.正常乳牙在口腔内存在的最长时间可达

A.1~2 年

B.5~6 年

C.10~11 年

D.13~14 年

E.18 年以上

52.下述上颌尖牙牙冠形态描述中,不正确的是

A.近中缘长,远中缘短

B.远中牙尖嵴大于近中牙尖嵴

C.邻面观远中面比近中面小

D.两条牙尖嵴相交成锐角

E.舌窝被舌轴嵴分成较小的近中舌窝和较大的远中窝

53.近中面有近中沟的牙是

A.上颌中切牙

B.上颌尖牙

C.上颌第一前磨牙

D.上颌第一磨牙

E.上颌第二磨牙

54.下述髓腔形态生理和病理变化中,错误的是

A.髓腔体积随年龄增长而不断缩小

B.乳牙髓腔比恒牙的相对大

C.青少年恒牙的髓腔比老年大

D.随着磨耗,髓室顶、髓角、髓室底均不断降低

E.外伤、牙髓病的刺激,使髓腔缩小加快

55.翼腭管的构成是

A.上颌体后面、蝶骨翼突和腭骨垂直部

B.上颌骨腭突、蝶骨翼突和颞骨鳞部

C.上颌骨腭突、腭骨垂直部和颞骨鳞部

D.上颌骨内面、蝶骨翼突和腭骨垂直部

E.上颌骨内面、蝶骨翼突和颞骨鳞部

56.下列为硬腭表面标志的是

A.腭中缝、蝶骨翼突钩、腭凹

B.腭大孔、蝶骨翼突钩、腭咽弓

C.腭乳头、腭大孔、蝶骨翼突钩

D.腭乳头、腭大孔、腭凹

E.腭中缝、腭大孔、腭咽弓

57.下颌的功能运动是指

A.边缘运动

B.叩齿运动

C.开闭口运动

D.铰链运动

E.咀嚼运动

58.正常成人每天的唾液分泌量是

A.600~850 mL

B.900~1 000 mL

C.1 000~1 500 mL

D.1 600~1 800 mL

E.2 000~2 500 mL

59. WHO 评价龋病流行程度的指定年龄是

A.10 岁

B.12 岁

C.14 岁

D.16 岁

- E.18岁
- 60.随机抽取的样本未接受检查导致的偏倚是
- 无应答偏倚
 - 信息偏倚
 - 选择性偏倚
 - 回忆偏倚
 - 测量偏倚
- 61.确定口腔流行病学调查样本含量的依据是
- 分组情况
 - 患病率大小
 - 能否双盲
 - 干预试验因素
 - 受教育程度
- 62.龋均是指受检人群中平均每人
- 患龋的牙数
 - 患龋的牙面数
 - 患龋、失、补的牙数
 - 患龋、失、补的牙面数
 - 因龋丧失的牙数
- 63.关于氟在人体的分布,叙述正确的是
- 菌斑中含氟量与全唾液中的一致
 - 釉质中的氟主要聚集在釉质表层
 - 釉质的含氟量随着年龄增长而降低
 - 唾液中的氟浓度与血浆氟浓度相同
 - 乳牙釉质和恒牙釉质的含氟量一致
- 64.社区口腔卫生服务的任务包括
- 坚持政府领导部门协同
 - 坚持低成本广覆盖
 - 提高专业人员素质
 - 提供基本口腔卫生服务
 - 营造团结和谐社区
- 65.属于全身应有氟化物防龋的措施是
- 饮水氟化
 - 使用含氟牙膏
 - 使用氟化泡沫
 - 使用含氟涂料
 - 使用含氟凝胶
- 66.地方性氟中毒的氟来源不包括
- 燃煤污染
 - 饮水污染
 - 工业污染
 - 粮食污染
 - 蔬菜污染
- 67.口腔健康教育常用方法不包括
- 问卷调查
 - 小型讨论会
 - 大众传媒
 - 个别交谈
 - 社区活动
- 68.口腔健康促进的领域中沒有
- 制定健康的公共政策
 - 创建支持性环境
 - 强化社区行动
 - 调整卫生服务方向
 - 制定口腔保健项目预算
- 69.最有效的牙科消毒灭菌方法是
- 浸泡消毒法
 - 表面消毒法
 - 紫外线灭菌法
 - 预真空高温高压灭菌法
 - 干热灭菌法
- 70.通常情况下,孕妇治疗口腔疾病的适宜时间是
- 妊娠1个月内
 - 妊娠2~3个月
 - 妊娠4~6个月
 - 妊娠7~8个月
 - 妊娠9~10个月
- 71.主要通过增加动作电位时程,选择性延长复极的药物是
- 腺苷
 - 美西律
 - 胺碘酮
 - 利多卡因
 - 美托洛尔
- 72.肝素的临床适应证不包括
- 血栓栓塞性疾病
 - 弥散性血管内凝血

- C.防治心肌梗死
D.心搏骤停
E.体外抗凝
- 73.医学心理学的基本观点不包括
A.认知评价的观点
B.情绪因素作用的观点
C.主动适应与调节的观点
D.遗传决定论的观点
E.个性特征作用的观点
- 74.心理健康的标准不包括
A.智力正常
B.情绪正常
C.人际和谐
D.适应环境
E.人格完美
- 75.有些人在面对应激事件时易采取“钻牛角尖”的方式应对,这种应对方式属于
A.自我防御反应
B.生理反应
C.认知反应
D.行为反应
E.情绪反应
- 76.有些人在工作中认真负责,有些人敷衍了事,有些人得过且过。这些人在人的性格特征中属于
A.意志特征
B.情绪特征
C.理智特征
D.态度特征
E.认知特征
- 77.义务人员与患者沟通时,适宜的方式是
A.回避目光
B.加快语速
C.多用术语
D.注意倾听
E.多用自我表露
- 78.医学伦理学属于
A.元伦理学
B.描述伦理学
C.规范伦理学
D.生态伦理学
E.境遇伦理学
- 79.对甲类传染病患者实施强制措施时,应对遵循的公共卫生伦理原则是
A.以患者为中心原则
B.全社会参与原则
C.信息公开原则
D.社会公正原则
E.互助协同原则
- 80.按照甲类传染病管理的乙类传染病是
A.脊髓灰质炎
B.艾滋病
C.肺炭疽
D.猩红热
E.登革热
- 81.医疗机构发现可能与用药有关的严重不良反应。有权接受其报告的单位是
A.疾病预防控制机构和卫生监督机构
B.药品检验机构和疾病预防控制机构
C.药品生产主管部门和药品经营主管部门
D.药品监督管理部门和卫生计生行政部门
E.卫生监督机构和卫生计生行政部门
- 82.公民临床用血时交付的与用血有关的费用不包括
A.血液采集费
B.献血员补偿费
C.血液储存费
D.血液分类费
E.血液检验费
- 83.医务人员就医疗行为进行说明的首选对象是
A.患者本人
B.患者朋友
C.患者所在单位领导
D.患者亲属
E.患者同事
- 84.医疗机构应当对无正当理由开具抗菌

药物超常处方达到一定次数的医师提出警告。应当予以警告的最低次数是

- A.2 次
- B.3 次
- C.4 次
- D.5 次
- E.6 次

85.女,55岁。左上颌第一磨牙因牙周炎拔除是,需麻醉的神经有

- A.腭前神经,腭中神经,上牙槽后神经
- B.腭前神经,腭中神经,上牙槽中神经
- C.腭后神经,上牙槽后神经,上牙槽中神经
- D.腭前神经,上牙槽中神经,上牙槽后神经
- E.腭后神经,腭中神经,上牙槽后神经

86.男,62岁。腮腺浅叶良性肿瘤,手术中在腮腺浅叶上缘从后向前需注意分离的神经血管有

- A.颞浅静脉、耳颞神经、面神经颞支、面神经颞支及颞支
- B.耳颞神经、颞浅静脉、面神经颞支、面神经颞支及上颊支
- C.耳颞神经、颞浅动脉、颞浅静脉、面神经颞支及颞支
- D.颞浅静脉、颞浅动脉、耳颞神经、面神经颞支及颞支
- E.颞浅动脉、颞浅静脉、面神经颞支、面神经颞支及上颊支

87.男,35岁。因刷牙时牙龈出血就诊。检查:牙龈颜色发红。龈袋深2mm,舌侧有龈下结石,探诊后出血。该患者的CPI指数计分为

- A.0
- B.1
- C.2
- D.3
- E.4

88.男,10岁。6|窝沟浅龋,颊、腭沟釉质呈白垩色,对6|最适宜的防治措施是

- A.窝沟封闭
- B.填充治疗
- C.预防性树脂填充
- D.涂再矿化液
- E.局部用氟

89.男,65岁。到口腔科就诊并咨询如何保护牙。检查发现该患者牙间隙较宽,牙稀疏、牙根暴露。据此,医师建议最好的保护方法是

- A.清水漱口
- B.镶牙
- C.使用牙间隙刷、牙线
- D.牙龈按摩
- E.叩齿

90.男,32岁。口腔科医生。体检时发现乙肝病毒表面抗原呈阳性,考虑该医生在工作过程中感染乙肝病毒的最主要的危险途径是

- A.使用高速手机治疗时未戴口罩
- B.使用高速手机治疗时未戴防护镜
- C.曾被污染器械刺伤手指
- D.治疗过程中未戴一次性帽子
- E.与患者近距离交谈

91.某工厂医务室对全厂职工进行了口腔健康检查和口腔问卷调查。确定口腔癌的重点防护的高危人群不包括

- A.40岁以上,长期吸烟者
- B.复发性口腔溃疡者
- C.口腔白斑患者
- D.每天吸烟在20支以上者
- E.同时又吸烟和饮酒习惯者

92.男,40岁。诉后牙咀嚼不适。检查见6|颊侧黏膜有瘻管。X线片示6|根尖不规则投射区,边界不清。镜下见根尖部炎性肉芽组织,中央细胞坏死液化,临近牙骨质有吸收。应诊断为

- A.急性根尖周炎
- B.慢性根尖周脓肿
- C.根尖周肉芽肿
- D.根尖周囊肿
- E.慢性牙髓炎

93.女,50岁。下唇红深红色斑块,表面溃烂、充血、结痂,周围有白色放射状条纹。镜下见上皮变薄,表层过度角化,上皮钉突增生、伸长,基底细胞液化变性,固有层及黏膜下层有淋巴细胞浸润,毛细血管扩张。病理诊断为

- A.白斑
- B.红斑
- C.天疱疮
- D.扁平苔藓
- E.慢性盘状红斑狼疮

94.男,69岁。 $\overline{7}$ 殆面近远中向隐裂且累计牙髓,临床牙冠较短,咬合紧。X线片显示根管充填完善。该病例最适合的修复体设计是

- A.邻殆金属嵌体
- B.邻殆瓷嵌体
- C.铸造金属全冠
- D.金属烤瓷全冠
- E.塑料全冠

95.女,35岁。 $\overline{1}$ 外伤后冠折露髓,断面均在龈上2mm左右,牙龈红肿,探诊易出血。修复开始前要做的准备工作不包括

- A.牙周洁治
- B.拍根尖片
- C.咬合检查
- D.根管治疗
- E.牙冠延长术

96.男,54岁。 $\overline{6}$ 银汞合金充填后,要求全冠修复,修复前不必要检查

- A.边缘是否有微漏
- B.缺损大小
- C.邻面接触点
- D.咬合情况
- E.牙髓活力

97.男,30岁。 $\overline{1}$ 冠折,断面齐龈,咬合紧,X线片示根管治疗完善。适宜的桩核修复方式为

- A.树脂桩加树脂核
- B.1.2mm金属预成桩树脂核
- C.0.9mm金属预成桩树脂核
- D.金属铸造桩核

E.分体金属桩加树脂核

98.男,30岁。 $\overline{7}^{\text{MOD}}$ 大面积缺损,颊舌壁薄,临床冠高度为3mm,咬合紧,X线片示根管治疗完善。最佳的修复方式是

- A.嵌体
- B.3/4冠
- C.金属全冠
- D.金属烤瓷全冠
- E.桩核金属全冠

99.男,50岁。 $\overline{54}$ 缺失, $\overline{6}$ 近中倾斜约为 20° ,余留牙健康。以 $\overline{3}$ 和 $\overline{6}$ 为基牙行固定义齿修复时,应考虑

- A.设计单端固定桥
- B.设计活动连接体
- C.采用复合固定桥
- D.增加基牙数目
- E.加强固位力

100.男,42岁。2年前因 $\overline{654}$ 缺失,行 $\overline{7-3}$ 固定义齿修复。现 $\overline{3}$ 基牙松动。基牙松动的原因最可能是

- A.设计不当
- B.殆力不平衡
- C.基牙预备不当
- D.固位力不平衡
- E.患者使用方法不当

101.男,59岁。 $\overline{8654321|124568}$ 缺失, $\overline{7|7}$ 近中舌向倾斜。可摘局部义齿修复时, $\overline{7|7}$ 上应选择放置的卡环是

- A.三臂卡环
- B.圈形卡环
- C.对半卡环
- D.联合卡环
- E.杆形卡环

102.男,59岁。 $\overline{87654}$ 缺失, $\overline{4567}$ 舌侧倒凹大,采用倒凹法确定可摘局部义齿共同就位时,模型应倾斜的方向为

- A.向前
- B.向后
- C.向左
- D.向右

- E.不倾斜
- 103.女,75岁。全口义齿初戴1周,后牙咀嚼时义齿松动易脱落。最可能的原因是
- A.初戴不合适
B.义基托边缘长
C.义齿基托边缘短
D.存在咬合干扰
E.垂直距离过低
- 104.女,83岁。因牙周病全口牙齿缺失20余年,先后戴用3副义齿。检查:牙槽嵴重度吸收。重新全口义齿修复时,适宜的排牙方案是
- A.选用瓷牙
B.减去第一前磨牙
C.减去第一磨牙
D.减去第一、二磨牙
E.前后牙均排反殆
- 105.某年夏季,某农户自家种植的蔬菜因天气干旱长势不好,所以采摘后腌制成咸菜。次日该农户大量食用咸菜约30分钟后,出现头晕、头痛、恶心、呕吐,口唇、耳郭、指甲和皮肤发绀,其可能的原因是
- A.蔬菜被残留的高毒农药污染
B.蔬菜被肠道致病菌污染
C.蔬菜被空气飘尘的铅污染
D.蔬菜中亚硝酸盐含量过高
E.用工业废水浇灌了蔬菜
- 106.女,18岁,某大学一年级学生。入学后对新的学习环境和教学模式不适应,出现情绪焦虑、失眠等情况。该生的辅导员、老师及同志们给予热情的帮助、疏导和安慰,使该生逐渐走出适应不良的状态。这种应对应激的方法属于
- A.回避应激源
B.运用自我防御机制
C.催眠心理治疗
D.取得社会支持
E.专业思想教育
- 107.女,48岁,某乡镇企业负责人。5个月前被确诊为乳腺癌,接受了手术治疗。术后

患者仅休息了2个月,便全身心得投入了工作,同患病前一样从事日常工作,参加各种会议和活动,对于自己的身体的康复情况并不重视,不按要求到医院复查,也不愿再接受任何其他的治疗。该女生角色行为类型属于

- A.角色行为缺如
B.角色行为冲突
C.角色行为减退
D.角色行为强化
E.角色行为异常

108.患者,女,50岁。因子宫肌瘤行全子宫切除术。术中医生发现患者左侧卵巢有病变,在未征得患者及其家属同意的情况下,将左侧卵巢与子宫一并切除。术后患者恢复良好。该案例中。医生违背的临床诊疗伦理原则是

- A.患者至上原则
B.知情同意原则
C.最优化原则
D.保密原则
E.守信原则

109.患者,男,67岁。无子女,与66岁妻子一起生活。CT检查结果为左肺下叶后段胸膜下结节,疑肺癌收入院进一步检查治疗。患者要求若确诊为肺癌,不要告知妻子,自己可以履行手术签字手续。对此,医生首先应尊重的患者权利是

- A.隐私保护权
B.平等医疗权
C.损害索赔权
D.知情同意权
E.医疗监督权

110.某县医院收治了数名高热,伴头痛、鼻塞、流涕、全身酸痛等症状的患者,后被确诊为H7N9流感。为了防止疾病传播,该医院严格按照有关规定立即对患者予以隔离和治疗,同时在规定的时限内向当地卫生计生行政部门进行了报告。该报告规定的时限是

- A.1小时
B.2小时

- C.3 小时
- D.4 小时
- E.5 小时

111.患者郭某因腹主动脉瘤在某市级医院接受手术治疗,术中发生大出血,经抢救无效死亡。某子女要求复印郭某在该院的全部病历资料,而院方只同意复印其中一部分。根据《医疗事故处理条例》规定,郭某子女有权复印的病历资料是

- A.疑难病例讨论记录
- B.会诊意见
- C.上级医师查房记录
- D.手术及麻醉记录单
- E.死亡病历讨论记录

112.蔡某是长期使用麻醉药品的门诊癌症患者。医院为了了解治疗效果和用药安全状况,要求其定期进行复诊。根据相关规定,该患者复诊间隔的最长时限是

- A.2 个月
- B.3 个月
- C.4 个月
- D.5 个月
- E.6 个月

(113~115 题共用题干)

女,18 个月。家长要求口腔检查及咨询如何进行口腔保健。经检查,该患儿已萌出 12 颗乳牙,未见明显龋损,牙龈正常

113.医生建议对该患儿采取的措施不包括

- A.每天清洁牙面
- B.教孩子正确刷牙
- C.减少进甜食
- D.避免喂奶入睡
- E.保持膳食平衡

114.最适合该幼儿防龋的氟化物应选择

- A.氟片
- B.含氟牙膏
- C.含氟漱口水
- D.含氟凝胶
- E.氟滴剂

115.该患儿定期进行口腔检查的适宜间隔时间为

- A.2 个月
- B.4 个月
- C.6 个月
- D.8 个月
- E.10 个月

(116~117 题共用题干)

研究者收集了某地 300 名铅作业工人的尿铅含量数据,经分析发现数据为偏态分布。

116.若要对该数据的集中趋势进行描述,应选择的指标为

- A.算术平均数
- B.几何平均数
- C.中位数
- D.众数
- E.调和均数

117.若要对该数据的离散程度进行描述,应选择的指标为

- A.中位数
- B.极差
- C.标准差
- D.变异系数
- E.四分位数间距

(118~119 题共用题干)

某职业学校在校师生约 3000 人,在过去 1 周内近 200 名在校师生相继出现发热、乏力、食欲不振、尿黄、皮肤巩膜黄染等临床表现,被校医院确诊为甲肝。

118.该病的流行程度为

- A.散发
- B.流行
- C.暴发
- D.大流行
- E.聚集

119.为控制这起甲肝疫情,应采取的主要措施不包括

- A.发现并及时隔离治疗患者
- B.开展甲型肝炎的健康教育
- C.药物预防

D.粪便无害化处理

E.餐具消毒

(120~121 题共用题干)

我国某地居民 2001~2010 年某种疾病的发病率(1/10 万)如下表:

某地居民 2001~2010 年某疾病的发病率

年度	发病率(1/10 万)
2001	35.12
2002	28.73
2003	17.81
2004	18.22
2005	14.90
2006	11.45
2007	13.98
2008	10.67
2009	7.53
2010	9.32

120.以一年度为一个观察单位,该疾病的发病率的资料类型为

A.定性资料

B.半定量资料

C.计量资料

D.计数资料

E.等级资料

121.欲用统计图描述 10 年间该疾病发病率随时间的变化趋势,宜采用

A.圆图

B.线图

C.条图

D.直方图

E.散点图

(122~123 题共用备选答案)

A.上颌第一前磨牙

B.上颌第二前磨牙

C.上颌第一磨牙

D.下颌第一磨牙

E.下颌第二磨牙

122.具有近中颊根,远中颊根与舌根的牙是

123.可能有近中根、远中颊根、远中舌根的牙是

(124~126 题共用备选答案)

A.Ⅱ度深覆殆

B.Ⅲ度深覆殆

C.锁殆

D.反殆

E.开殆

124.下颌前牙切咬在上颌前牙舌面的颈 1/3,称为

125.牙尖交错殆时,上下前牙甚至前磨牙均不接触,称为

126.牙尖交错殆时,下后牙舌尖咬在上后牙颊尖颊侧

(127~128 题共用备选答案)

A.使用窝沟封闭术

B.控制含糖食品的食用次数

C.采用糖代用品

D.实施学校刷牙指导课程

E.调整自来水含氟浓度

127.属于口腔健康教育的是

128.需要通过立法程序实施的是

(129~131 题共用备选答案)

A.破伤风梭菌

B.结核分枝杆菌

C.HIV

D.乙型肝炎病毒

E.丙型肝炎病毒

129.经空气传播的病因微生物是

130.口腔发生卡波息肉瘤应怀疑感染的病因微生物是

131.在 95℃时 5 分钟才能杀灭的病因微生物是

(132~133 题共用备选答案)

A.疱

B.糜烂

C.溃疡

D.丘疹

E.假膜

132.黏膜上皮有浅层破坏的是

133.黏膜内有液体贮存的是

(134~136 题共用备选答案)

- A. 甲状舌管囊肿
B. 牙瘤
C. 牙源性角化囊性瘤
D. 鳞状细胞癌
E. 黏液表皮样癌
134. 中间细胞见于
135. 混杂的硬组织团见于
136. 大量角化珠形成见于
- A. 鞍式桥体
B. 悬空式桥体
C. 改良盖嵴式桥体
D. 船底式桥体
E. 盖嵴式桥体
- (137~138 题共用备选答案)
137. 龈端呈凹形, 不易清洁的桥体是
138. 食物可通过而不易集聚的桥体是
- (139~142 题共用备选答案)
- A. 颊棚区
B. 颊系带
C. 下颌舌骨嵴
D. 下颌舌骨后窝
E. 远中颊角区
139. 对于下颌无牙颌牙槽嵴低平患者, 为了增强义齿的支持, 应充分利用的是
140. 对于下颌无牙颌压槽嵴低平患者, 为了增强义齿固定, 应充分利用的是
141. 下颌总义齿容易出现舌侧压痛, 基托组织面常需要缓冲的部位是
142. 取下颌印模是, 做咬合运动时为了整塑
- (143~144 题共用备选答案)
- A. 烟酸
B. 尼古丁
C. 苯并芘
D. 烟焦油
E. 一氧化碳
143. 在烟草中, 使人体成瘾的物质是
144. 在烟草烟雾中, 使红细胞失去携氧能力的物质是
- (145~146 题共用备选答案)
- A. ADP
B. FAD
C. UTP
D. NADP+
E. NADPH
145. 相对浓度升高时可加速氧化磷酸化的物质是
146. 直接参与胆固醇生物合成的物质是
- (147~148 题共用备选答案)
- A. 苯妥英钠
B. 地西洋
C. 异丙嗪
D. 乙琥胺
E. 氯丙嗪
147. 治疗脊髓损伤引起肌强直的药物是
148. 治疗顽固性呃逆的药物是
- (149~150 题共用备选答案)
- A. 为人民健康服务
B. 以患者为中心
C. 救死扶伤
D. 人道行医
E. 大医精诚
149. 医疗机构从业人员理想的人格形象是
150. 医疗机构从业人员的职业道德手段是

第二单元

1. X线片显示均为低密度影像的结构是
- 上颌突,下颌孔,上颌结节
 - 鼻孔,下颌管,上颌窦
 - 外斜线,颧骨,鼻腔
 - 关节结节,关节间隙,髁突
 - 内斜线,下颌管,颧骨
2. 曲面体层片用于检查牙周病,其优点不包括
- 检查方便快捷
 - 可以了解牙槽骨吸收类型和程度
 - 可以辨别颊舌侧牙槽骨高度
 - 可以进行治疗前后对比观察
 - 可以辨别近远中牙槽骨高度
3. 牙周病的始动因素为
- 不良修复体
 - 牙菌斑
 - 牙列拥挤
 - 牙石
 - 殆创伤
4. 牙周炎的全身促进因素是
- 冠心病
 - 慢性胃炎
 - 精神压力
 - 饮酒
 - 碳酸饮料
5. 非附着菌斑的优势菌是
- 革兰阳性需氧菌和能动菌
 - 革兰阳性需兼性和能动菌
 - 革兰阳性需兼性和厌氧菌
 - 革兰阳性厌氧菌和能动菌
 - 革兰阴性厌氧菌和能动菌
6. 适用于最后一个磨牙远中楔形瓣缝合的最佳方法是
- 间断缝合
 - 单侧选调缝合
 - 双侧悬吊缝合
 - 褥式缝合
 - 锚式缝合
7. 牙周翻瓣术后最常见的组织愈合方式是
- 长结合上皮愈合
 - 牙龈纤维贴附于根面
 - 附着获得
 - 骨固连
 - 牙周组织再生
8. 关于牙周探诊,叙述不正确的是
- 使用 Nabers 探针检查根分叉病变
 - 探诊时用改良握笔式握持探针
 - 探诊力量约 30~35 g
 - 牙周探针应于牙体长轴平行
 - 探针的粗细及形状影响探诊的治疗
9. 关于氯己定溶液,描述正确的是
- 长期使用无不良反应
 - 易产生耐药菌株
 - 含漱液的浓度为 0.12%~0.2%
 - 其主要作用是减轻口腔异味
 - 是窄谱抗菌药
10. 牙周炎和牙龈炎的主要区别是
- 牙龈增生
 - 牙龈红肿
 - 附着丧失
 - 牙龈坏死
 - 牙龈出血
11. 牙龈炎涉及的牙周组织有
- 边缘龈和附着龈
 - 边缘龈和牙周膜
 - 边缘龈和龈乳头
 - 边缘龈和牙槽骨
 - 边缘龈和牙骨质
12. 慢性复发性腮腺炎的首选辅助检查方

法是

- A. CT
- B. B超
- C. 腮腺造影
- D. 细针吸取活检
- E. 切取活检

13. 属于口腔颌面部肿瘤的内在致病因素的是

- A. 物理因素
- B. 化学因素
- C. 生物因素
- D. 营养因素
- E. 遗传因素

14. 根管预备中器械分离的常见原因不包括

- A. 根管锉质量缺陷
- B. 根分叉过低
- C. 根管细小弯曲
- D. 器械使用不当
- E. 器械疲劳

15. 急性牙髓炎最有效的止痛方法是

- A. 局部麻醉
- B. 适当调骀
- C. 髓腔开放
- D. 摘除牙髓
- E. 服用止痛药

16. 目前临床上常用的牙种植体是

- A. 牙内骨内种植体
- B. 骨内种植体
- C. 骨膜下种植体
- D. 黏膜内种植体
- E. 穿下颌种植体

17. 女, 3岁。牙龈黏膜发红, 起疱伴发热, 流涎3天。检查: 牙龈, 腭黏膜见粟粒大小的密集成片的小溃疡, 部分融合, 黏膜广泛充血水肿。最可能的诊断是

- A. 疱疹性咽峡炎
- B. 疱疹性口炎

C. 手足口病

D. 传染性单核细胞增多症

E. 鹅口疮

18. 男, 12岁。身体健康, 每天坚持刷牙两次, 无特殊口腔治疗史。检查: 可见全口牙齿广泛性脱矿和龋坏。针对该患者, 主要应询问的病史是

- A. 母亲孕期状况
- B. 婴幼儿时期身体状况
- C. 口腔卫生习惯
- D. 特殊的饮食习惯
- E. 乳牙患龋情况

19. 女, 25岁。左上前牙变色2年, 检查: 左上1牙冠变色, 叩痛(-), 牙髓电活力测试无反应。X线片示根尖周5 mm×5 mm透射影, 边界清晰, 有阻射白线围绕。该牙应诊断为

- A. 牙髓坏死
- B. 致密性骨炎
- C. 根尖周肉芽肿
- D. 慢性根尖周脓肿
- E. 根尖周囊肿

20. 男, 16岁。学生。学校体检时发现右下后牙发黑1周。检查: $\overline{6}^0$ 窝沟着色深, 探针可卡入, 探诊不敏感, 叩痛(-), 牙髓温度测试同对照牙。X线片显示右下6颌面透射区位于牙本质浅层。右下6最可能的诊断是

- A. 浅龋
- B. 中龋
- C. 深龋
- D. 急性龋
- E. 隐匿龋

21. 用扭转力为主拔除的牙是

- A. 上颌中切牙
- B. 上颌侧切牙
- C. 上颌尖牙
- D. 下颌切牙

- E. 下颌尖牙
22. 使用根挺拔出断根的关键是
- A. 了解断根的数目
- B. 找好支点
- C. 将根挺插入牙根与牙槽骨板间
- D. 主要使用撬动力
- E. 充分利用挺的轮轴原理
23. 与拔除下颌第三磨牙相关的解剖特点是
- A. 颊侧骨板较薄
- B. 舌侧骨板较厚
- C. 阻生牙常位于下颌支下缘外侧
- D. 阻生牙本身变异较大
- E. 阻生牙以单根最常见
24. 牙槽突修整术的目的不包括
- A. 矫正妨碍义齿戴入和就位的畸形
- B. 去除牙槽突突起的尖和嵴
- C. 防止牙槽突的骨质增生
- D. 去除突出的骨结节和倒凹
- E. 矫正上前牙牙槽突的前突
25. 种植体与骨组织结合的第三阶段中, 种植体周围开始出现
- A. 成骨细胞
- B. 破骨细胞
- C. 巨噬细胞
- D. 吞噬细胞
- E. 胶原纤维
26. 口腔颌面部感染选择抗菌药物的科学依据是
- A. 感染依据
- B. 临床表现
- C. 细菌培养结果
- D. 脓液性状
- E. 脓液涂片检查
27. 下颌智牙冠周炎向磨牙后区扩散可能形成
- A. 咬肌间隙感染
- B. 翼下颌间隙感染
- C. 咽旁间隙感染
- D. 面颊瘻
- E. 下颌第一磨牙前庭脓肿
28. 咬肌间隙感染的来源最不常见于
- A. 下颌智牙冠周炎
- B. 下颌磨牙根尖周病
- C. 牙槽脓肿
- D. 相邻间隙感染
- E. 化脓性腮腺炎
29. 不属于面颊部慢性淋巴结炎特点的是
- A. 慢性增殖性炎症
- B. 无全身症状
- C. 可急性发作
- D. 无痛硬节
- E. 细菌毒力较弱时发生
30. 牙对于口腔颌面部创伤影响的特点不包括
- A. 牙碎块进入邻近组织, 可引起创口感染
- B. 无牙颌区颌骨骨折愈合较晚
- C. 牙的移位导致咬合关系错乱
- D. 治疗牙槽骨骨折时, 可作为基牙缝合结扎固定
- E. 恢复原有咬合关系是骨折良好复位的标准
31. 出血性休克早期表现为轻度烦躁, 口渴, 呼吸浅快, 心率加快, 皮肤苍白, 收缩压未下降, 此时血容量丢失最多不超过
- A. 5%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%
- E. 30%
32. 下列损伤仅为皮肤表层破损的是
- A. 咬伤
- B. 割伤
- C. 刺伤
- D. 挫伤
- E. 擦伤

- 33.可能出现下唇麻木的骨折是
- A.髁突囊内骨折
 - B.单侧髁突颈部骨折
 - C.双侧髁突颈部骨折
 - D.下颌角骨折
 - E.正中联合骨折
- 34.常规颞下颌关节检查不包括
- A.外形与关节动度的检查
 - B.咀嚼肌检查
 - C.穿刺检查
 - D.下颌运动检查
 - E.咬合关系检查
- 35.口腔颌面部整复手术缝合边距,针距分别为
- A.1 mm,2 mm
 - B.1~1.5 mm,2~2.5 mm
 - C.2~3 mm,3~5 mm
 - D.3.5~4 mm,5.5~6 mm
 - E.大于5.0 mm,大于6.0 mm
- 36.污染创口的处理原则是
- A.不主张做初期缝合
 - B.缝合后放置引流条
 - C.每天定时打开敷料观察
 - D.口内缝合5天即可拆除
 - E.一般不需预防性使用抗生素
- 37.局麻药中加入血管收缩剂的作用
- A.镇静
 - B.镇痛
 - C.增强麻醉效果
 - D.减小局麻药用量
 - E.延长局麻时间
- 38.口内法下牙槽神经阻滞麻醉注射点应在
- A.下颌牙咬合面上方1.0 cm
 - B.颊脂垫尖
 - C.磨牙后垫上方1.0 cm
 - D.翼下颌韧带中央稍内侧
 - E.磨牙后窝最深处
- 39.关于口腔颌面部肿瘤切取的描述正确的是
- A.适用于位置深在的肿瘤
 - B.选择局部浸润麻醉
 - C.在肿瘤中心部位取材
 - D.切取组织要有足够深度
 - E.切取尽可能小的组织块
- 40.口腔癌的治疗原则是
- A.手术治疗
 - B.放射治疗
 - C.化学药物治疗
 - D.基因治疗
 - E.手术为主的综合治疗
- 41.慢性复发性腮腺炎腮腺造影的典型表现是
- A.导管扩张呈腊肠状
 - B.分支导管可见充盈缺损
 - C.分支导管造影剂外溢
 - D.末梢导管点状扩张
 - E.分支导管扩张
- 42.诊断涎石病首选的辅助检查方法是
- A.X线平片
 - B.唾液腺造影
 - C.唾液腺内窥镜
 - D.B超
 - E.CT
- 43.舌下腺囊肿的治疗原则是
- A.切除舌下腺
 - B.切除囊壁
 - C.切除舌下腺及囊壁
 - D.抽吸囊液
 - E.加压包扎
- 44.治疗三叉神经痛的首选药物为
- A.苯妥英钠
 - B.卡马西平
 - C.激素类
 - D.神经营养药
 - E.胆碱能神经阻滞剂

45. 对于贝尔面瘫急性期的患者, 不恰当的治疗是

- A. 给予阿司匹林
- B. 给予大剂量激素
- C. 强电刺激促进肌肉运动
- D. 给予维生素 B₁, 维生素 B₁₂
- E. 保护患眼, 给予眼药水

46. 我国新生儿唇腭裂的患病率大约是

- A. 1 : 100
- B. 1 : 1 000
- C. 1 : 10 000
- D. 1 : 100 000
- E. 1 : 1 000 000

47. 腭裂修复术的最佳手术年龄是

- A. 1~2 个月
- B. 3~5 个月
- C. 6~10 个月
- D. 12~18 个月
- E. 24~36 个月

48. 单侧颞下颌关节脱位的临床表现是

- A. 开口型偏向健侧
- B. 开口型偏向患侧
- C. 开口型先偏向患侧, 后回到健侧
- D. 开口型无偏斜
- E. 患侧关节弹响

49. 颞下颌关节骨关节病的临床表现不包括

- A. 开口中度受限
- B. 开口型偏斜
- C. 摩擦音
- D. 关节区咬合痛
- E. 耳前区肿胀

50. 下列可用于观察髁突骨折的是

- A. 经咽侧位
- B. 许勒位
- C. 曲面体层
- D. 下颌开口后前位
- E. 颞弓切线位片

51. 口腔黏膜白斑癌变的最危险因素是

- A. 发病年龄 40 岁以下
- B. 男性
- C. 病损位于舌侧缘
- D. 上皮单纯增生
- E. 伴有消化道溃疡

52. 口腔黏膜出现乳白色的凝乳状斑片常

见于

- A. 球菌性口炎
- B. 白色念珠菌病
- C. 口腔扁平苔藓
- D. 均质型白斑
- E. 白色角化症

53. 慢性非特异性唇炎的诱因是

- A. 营养不良
- B. 病毒感染
- C. 风吹、日晒
- D. 真菌感染
- E. 药物过敏

54. 引起年轻恒牙牙髓炎的最主要原因是

- A. 外伤
- B. 创伤
- C. 医源性因素
- D. 龋齿
- E. 发育异常

55. 在乳牙牙髓切断术中, 用于牙髓断面的药物不包括

- A. 甲醛甲酚
- B. 戊二醛
- C. 氢氧化钙
- D. 无机三氧化物聚合物
- E. 金属砷

56. 下列有关早萌牙的叙述, 不正确的是

- A. 马牙子是早萌牙
- B. 诞生牙是早萌牙
- C. 新生牙是早萌牙
- D. 早萌牙常有釉质发育不全
- E. 早萌牙多见于乳下中切牙

- 57.乳牙外伤最常见的类型是
- A.冠折
 - B.根折
 - C.脱位
 - D.冠根折
 - E.震荡
- 58.釉质发育不全的防治原则是
- A.补充维生素 D
 - B.对釉质缺损患者实施防龋
 - C.轻症患牙可做脱色治疗
 - D.重症患牙可做牙髓治疗
 - E.纠正不良饮食习惯
- 59.氟牙症的临床特点为
- A.有婴幼儿期在低氟区生活史
 - B.釉质损伤发生在单个牙上
 - C.患牙的釉质损伤斑块边缘清楚
 - D.患牙着色但不发生釉质的实质缺损
 - E.患牙对摩擦耐受能力差,对酸的耐受能力强
- 60.楔状缺损的预防和治疗原则不包括
- A.纠正横刷牙习惯
 - B.均衡咬合力负担
 - C.改正喜吃酸食习惯
 - D.涂布氟化物,提高耐酸性
 - E.并发牙髓病时行根管治疗
- 61.急性化脓性根尖周炎疼痛最剧烈的时期是
- A.根尖脓肿阶段
 - B.骨膜下脓肿阶段
 - C.黏膜下脓肿阶段
 - D.脓肿破溃时
 - E.脓肿未形成前
- 62.急性根尖周脓肿最主要的临床表现是
- A.自发痛阵发加重
 - B.冷热刺激激发痛
 - C.剧烈的夜间痛和放射痛
 - D.持续性跳痛和咬合痛
 - E.患牙伸长,咬紧时疼痛缓解
- 63.诊断慢性根尖周炎的主要依据是
- A.有轻度叩痛
 - B.有咬合痛
 - C.根尖区黏膜肿胀
 - D.牙髓温度测验无反应
 - E.X线片示根尖周骨质破坏
- 64.最易被致龋齿利用产酸的糖是
- A.葡萄糖
 - B.蔗糖
 - C.麦芽糖
 - D.果糖
 - E.乳糖
- 65.猛性龋齿发生的人群是
- A.头颈部放疗患者
 - B.釉质发育不全患者
 - C.某些传染性疾病患者
 - D.氟牙症患者
 - E.有严重牙周病的患者
- 66.G.V.Black 窝洞分类中,后牙邻面龋损制备的单面洞称为
- A.Ⅰ类洞
 - B.Ⅱ类洞
 - C.Ⅲ类洞
 - D.Ⅳ类洞
 - E.Ⅴ类洞
- 67.自酸蚀粘接系统最主要的临床应用特点是
- A.免酸蚀
 - B.免冲洗
 - C.二部化操作
 - D.分瓶包装
 - E.需保持界面湿润
- 68.牙髓电活力测验时的注意事项是
- A.先测对照牙,再测患牙
 - B.以第一次测试结果为准
 - C.测试牙面应保持干燥
 - D.测试电流强度由大至小
 - E.装有心脏起搏器的患者需在心电监护

下测试

69. 可复性牙髓炎的临床表现是
- 冷刺激疼痛, 刺激去除后疼痛很快消失
 - 冷刺激去除, 疼痛随即出现
 - 冷、热测试结果同对照牙
 - 冷刺激引起剧烈疼痛, 放散至耳颞部
 - 热刺激引起疼痛, 冷刺激缓解
70. 临床治疗中, 尽可能保留的牙
- 额外牙
 - 患晚期牙周病的牙
 - 根中三分之一折断的外伤牙
 - 牙体组织破坏严重的牙
 - 颌骨骨折线上的牙
71. 女, 30 岁。前牙自发痛 1 周。两牙缝间发黑伴进食嵌塞 1 年余。1 周前进行树脂直接粘接修复, 治疗后出现自发隐痛和夜间痛, 未确定患牙。以下检查中, 最佳的选择是
- 叩诊
 - 扪诊
 - 探诊
 - 牙髓温度测验
 - 拍根尖片
72. 女, 19 岁。外伤致右下 4 折断, X 线片显示根尖三分之一位于牙槽窝内, 根尖周未见病变, 最佳的处理方法是
- 根钳取根
 - 直牙挺取根
 - 弯牙挺取根
 - 三角挺取根
 - 根尖挺取根
73. 女, 29 岁。10 天前拔除左下颌阻生智牙, 手术过程顺利。现仍张口困难, 拔牙创愈合良好, 且无明显头痛。最可能损伤的肌肉是
- 咬肌
 - 颊肌
 - 颞肌
 - 翼外肌
 - 下颌舌骨肌
74. 男, 28 岁。拔牙前行局部麻醉出现晕厥, 错误的处理方法是
- 迅速放平座椅, 置患者于头低位
 - 松解衣领, 保持呼吸道通畅
 - 嗅闻氨水, 必要时吸氧
 - 稍后再继续注射麻药
 - 静脉注射高渗葡萄糖
75. 女, 22 岁。左下后牙疼痛张口受限 1 月余。检查: 面部未见明显肿胀, 张口度不足一指, 左下智牙周围未见明显红肿。有助于鉴别左下颌第三磨牙肿物的关键临床表现是
- 黏膜破溃
 - 牙松动
 - 下唇麻木
 - 舌麻木
 - X 线片显示骨破坏
76. 女, 40 岁。左侧咬肌间隙感染, 脓肿形成。行切开引流术引流出脓液后, 应首选放置的引流条是
- 碘仿纱条
 - 盐水纱条
 - 橡皮管
 - 凡士林纱条
 - 负压引流管
77. 女, 50 岁。被刀砍伤左面部 1 小时。检查: 左下颌骨外侧面部动脉喷射状出血。此时不能单独用于紧急止血的措施是
- 结扎止血
 - 静脉输入止血
 - 压迫止血
 - 包扎止血
 - 填塞止血
78. 女, 45 岁。7 小时前被汽车刮伤面部。检查: 右颊部可见直径约 5 cm 不规则皮肤、皮下和部分肌肉撕脱, 其他未见异常。不正确的处理方法是
- 如果有血管可以吻合, 立即行撕脱部分吻合再植

- B.用带蒂皮瓣修复撕脱后缺损
- C.清创后将撕脱组织缝合,加压包扎
- D.用吻合血管的游离皮瓣修复缺损
- E.取大腿皮片进行移植,消灭创面

79.女,20岁。10天前被汽车撞伤。CT检查上颌骨骨折,骨折线经梨状孔水平,牙槽突上方向两侧水平延伸至上颌翼突缝。该骨折符合

- A.LeFort I型
- B.LeFort II型
- C.LeFort III型
- D.矢状骨折
- E.混合型骨折

80.男,58岁。右舌缘溃疡4个月。病理诊断为鳞癌,决定行舌颌颈联合根治术,前臂皮瓣修复舌缺损。术后颈部创口引流最好采用

- A.片状引流
- B.纱条引流
- C.管状引流
- D.负压引流
- E.被动引流

81.男,63岁。行上颌结节麻醉后,突然感到心悸、头晕、头痛、脉搏快而有力,血压升至150/100 mmHg,口唇苍白。应考虑发生的情况是

- A.中毒
- B.晕厥
- C.癔症
- D.过敏
- E.肾上腺素反应

82.女,12岁。检查发现左侧口底肿物,大小为2.0 cm×3.0 cm,触诊有弹性,似面团感,穿刺见乳白色豆渣样分泌物。最可能的诊断是

- A.舌下腺囊肿
- B.下颌下腺囊肿
- C.皮样囊肿

- D.黏液囊肿
- E.角化囊肿

83.女,41岁。左下颌骨膨隆,X线片示左下颌体及下颌支多房性囊肿样阴影。病理报告为成釉细胞瘤。首选的治疗方法是

- A.刮治术
- B.开窗术
- C.冷冻治疗下颌骨截骨术
- D.下颌骨截骨术
- E.下颌骨截骨术+植骨术

84.女,18个月,因发音不清就诊。检查:舌系带过短。正确的治疗操作是

- A.从舌系带中央水平切开
- B.从舌系带中央垂直切开
- C.切口与口底垂直
- D.切口长度不宜超过1.5 cm
- E.切断大部分肌纤维

85.男,31岁。下前牙牙龈红肿2个月。检查:下前牙牙龈色红,质软,龈乳头圆钝,探针出血,龈缘可见少量牙石。X线片显示全口压槽骨轻度吸收。该患者应诊断为

- A.慢性龈炎
- B.龈乳头炎
- C.慢性牙周炎
- D.侵袭性牙周炎
- E.坏死性溃疡性龈炎

86.女,28岁。发现右上侧切牙与右上尖牙间唇侧龈乳头处肿物半个月。患者妊娠4个月。检查:2|远中龈乳头有一增生物,直径5 mm,色泽鲜红光亮,质地松软,触之极易出血。全口牙龈中度红肿,牙石中量。该患者应诊断为

- A.妊娠期龈瘤
- B.牙周脓肿
- C.急性龈乳头炎
- D.侵袭性牙周炎
- E.坏死性溃疡性龈炎

87.女,35岁。右上后牙进食嵌塞后疼痛

1天。检查:右上6近中有食物嵌塞,龈乳头红肿,用探针取出食物时有明显的出血和疼痛。针对主诉症状,该患者应诊断为

- A.妊娠期龈瘤
- B.慢性龈炎
- C.急性龈乳头炎
- D.侵袭性牙周炎
- E.坏死性溃疡性龈炎

88.女,15岁。错颌畸形,上颌前部埋伏额外牙。欲判断埋伏牙位置,首选的X线检查方法是

- A.根尖牙
- B.根尖定位片
- C.上颌前部横断颌片
- D.锥形束CT
- E.曲面体层片

89.女,56岁。左上后牙咬合不适2个月。检查: 7^M 深龋及髓,牙髓温度测验无反应,叩痛(±)。X线片见左上7的根尖周 $3\text{ mm} \times 8\text{ mm}$ 透射影。边界清楚。该主诉牙的治疗方案是

- A.继续观察
- B.去腐充填
- C.根管治疗
- D.根尖手术
- E.拔除患牙

(90~91题共用题干)

男,70岁。佩戴全口义齿2个月,右侧龈颊沟疼痛2周,检查:右下后牙龈颊沟见一长条形溃疡,周围水肿明显,扪诊溃疡底部柔软无结节。

90.此患者最有可能的诊断是

- A.复发性口腔溃疡
- B.口腔单纯疱疹
- C.口腔鳞癌
- D.创伤性溃疡
- E.口腔念珠菌病

91.应采取的首要处理措施是

- A.外科手术
- B.抗真菌治疗
- C.调改义齿
- D.活体组织检查
- E.抗病毒治疗

(92~93题共用题干)

男,6岁。双侧上后牙进食嵌塞痛2个月。偶有自发痛史,每天能坚持睡前刷牙。检查:双侧上颌第二乳磨牙咬合面深龋洞,双上颌第一乳磨牙充填完好,下颌乳磨牙深窝沟,上颌乳切牙大面积浅龋。口腔卫生状况一般。

92.对上前牙广泛浅龋的治疗应采用

- A.充填治疗
- B.预成树脂冠修复
- C.嵌体修复
- D.药物治疗
- E.拔出患牙

93.对双侧上颌第二乳磨牙的治疗为

- A.直接盖髓术
- B.间接盖髓术
- C.活髓切断术
- D.牙髓再生术
- E.根管治疗术

(94~95题共用题干)

女,8岁。右上第一恒磨牙近中面及咬合面龋。X线片:右上第一磨牙牙根形成 $2/3$,根周骨硬板尚清楚,咬合面龋洞洞底接近髓角。去腐过程中可见大量软化牙本质及腐质。去腐后可见穿髓点,针尖大小,呈灰色,探无反应。

94.患牙的治疗应采用

- A.直接盖髓术
- B.根尖诱导成形术
- C.活髓切断术
- D.牙髓再生术
- E.根管治疗术

95.治疗中应首选的药物是

- A.甲醛甲酚

- B. 戊二醛
- C. 氢氧化钙
- D. 无机三氧化物聚合物
- E. 碘仿

(96~97 题共用题干)

男,62 岁。右下后牙长期进食嵌塞,2 个月以来牙龈长脓包。检查:4⁰ 深龋及髓,叩痛(-),牙髓温度测验无反应,颊侧牙龈可见窦道,5¹ 近中边缘可见,墨浸状损害。X 线片见 4¹ 根尖周 5 mm×5 mm 的透射区,边界模糊,5^M 龋损达牙本质浅层。

96. 主诉牙应诊断为

- A. 慢性牙髓炎
- B. 慢性根尖周脓肿
- C. 慢性根尖周肉芽肿
- D. 根尖周囊肿
- E. 慢性牙周炎

97. 主诉牙的关键诊断依据是

- A. 有牙龈长脓包的病史
- B. 叩痛(-)
- C. 牙髓温度测试无反应
- D. 存在窦道口
- E. X 线片见根尖周透射区

(98~99 题共用题干)

男,28 岁。上前牙 3 年前外伤,半年来牙齿变色。检查:1¹ 牙冠缺损 1/3,呈灰黑色,牙髓温度测验无反应,叩痛(-),X 线见 1¹ 根尖周 3 mm×3 mm 透射影。

98. 主诉牙应诊断为

- A. 牙冠折断
- B. 慢性牙周炎
- C. 慢性牙髓炎
- D. 牙髓坏死
- E. 慢性根尖周炎

99. 正确的治疗计划是

- A. 继续观察
- B. 盖髓充填

- C. 根管治疗
- D. 根尖切除术
- E. 拔出后行种植术

(100~101 题共用题干)

女,50 岁。右上后牙冷,热刺激痛,3 个月,平日习惯用右侧咀嚼。检查:6¹ 咬合面牙釉质部分丧失,表面凹陷牙本质暴露,近中髓角探诊敏感,叩诊(+),冷测敏感,刺激去除后疼痛持续数十秒。

100. 该患牙的诊断是

- A. 中龋
- B. 楔状缺损
- C. 酸蚀症
- D. 牙本质过敏
- E. 慢性牙髓炎

101. 该患牙疾病的病因是

- A. 深龋
- B. 重度磨损
- C. 咬合创伤
- D. 重度酸蚀
- E. 发育异常

(102~104 题共用题干)

女,40 岁。右上后牙自发痛,放散痛 3 天。半年来右上后牙冷热刺激痛伴食物嵌塞,1 个月前拔除右下智牙。检查:右上 6 咬合面大面积充填体部分脱落,颊尖高陡,继发龋深,未及穿髓孔,叩诊不适,冷测引起剧烈疼痛。

102. 主诉牙的诊断是

- A. 可复性牙髓炎
- B. 急性根尖周炎
- C. 慢性牙髓炎
- D. 慢性牙髓炎急性发作
- E. 慢性根尖周炎

103. 需要鉴别诊断的疾病不包括

- A. 急性龈乳头炎
- B. 干槽症
- C. 慢性根尖周炎
- D. 三叉神经痛

E.急性上颌窦炎

104.主诉牙的治疗方案是

- A.根管治疗
- B.根管治疗,充填修复
- C.根管治疗,调整咬合
- D.根管治疗,桩核冠修复
- E.根管治疗,改正咬硬物习惯

(105~107 题共用题干)

男,72岁。1周前左下后牙疼痛未予治疗,逐渐发展为口底肿胀,高热和呼吸困难。检查:T 39.3℃,急性病容,呼吸急促,口底广泛水肿,充血,质硬,压痛明显,存在明显的凹陷性水肿和捻发音;张口受限,舌体抬高,言语不清,吞咽困难。

105.可能的诊断为

- A.颏下间隙感染
- B.左侧下颌下间隙感染
- C.化脓性下颌下淋巴结炎
- D.舌下间隙感染
- E.路德维希咽峡炎

106.最危险的并发症是

- A.全身中毒与窒息
- B.颅内感染与海绵窦静脉炎
- C.纵膈炎与纵膈脓肿
- D.肝、肾脓肿
- E.贫血与营养不良

107.行广泛切开引流时,病变区肌组织呈现的颜色是

- A.灰白色
- B.棕黑色
- C.肉红色
- D.青紫色
- E.黄绿色

(108~110 题共用题干)

男,36岁。体检拍片发现左下颌骨影像异常,无疼痛及麻木,X线片示为左下颌第2前磨牙至第三磨牙根尖部有清晰卵圆形透射影,大小约4cm×2cm,边界清楚,无牙根

吸收。

108.最可能的诊断是

- A.根端囊肿
- B.牙源性角化囊性瘤
- C.含牙囊肿
- D.骨髓炎
- E.骨肉瘤

109.首选的治疗方法是

- A.囊肿刮治术
- B.囊肿开窗术
- C.下颌骨截骨术
- D.硬化剂注射治疗
- E.局部注射碘酊

110.手术时最可能损伤的神经是

- A.面神经
- B.舌下神经
- C.舌咽神经
- D.下牙槽神经
- E.颊神经

(111~112 题共用题干)

女,65岁。上下无牙颌,牙槽嵴丰满,双侧上颌结节均较突出,右侧上颌结节下垂明显,息止颌位时与下颌磨牙后垫接近。

111.修复前需要做的外科处理是

- A.行左侧上颌结节修整术以消除倒凹
- B.行左侧上颌结节修整术以消除倒凹并降低高度
- C.行右侧上颌结节修整术以消除倒凹
- D.行右侧上颌结节修整术以消除倒凹并降低高度
- E.行双侧上颌结节修整术以消除倒凹

112.全口义齿初戴后右侧咀嚼时易脱落,说话、喝水时不脱落。检查:义齿边缘伸展适度,黏膜无红肿溃疡。义齿固位良好,右侧侧方颌时只有右侧上下尖牙接触。处理方法是

- A.磨低上下前牙切端高度
- B.磨低右下尖牙牙尖高度
- C.磨低右上尖牙牙尖高度

D.增加右侧后牙高度

E.增加左侧后牙高度

(113~114 题共用题干)

女,35岁。1年前因一上前牙形态小,有牙间隙,行金属烤瓷冠修复,此后经常出现刷牙时牙龈出血。检查,2]金属烤瓷冠,不松动,叩痛(-),龈缘红肿,探诊出血,烤瓷冠唇侧边缘位于龈沟底,X线片未见异常。余牙正常。

113.对于该患者,首先应采取的治疗措施是

A.牙周洁治

B.牙周上药

C.拔除患牙

D.拆除修复体

E.修复体边缘磨改

114.该患者牙龈红肿、探诊出血的原因是

A.口腔卫生差

B.修复体边缘过深

C.修复体边缘不密合

D.修复体为刃状边缘

E.修复体唇面形态异常

(115~116 题共用题干)

男,65岁。检查:上颌 87651|145678 缺失,下颌876521|12678 缺失,后牙区剩余牙槽嵴吸收严重。余留牙叩痛(-),不松动,牙龈退缩明显,牙根暴露约2mm。

115.下颌可摘局部义齿修复时,正确的设计是:

A.4]远中殆支托,5]远中殆支托

B.4]近中殆支托,5]远中殆支托

C.4]远中殆支托,5]近中殆支托

D.4]近中殆支托,5]近中殆支托

E.4]舌侧殆支托,5]舌侧殆支托

116.确定颌位关系的方法是

A.在模型上利用余留牙与牙槽嵴的关系

B.在口腔内用石膏记录余留牙与对颌的关系

C.在口腔内用蜡骀记录余留牙与对颌的关系

D.在口腔内用单颌蜡堤记录余留牙与对颌的关系

E.在口腔内用殆托蜡堤记录颌位关系

(117~120 题共用题干)

男,20岁。洁治后2个月出现刷牙时牙龈出血。检查:牙面大量菌斑软垢,下前牙唇侧龈乳头圆钝,探诊深度3~4mm,未探及釉牙骨质界。

117.该患者最可能的诊断是

A.慢性龈炎

B.龈乳头炎

C.青春期龈炎

D.慢性牙周炎

E.侵袭性牙周炎

118.该患者此次治疗计划中最应强调

A.漱口液含漱

B.口腔卫生指导

C.龈上洁治

D.龈下洁治

E.牙龈切除术

119.如再次进行超声波龈上洁治,操作错误的是

A.踩下脚踏开关后工作尖水雾喷溅

B.以握笔式握持工作手柄

C.工作尖垂直于操作牙面

D.工作尖的前端部分轻触牙石

E.工作尖在牙石根方来回移动

120.该患者完成治疗后,如斑菌控制好,其复查的时间应为治疗后

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6~12个月

E.15~24个月

(121~123 题共用题干)

男,50岁。右上后牙自发痛1天。检查:

6] 牙龈暗红, 牙周探诊深牙袋 8~10 mm, 松动 2 度, 冷测剧痛, 未探及龋坏及其他非龋疾病。

X 线片显示牙槽骨吸收已达到根尖

121. 6] 最可能的诊断是

- A. 牙周-牙龈联合病变
- B. 慢性牙髓炎
- C. 慢性根尖周炎
- D. 根分叉病变
- E. 急性根尖周炎

122. 该牙的预后主要取决于

- A. 其牙周病变的预后
- B. 其牙髓病变的预后
- C. 牙龈红肿的消退程度
- D. 有无对颌牙
- E. 是否可保留活髓

123. 该牙的治疗方案

- A. 根管治疗
- B. 龈上洁治
- C. 龈下洁治
- D. 牙周手术
- E. 拔除患牙

(124~125 题共用题干)

女, 46 岁。左下后牙自发性持续跳痛 3 天。检查: 7^D 深龋, 牙髓温度测验无反应, 叩痛(+++), 松动 II 度, 根尖部牙龈红肿, 扪诊疼痛, 有深部波动感, 8 近中阻生, 殆面浅龋。

124. 主诉牙的诊断是

- A. 7 急性牙髓炎
- B. 7 急性根尖周炎
- C. 7 慢性根尖周炎
- D. 8 急性牙髓炎
- E. 8 冠周炎

125. 首次就诊时应采取的措施是

- A. 7 开髓引流+口服止痛药
- B. 7 根管治疗+调整咬合
- C. 7 开髓封药+切开引流
- D. 8 冠周炎冲洗+7 切开引流

E. 8 拔除+口服止痛药

(126~127 题共用备选答案)

- A. 间接盖髓术
- B. 二次去腐术
- C. 活髓切断术
- D. 根尖诱导成形术
- E. 根管治疗

126. 年轻恒牙深龋近髓, 为了保护牙髓常用的方法是

127. 乳磨牙深龋极近髓, 其治疗常用的方法是

(128~129 题共用备选答案)

- A. 淋病奈瑟菌
- B. 单纯疱疹病毒
- C. 人乳头瘤病毒
- D. 带状疱疹病毒
- E. 白色念珠菌

128. 引起疱疹性口炎的病原微生物是

129. 引起鹅口疮的病原微生物是

(130~131 题共用备选答案)

- A. 深髓
- B. 可复性牙髓炎
- C. 牙本质过敏症
- D. 慢性牙髓炎
- E. 牙龈坏死

130. 冷测反应正常, 冰水入洞一过性敏感, 考虑患牙诊断为

131. 冷测反应迟钝。热测敏感。考虑患牙诊断为

(132~133 题共用备选)

- A. 畸形舌侧窝
- B. 畸形中央尖
- C. 畸形根面沟
- D. 畸形舌侧尖
- E. 牙中牙

132. 容易伴牙周组织破坏的疾病是

133. 牙内陷疾病中最轻的类型是

(134~135 题共用备选答案)

- A.面神经
B.颊神经
C.舌神经
D.腭小神经
E.腭前神经
- 134.与腮腺手术关系最密切的神经是
135.与腭侧手术关系最密切的神经是
(136~137题共用备选答案)
A.1~2个月
B.3~6个月
C.7~11个月
D.12~18个月
E.18~36个月
- 136.单侧唇裂修复术的最佳手术时间是
137.双侧唇裂修复术的最佳手术时间是
(138~139题共用备选答案)
A.软腭裂
B.不完全性腭裂
C.单侧完全性腭裂
D.双侧完全性腭裂
E.腭隐裂
- 138.腭垂完全裂开的畸形是
139.前颌骨裂开并向两侧斜裂直达牙槽突,鼻中隔、前颌骨及前唇部分孤立于中央的畸形是
(140~141题共用备选答案)
A.注射硬化剂
B.复位咬合板
C.翼外肌封闭
D.颞下颌关节成形术
E.关节盘摘除术
- 140.治疗可复性关节盘前移位的方法是
141.治疗复发性关节脱位应选用
(142~144题共用备选答案)
A.根尖区弥散性骨质破坏,边界不清
B.根尖偏心性直径不超过1cm的圆形图透射影,边界清楚
C.根尖周透射性病変,形状规则,边缘有致密线条影
D.根尖呈球状增生
E.根尖区骨质密度增高,与正常组织分界不清
- 142.根尖周肉芽组织的X线表现是
143.慢性根尖周脓肿的X线表现是
144.牙骨质增生的X线表现是
(145~147题共用备选答案)
A.鞍式桥体
B.悬空式桥体
C.改良盖嵴式桥体
D.船底式桥体
E.盖嵴式桥体
- 145.牙槽嵴吸收过多的后牙固定桥采用的桥体是
146.自洁作用好,感觉舒适的桥体是
147.不易清洁,应尽量避免使用的桥体是
(148~150题共用题干)
A.牙线
B.牙签
C.牙间隙刷
D.电动牙刷
E.单束毛牙刷
- 148.对于无牙龈退缩的后牙,为了清除邻面菌斑应选用
149.对于有牙龈退缩5~6mm的后牙,为了清洁邻面菌斑最好选用
150.手的动作不灵活的患者宜选用

参考答案

第一单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	B	C	D	B	C	B	A	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	C	D	C	B	D	A	D	A	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	C	B	A	B	D	D	D	E	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	A	D	D	D	B	C	E	D	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	D	B	C	B	D	C	D	D	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	D	C	D	D	C	E	C	B	A
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	C	B	D	A	C	A	E	D	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	D	D	E	C	D	D	C	E	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	B	A	B	D	A	C	C	C	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	B	E	C	E	C	D	E	B	A
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	C	D	B	D	D	C	B	A	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	B	B	E	C	C	E	C	C	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
B	C	D	A	E	C	D	E	B	C

口腔执业助理医师资格考试历年真题精编“5+2+1”

131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D	B	A	E	B	D	A	B	A	D
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	E	B	E	A	E	B	E	C	E

金英杰医学教育

第二单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	B	C	E	E	A	C	C	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	C	E	B	D	B	B	D	E	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	E	D	C	E	C	D	E	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	E	D	C	C	B	E	B	D	E
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	A	A	B	C	B	D	A	E	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	B	C	D	E	A	C	B	E	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	D	E	B	A	B	B	A	A	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	E	D	D	C	B	B	C	A	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	C	E	A	C	A	C	B	C	D
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	D	E	B	C	B	E	E	C	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	D	C	D	E	A	B	B	A	D
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
D	B	D	B	A	E	A	B	C	D
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	A	E	B	C	B	A	B	E	A

口腔执业助理医师资格考试历年真题精编“5+2+1”

131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D	C	A	A	E	B	C	A	D	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	B	A	D	B	C	A	A	C	D

金英杰医学教育