

模拟试卷

第一单元

A1 型选择题 (1~25 题)

答题说明

每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1.社区全科医生对患者的任何医疗需求都要做出应答,并亲自解决其中大部分的问题,这体现了社区卫生服务的特征是

- A. 第一线服务
- B. 综合性服务
- C. 可及性服务
- D. 持续性服务
- E. 协调性服务

2.咨询者既要注意咨询对象的名誉,也要保护其隐私权,指的是

- A. 如实信赖原则
- B. 整体性原则
- C. 发展性原则
- D. 保密性原则
- E. 预防性原则

3.关于全科医生的描述,正确的是

- A. 全面掌握各科业务技术的临床医生
- B. 提供全部“六位一体”社区卫生服务的基层医生

C. 能熟练处理常见健康问题,为社区居民提供上门医疗服务的基层医生

D. 经全科医学专业培训合格,在社区提供长期负责式医疗保健照顾的医生

E. 以预防工作为主的医生

4.居民张某,2年前离婚,现与儿子一起生活,此种家庭类型属于

- A. 核心家庭
- B. 单亲家庭
- C. 旁系家庭
- D. 直系家庭
- E. 丁克家庭

5.中心性发绀常具有的特点是

- A. 常出现在肢体末梢
- B. 伴有皮肤温度降低
- C. 见于下肢静脉栓塞时
- D. 见于严重休克时
- E. 见于发绀型先天性心脏病时

6.咳嗽伴呼吸困难,不常见于下列哪种疾病

- A. 急性上呼吸道感染
- B. 急性肺梗死
- C. 大量胸腔积液
- D. 慢性阻塞性肺病
- E. 自发性气胸

7.关于痰的性状和痰量正确的描述为

A. 痰的性状可分为黏液性、浆液性、血性和乳糜性

- B. 铁锈色痰多见于支气管扩张
- C. 白色黏痰常见于肺水肿
- D. 肺泡癌可出现大量浆液性泡沫样痰
- E. 支气管胸膜瘘很少有痰

8.下列不是艾滋病传播途径的是

- A.性传播
B.母婴传播
C.血液传播
D.日常生活传播
E.吸毒传播
- 9.水肿伴大量蛋白尿常见于
A.肾源性水肿
B.营养不良性水肿
C.局部静脉血栓形成
D.局部淋巴回流受阻
E.甲状腺功能低下
- 10.长期慢性咳嗽、咯血、咳大量脓痰最常见于
A.慢性支气管炎
B.百日咳
C.大叶性肺炎
D.支气管扩张
E.肺癌
- 11.关于发热的分度,正确的是
A.低热:37.3~38℃
B.低热:37~38℃
C.中度热:38~39℃
D.高热:39~41℃
E.超高热:大于41℃
- 12.麻疹黏膜斑(Koplik斑)的特点是
A.颊黏膜白色斑块,大小不等高出皮面
B.颊黏膜充血、肿胀并伴有小出血点
C.第二磨牙的颊黏膜出现针头帽大小白色斑点
D.颊黏膜蓝黑色色素沉着
E.颊黏膜淤斑
- 13.结膜充血一般呈
A.暗红色
B.粉红色
C.鲜红色
D.暗紫色
E.颜色无明显改变
- 14.胸骨后痛可见于
A.胸膜炎
B.肺梗死
C.心脏神经症
D.自发性气胸
E.反流性食管炎
- 15.公共卫生措施在全体居民中实施的第一级预防是指
A.病因学预防
B.“三早”预防
C.临床前期预防
D.临床预防
E.病残预防
- 16.乡镇卫生院和村卫生室宣传栏的面积不少于
A.2.0 m²
B.2.1 m²
C.2.2 m²
D.1.1 m²
E.1.2 m²
- 17.乡镇卫生院每月至少举办多少次健康知识讲座
A.1次
B.2次
C.3次
D.6次
E.8次
- 18.糖尿病患者健康管理每年至少面对面随访几次
A.2次
B.3次
C.4次
D.6次
E.8次
- 19.下列哪项不是水平传播方式
A.空气传播
B.经水传播
C.经胎盘传播
D.经食物传播
E.经媒介节肢动物传播
- 20.WHO给健康下的定义是

- A.无病就是健康
B.身体各器官结构完好,功能正常
C.没有疾病,身体又不虚弱
D.身体、心理和社会适应的完好状态,而不仅仅是没有疾病和虚弱
E.身体强壮,精神饱满
- 21.中医医疗机构从事中医医疗活动,应按规定办理审批手续,取得
- A.医疗机构执业许可证
B.医疗机构营业执照
C.医疗机构制剂许可证
D.医疗机构规划证
E.医疗机构开业证明
- 22.人群易感性升高的主要因素是
- A.免疫接种
B.新生儿增加
C.隐性感染
D.非易感人群迁入
E.传染病流行
- 23.恩格尔于 1977 年提出的现代医学模式是

- 式是
- A.生物医学模式
B.生物-社会医学模式
C.生物-心理医学模式
D.生物-心理-社会医学模式
E.心理-社会医学模式
- 24.长期的焦虑紧张,容易让人生病,这体现了医学心理学的哪个基本观点
- A.心身统一
B.社会影响
C.个性特征
D.主动调节
E.被动调节
- 25.不属于心身疾病的是
- A.胃溃疡
B.抑郁症
C.癌症
D.糖尿病
E.支气管哮喘

A2 型选择题 (26~110 题)

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 26.女,30岁。从事电脑操作工作6年。由于经常长时间在显示屏前工作,引起视力疲劳及“颈、肩、腕综合征”。导致这种情况最可能的原因是
- A.不良心理因素
B.物理性有害因素
C.不良生活方式
D.职业性紧张因素
E.不良作业方式
- 27.男,49岁,经理。吸烟(10支/天),体重超重,血清总胆固醇 9.25 mmol/L。其最优先干预的危险因素是
- A.吸烟

- B.体重超重
C.高胆固醇血症
D.体力活动过少
E.上述各危险因素均应优先处理
- 28.一家长带小儿到乡镇医院行体格检查,欲衡量小儿的营养状况。首先需做的检查是
- A.体重
B.身高
C.上、下部量
D.头围
E.胸围
- 29.男,19岁。咳嗽38天,多为夜间、清晨

和运动后咳嗽,无痰,无发热。曾用阿奇霉素、头孢克洛等治疗效果不佳。PPD 试验(-),胸片未见异常。其母有过敏性鼻炎。最可能的诊断是

- A.过敏性鼻炎
- B.咳嗽变异性哮喘
- C.支气管炎
- D.支气管肺炎
- E.原发性肺结核

30.男婴,4月龄。因咳喘4天,诊断为支气管肺炎,体温持续39~40℃,近2h来两眼上翻,惊厥多次,神志半昏迷,前囟门紧张。可能合并

- A.癫痫
- B.高热惊厥
- C.中毒性脑病
- D.婴儿手足搐搦症
- E.低血糖

31.男,30岁。低热、盗汗、咳嗽、血痰1个月。胸片示右上肺小片状浸润影,密度不均。确诊应选择的检查是

- A.PPD 试验
- B.痰 TB-DNA
- C.血清中结核抗体菌
- D.痰检抗酸杆菌
- E.血沉

32.男,65岁。发现高血压3年,未治疗。查体:BP 150/85 mmHg。该患者的血压属于

- A.正常高值
- B.单纯收缩期高血压
- C.理想血压
- D.正常血压
- E.2级高血压

33.男,56岁。吸烟22年余,慢性咳嗽、咳痰15年。近2年来劳累时有气急。查体:两肺呼吸音减弱,肺下界下移,两肺底有细小湿啰音。最可能的诊断是

- A.大叶性肺炎
- B.COPD

- C.胸腔积液
- D.支气管哮喘
- E.气胸

34.男,60岁。每于上楼时出现胸闷3天,含服硝酸甘油2min可缓解。8h前再次出现上述症状,向左上肢和后背放射,为持续性,伴上腹胀痛和恶心、呕吐,含服硝酸甘油无缓解。该患者首选的辅助检查是

- A.心电图
- B.胸部X线片
- C.冠状动脉造影
- D.超声心动图
- E.胃镜

35.男孩,2岁。发热,流涕、咳嗽3天,今晨前额及耳后出现浅红色斑丘疹,球结膜充血,口腔黏膜科氏斑,声音嘶哑,精神萎靡,双肺呼吸音粗,最可能的诊断是

- A.川崎病
- B.风疹
- C.猩红热
- D.幼儿急疹
- E.麻疹

36.男,73岁。突发头痛9h,昏迷8h。头颅CT:右额叶出血。1h来呕暗红色血2次,共约350mL。无慢性肝病史。最可能的呕血原因是

- A.十二指肠溃疡
- B.胃癌
- C.贲门黏膜撕裂
- D.急性胃黏膜病变
- E.食管胃底静脉曲张破裂

37.男,65岁。间断腹胀、上腹隐痛25年。胃镜检查提示:胃体黏膜变薄,血管透见,皱襞稀疏。患者可能缺乏的维生素是

- A.维生素B₄
- B.维生素C
- C.维生素B₁₂
- D.维生素B₂
- E.维生素D

38.肝硬化腹腔积液患者经治疗后,血钾为 2.4 mmol/L,尿钾 40 mmol/L,此患者低钾原因最大可能是

- A.食欲不振
- B.低盐饮食
- C.腹腔积液
- D.呕吐
- E.利尿治疗

39.男,44岁。阵发性右腹绞痛1天,伴恶心、呕吐,无发热,腹痛发作时向右下腹放射,伴尿频、尿痛等症状,查体:腹软,右下腹有压痛,无反跳痛,膀胱区不胀。血常规 WBC 正常,尿常规 WBC 0~1 个/HP, RBC 7~10 个/HP。最可能的诊断是

- A.阑尾炎
- B.肾肿瘤
- C.肾结石
- D.肾结核
- E.输尿管结石

40.男,50岁。呕血2h,量约600mL。慢性乙型肝炎10年。查体:脾肋下2cm。出血病因首先考虑是

- A.胃血管畸形破裂
- B.食管胃底静脉曲张破裂
- C.胃癌
- D.消化性溃疡
- E.食管贲门黏膜撕裂综合征

41.女,60岁。左肩部疼痛6个月,梳头、洗脸困难,肩袖间隙区明显压痛,部位局限,肩关节活动受限,X线未见明显异常。不正确的处理是

- A.使用激素类药物局部注射
- B.使用非甾体抗炎药
- C.早期给予理疗、按摩
- D.手术治疗
- E.保持肩关节主动活动

42.女,50岁。对称性多关节肿痛伴晨僵1年余,血RFI:40(+),ESR 100 mm/h,本患者目前暂不考虑的治疗措施是

- A.非甾体抗炎药
- B.泼尼松
- C.环磷酰胺
- D.甲氨蝶呤
- E.关节手术

43.老年女性不慎摔倒,左腕部着地,当即左腕剧痛,不能站立,急诊来院。查体见左下肢缩短,外旋畸形。其最可能的诊断是

- A.左腕关节前脱位
- B.左腕关节后脱位
- C.左腕关节中心脱位
- D.左股骨颈骨折
- E.左股骨干骨折

44.男,50岁。因交通事故致左髋部疼痛、畸形,查体见左下肢呈内收短缩屈曲畸形,左下肢足尖指向右足背,首先应考虑的诊断是

- A.骨盆骨折
- B.股骨颈骨折
- C.股骨干骨折
- D.髋关节后脱位
- E.髋关节前脱位

45.男,65岁。以舌部溃疡1个月就诊,初起疼痛明显,后来只有钝痛。检查发现右侧缘中后部0.5cm×1cm溃疡,外形不规则,周缘不隆起,基底不硬,检查牙齿发现溃疡处对应牙齿有残冠,边缘锐利。最可能的诊断是

- A.创伤性溃疡
- B.复发性阿弗他溃疡
- C.结核性溃疡
- D.梅毒下疳
- E.类天疱疮

46.女,32岁。反酸、烧灼感半年余,胃镜检查诊断为反流性食管炎,经质子泵抑制剂和促动力剂治疗3个月后症状缓解,对于其随后的维持治疗,目前首先推荐

- A.不需要维持治疗
- B.质子泵抑制剂
- C.H₂受体拮抗剂
- D.促动力药

E.制酸剂

47.男,22岁。突发右胸痛2天,无发热、咳嗽。查体:T 37.2℃,右胸廓稍饱满,语音震颤减弱,叩诊呈鼓音,呼吸音消失。该患者最可能的诊断是

- A.肺不张
- B.胸腔积液
- C.肺炎
- D.肺气肿
- E.气胸

48.女,20岁。外伤后有血性脑脊液自鼻腔溢出,应采取的处置是

- A.鼻腔填塞压迫止血
- B.鼻腔冲洗
- C.给予抗生素治疗
- D.腰穿放血性脑脊液
- E.头低位以利引流

49.女,43岁。突发右上腹剧痛并阵发性加剧3天,寒战高热,恶心呕吐。查体:全身黄染,体温39℃,脉搏120次/min,血压80/60 mmHg,谵妄,神志不清,剑突偏左腹肌紧张,肝肋下2cm。血常规WBC $15 \times 10^9/L$,中性80%,血清总胆红素50 $\mu\text{mol/L}$,本例治疗首选

- A.抗休克,抗感染治疗
- B.胆囊切除,腹腔引流术
- C.胆囊造口术
- D.胆总管减压引流
- E.溃疡病穿孔缝合

50.男,47岁。扩张型心肌病10年,活动后喘憋进行性加重,因病卧床半年,下床排便后喘憋突然加重1h查体:R 30次/min, BP 90/60 mmHg,口唇发绀,右下肺可闻及少许湿性啰音,心界向左扩大,心率90次/min,律齐,心音低钝,P₂亢进,双下肢无水肿。心电图示右束支传导阻滞。血气分析 PaO₂48 mmHg, PaCO₂35 mmHg。该患者喘憋突然加重的最可能的原因是

- A.急性心包炎
- B.肺血栓栓塞症

C.急性心肌梗死

D.心绞痛

E.肺炎

51.男,34岁。腹部砸伤4h。查体:四肢湿冷,腹肌紧张,全腹压痛及反跳痛,有移动性浊音,肠鸣音消失。该患者目前应进行的处理不包括

- A.诊断性腹腔穿刺
- B.密切监测基本生命征
- C.补充血容量,抗休克治疗
- D.给予止痛和镇静剂
- E.抗感染治疗

52.男,50岁。患有急性心肌梗死,突然出现胸闷、气喘、大汗淋漓。查体:BP 150/90 mmHg,无颈静脉怒张,双肺满布干、湿啰音,心率120次/min,第一心音低钝。最可能的诊断是

- A.急性左心衰竭
- B.心脏游离壁破裂
- C.肺血栓栓塞症
- D.支气管哮喘
- E.肺炎

53.女,55岁。突发心悸2h。查体:P 92次/min, BP 130/70 mmHg,双肺呼吸音清,心率115次/min,心律绝对不齐,心音强弱不等。该患者心悸最可能的原因是

- A.窦性心动过速
- B.室性心动过速
- C.三度房室传导阻滞
- D.阵发性室上性心动过速
- E.心房颤动

54.某山区一妇女育有3个子女,生活贫困,长期从事重体力劳动。近期感觉头昏、乏力、腿部水肿。去医院检查:血清白蛋白28 g/L,铁蛋白20 ng/L。在下列食品中,建议该妇女应多吃的是

- A.白面
- B.红薯
- C.绿叶菜
- D.大米

E.大豆及其制品

55.男,45岁。间断性上腹不适12年,近
来有饱胀感,嗝气,食欲减退。胃镜及病理检
查诊断:慢性胃炎伴轻度肠上皮化生,14C-尿
素呼气试验阳性。最主要的治疗是

- A.抑酸药
- B.中药
- C.促胃动力药
- D.根除幽门螺杆菌
- E.胃黏膜保护

56.女,45岁。脐周痛12h伴恶心、呕吐,
呕吐物为胃内容物,量少,2h前扩散至全腹痛,
右下腹部压痛、反跳痛,腹肌紧张,以右下腹为
著,结肠充气试验(+),白细胞数 $26 \times 10^9/L$,应
考虑

- A.急性胰腺炎
- B.急性胆囊炎
- C.右输尿管结石
- D.右输卵管妊娠破裂
- E.急性阑尾炎穿孔

57.男,36岁。工作中弯腰捡物时突然出
现右上腹疼痛,12h后出现上腹疼痛持续性,
向腰背部放射,束带感,腹胀,豆油色尿,最可
能的诊断是

- A.急性胆囊炎
- B.急性胰腺炎
- C.肾绞痛
- D.高位阑尾穿孔
- E.肠系膜血管栓塞

58.女孩,17岁。15岁初潮,周期5/24~
30天,近半年来经期腹痛伴恶心、呕吐,第1
天为重。检查子宫正常大小,双附件正常,诊
断为原发性痛经。最合理的方案是

- A.应用性激素周期方法
- B.月经来潮即用前列腺素合成酶抑制药
或PG拮抗药
- C.宫颈扩张,以利经血流出
- D.应用雄激素周期方法
- E.应用止痛效果好的哌替啶(杜冷丁)或

吗啡类

59.女,38岁。查血压160/95 mmHg, Hb
80 g/L,尿蛋白(+),颗粒管型2~3个/HP,
BUN 10 mmol/L, Cr 220 $\mu\text{mol/L}$ 。对该患者不
宜采取的措施是

- A.低钠饮食
- B.高蛋白饮食
- C.低蛋白饮食
- D.根据尿量多少适当限水
- E.低磷饮食

60.男,42岁。慢性肾炎病史多年,近1年
经常出现双下肢水肿,一直服双密达莫和氢氯
噻嗪。近1周感觉腰痛,乏力,双下肢无力。
首先必须考虑的是

- A.肾功能严重减退
- B.低钾血症
- C.肾盂肾炎
- D.双密达莫中毒
- E.氢氯噻嗪中毒

61.男,35岁。胃区常隐痛3年,与饮食有
关,间有黑便。检查:血红蛋白75 g/L,红细胞
 $3.1 \times 10^{12}/L$,白细胞 $5.9 \times 10^9/L$,血小板 $130 \times$
 $10^9/L$,患者贫血最大可能是

- A.营养不良性贫血
- B.缺铁性贫血
- C.慢性肝病贫血
- D.巨幼细胞性贫血
- E.溶血性贫血

62.女,22岁,农民。头昏、心悸、颜面苍白
5年,并感吞咽困难。血红蛋白45 g/L,红细
胞 $2.0 \times 10^{12}/L$,白细胞及血小板正常,血片见
红细胞大小不均,以小细胞为主,中心染色过
浅。首选抗贫血制剂为

- A.维生素B₁₂
- B.叶酸
- C.口服铁剂
- D.雄激素
- E.泼尼松

63.男,44岁。心悸、怕热、手颤、乏力1年,

大便不成形,每日3~4次,体重下降10 kg。查体:脉搏90次/min,血压128/90 mmHg,皮肤潮湿,双手细颤,双眼突出,甲状腺Ⅱ度弥漫性肿大,可闻及血管杂音,心率104次/min,律不齐,心音强弱不等,腹平软,肝脾肋下未及,双下肢无水肿。为明确诊断,首选检查是

- A. 甲状腺摄¹³¹I率
- B. 血TSH、T₃、T₄
- C. T₃抑制试验
- D. TRH 试验
- E. 红细胞沉降率

64. 女,55岁。体重76 kg,身高160 cm。因多饮、多尿确诊为2型糖尿病,经饮食治疗和运动锻炼,2个月后空腹血糖为8.8 mmol/L,餐后2 h血糖13.0 mmol/L,进一步治疗应选择

- A. 加双胍类降血糖药物
- B. 加胰岛素治疗
- C. 维持原饮食治疗和运动
- D. 加磺脲类降血糖药物
- E. 加口服降血糖药和胰岛素

65. 女,22岁。患糖尿病7年,一直用胰岛素治疗。1 h前昏迷,检查皮肤湿冷,血压120/80 mmHg,血尿素氮4.3 mmol/L(12 mg/dl),二氧化碳结合力22.0 mmol/L。最可能的诊断是

- A. 糖尿病酮症酸中毒昏迷
- B. 高渗性非酮症糖尿病昏迷
- C. 乳酸性酸中毒昏迷
- D. 低血糖昏迷
- E. 脑血管疾病

66. 建筑工人不慎坠楼,腰部剧痛,双下肢感觉运动障碍,二便功能障碍,经X线检查,诊断为胸腰段压缩型骨折,高度怀疑脊髓损伤。下列各项检查最有价值的是

- A. MRI
- B. CT
- C. ECT
- D. 脊髓造影
- E. X线断层摄影

67. 男,20岁。汽车肇事致小腿开放性骨折,局部出血,在现场运送途中,止血宜首选

- A. 止血带
- B. 局部压迫包扎
- C. 指压出血血管
- D. 抬高伤肢
- E. 结扎出血血管

68. 男,65岁。活动中突感头痛、右侧肢体不能活动1天。高血压病史10年。查体发现左侧中枢性面舌瘫,左侧肢体完全瘫痪,左侧身感觉减退,左侧偏盲。该患者最可能的诊断是

- A. 脑室出血
- B. 脑叶出血
- C. 脑桥出血
- D. 小脑出血
- E. 基底节出血

69. 男,22岁。3 h前活动时突然感剧烈头痛和呕吐,出现全面性强直-阵挛性癫痫发作一次,脑膜刺激征(+).最可能的诊断是

- A. 蛛网膜下腔出血
- B. 脑干出血
- C. 小脑出血
- D. 癫痫发作
- E. 脑膜脑炎

70. 男孩,16岁。发作性意识丧失伴四肢抽搐5年,每年10余次。脑电图示广泛痫性放电。该患者最恰当的治疗是

- A. 联合使用抗癫痫药
- B. 随意使用单药治疗
- C. 按发作类型选用单药治疗
- D. 暂不治疗
- E. 外科手术治疗

71. 男孩,4岁。发热2天伴咽痛。查体:咽部充血,咽腭弓、悬雍垂、软腭处可见2~4 mm大小疱疹。最可能的病原体是

- A. 柯萨奇A组病毒
- B. 呼吸道合胞病毒
- C. 腺病毒

- D.鼻病毒
- E.冠状病毒

72.患儿,7月龄。近日经常夜惊多汗,且抽搐2次,抽后意识清,吃奶好,医生诊断为:营养性维生素D缺乏性手足搐搦症,本病以下哪项不具备

- A.喉痉挛
- B.手足抽搐
- C.陶瑟征阳性
- D.面神经征阳性
- E.婴儿期呈婴儿痉挛性发作

73.女,29岁。10个月前起病,言语错乱,别人难以理解,骂人毁物,逐渐言语活动减少,不能与周围人沟通。近3个月来呆坐少语,自笑,认为自己的事别人都能知晓,有人要害自己。查体:意识清,目光表情呆滞,耳边有命令性幻听,被害妄想,被洞悉感,有思维中断,躯体及神经系统检查无著征。该患者诊断为

- A.抑郁症
- B.精神分裂症
- C.脑肿瘤所致精神障碍
- D.内分泌疾病所致精神障碍
- E.偏执性精神障碍

74.女,41岁。近3周出现兴趣缺乏,易疲劳,言语少,动作迟缓,自觉脑子笨,没有以前聪明,早醒,食欲减退,腹胀,便秘,全身酸痛,有时感心慌气急。总觉得自己患了不治之症,给家庭带来许多麻烦。你认为该患者最可能的诊断是

- A.焦虑症
- B.神经衰弱
- C.疑病症
- D.抑郁症
- E.精神分裂症

75.足月儿,生后7天。近2天发现面部及前胸皮肤黄染,手足心不黄。母乳喂养,吃奶好,无发热,大便黄色,每日1次。化验血清胆红素 $156\mu\text{mol/L}$ (9mg/dl)。最恰当的诊断是

- A.生理性黄疸
- B.病理性黄疸
- C.胆红素脑病
- D.新生儿溶血病
- E.新生儿败血症

76.女孩,1岁。高热3h,体温 39°C ,惊厥1次,为全身性发作。为控制惊厥首选的药物及用药方法是

- A.肌肉注射苯巴比妥
- B.肌肉注射地西泮
- C.静脉注射苯妥英钠
- D.静脉注射副醛
- E.静脉注射地西泮

77.男,38岁。既往无肝病,2个月前因手术输血600mL,近日出现腹胀,乏力,丙氨酸氨基转移酶(ALT)200U/L,化验抗-HAV(-),HBsAg(-),抗-HBc(-),抗-HBs(+),抗-HCV(+),诊断应首先考虑是

- A.戊型肝炎
- B.甲型肝炎
- C.乙型肝炎
- D.丁型肝炎
- E.丙型肝炎

78.男婴,11月龄。因发热1天,伴鼻塞、哭闹、拒食、烦躁不安于3月2日到医院就诊,入院后突发惊厥一次。查体:体温 39.2°C ,脉搏102次/min,意识不清,四肢及臀部见散在瘀点,暗红色,脑膜刺激征(+),最可能的诊断是

- A.上呼吸道感染伴高热惊厥
- B.流行性乙型脑炎
- C.结核性脑膜炎
- D.流行性脑脊髓膜炎
- E.中毒型菌痢

79.男,32岁。腹泻3个月,大便每日7~10次,稀便,无脓血及黏液。有吸毒史2年。查体: $T37.5^{\circ}\text{C}$,消瘦,神志清楚,肛门周围可见疱疹。实验室检查:粪便镜检偶见白细胞。为明确诊断,最重要的检查是

- A.抗单纯疱疹病毒 IgM
B.抗 HBV IgM
C.结核抗体
D.抗 HIV IgM
E.抗 HIV
- 80.男,59岁。晨起出现右侧肢体活动不利、言语不清,持续 20 min 左右自行恢复正常,头颅 CT 检查未见异常,其最可能的诊断是
- A.腔隙性脑梗死
B.高血压脑病
C.短暂性脑缺血发作
D.壳核出血
E.脑栓塞
- 81.男,45岁,商人。有不洁性交史 5 天,1 天前尿道疼痛出脓。查体:尿道口可见大量黄色脓性分泌物。下列各种检查既便捷又准确的是
- A.淋球菌涂片
B.淋球菌培养
C.HIV 分离
D.血清抗-HIV
E.RPR
- 82.一位临产孕妇,突感头痛、恶心,相继发生抽搐,查血压为 165/109.5 mmHg,下肢水肿。对此患者最适用的抗惊厥药是
- A.地西洋
B.水合氯醛
C.苯巴比妥钠
D.硫酸镁
E.硫喷妥钠
- 83.男孩,14 岁。突发剑突下剧烈绞痛 2 h,疼痛呈钻顶样,辗转不安。查体:腹肌柔软,右上腹部轻微压痛。首先考虑的诊断是
- A.急性胆囊炎
B.胆总管结石
C.胆道蛔虫病
D.急性胰腺炎
E.胃癌
- 84.男孩,未满 18 岁。需应用抗生素治疗时,为防止对骨骼发育产生不良影响,应禁止使用的抗菌药物是
- A.氨基糖苷类
B.头孢菌素类
C.四环素类
D.大环内酯类
E.氟喹诺酮类
- 85.女,23 岁。右示指甲沟炎加剧 1 周,发热,指头剧烈肿胀、跳痛。最恰当的处置是
- A.热盐水浸泡,每次 30 min
B.全身应用抗生素
C.患指局部注射抗生素
D.患指侧面纵行切开
E.患指头做鱼口状切开
- 86.初产妇,25 岁。若哺乳产后 4~6 个月确诊为急性乳腺炎,下列错误的处置是
- A.全身应用抗生素
B.饮食宜清淡,易消化,忌辛辣
C.停止患侧哺乳,以吸乳器吸出
D.炎症初期婴儿可以继续哺乳,若哺乳,喂奶前后应清洁乳头、婴儿的口腔及乳头周围
E.已形成脓肿,应切开排脓,切口应包绕乳头呈环状
- 87.女,28 岁。左乳皮肤水肿、发红 2 个月,口服抗生素未见好转。查体:T37.0℃,左乳皮肤发红、水肿,呈“橘皮样”,乳头内陷,乳房质地变硬,无触痛,未扪及肿块。左腋下扪及多个肿大淋巴结、质硬、融合,无触痛。血常规:WBC $8.0 \times 10^9/L$,N 0.67。首先考虑的诊断是
- A.乳汁淤积
B.急性乳腺炎
C.乳腺囊性增生病
D.乳房后脓肿
E.炎性乳腺癌
- 88.男,65 岁。右腹股沟可复性球形肿块 2 年,逐渐增大。查体:站立时右耻骨结节外上方可见一球形肿物,未进入阴囊,平卧时可

自行回纳,压迫腹股沟韧带中点上方 2 cm 处,站立时肿物复出,应诊断为

- A. 右侧精索鞘膜积液
- B. 交通性鞘膜积液
- C. 右腹股沟斜疝
- D. 右侧腹股沟直疝
- E. 右侧股疝

89. 男孩, 7 岁。便血 10 天。大便时见粪便表面附有鲜血, 有时在大便后有鲜血滴出, 无腹痛, 大便次数正常, 粪便形状正常, 首先考虑的诊断是

- A. 肛裂
- B. 内痔
- C. 直肠脱垂
- D. 肛窦炎
- E. 直肠息肉

90. 男, 17 岁。1 周前右足底被铁钉刺伤, 未作清创处理。近日感头痛、咬肌紧张酸胀, 诊断为破伤风, 其发病机制中错误的是

- A. 破伤风杆菌产生的内毒素引起症状
- B. 痉挛毒素是引起症状的主要毒素
- C. 溶血毒素引起组织局部坏死和心肌损害

- D. 破伤风是一种毒血症
- E. 破伤风杆菌产生大量外毒素

91. 男, 50 岁。咳嗽伴声音嘶哑 3 个月, 右锁骨上窝触及一个肿大的淋巴结, 质硬无压痛。提示该患者的诊断是

- A. 喉炎
- B. 肺癌
- C. 胃癌
- D. 鼻咽癌
- E. 肺结核

92. 男, 40 岁。平时喜欢饮热开水及热粥, 近 5 个月有进食困难, 并逐渐加重。钡餐检查: 食管中段有 5 cm 狭窄, 黏膜断裂, 最可能的诊断是

- A. 食管癌
- B. 食管瘢痕性狭窄

- C. 食管炎
- D. 贲门失弛缓症
- E. 食管静脉曲张

93. 女, 50 岁。间断上腹痛 8 个月, 进食后半小时为重, 近 2 月来转为持续性上腹胀痛伴恶心, 持续大便隐血试验强阳性。首先考虑的诊断是

- A. 十二指肠溃疡
- B. 胃癌
- C. 应激性溃疡
- D. 门静脉高压症
- E. 慢性胃炎

94. 男, 50 岁。发热、贫血、消瘦 3 个月, 阵发性右下腹痛转为持续性, 腹泻黏液血便, 右下腹触及包块, 最可能的诊断是

- A. 肠结核
- B. 慢性阑尾炎
- C. 肠套叠
- D. 升结肠癌
- E. 右髂窝脓肿

95. 女, 45 岁。性交后出血半年。妇科检查: 宫颈 I 度糜烂状。宫颈细胞学检查结果为低级别鳞状上皮内病变 (LSIL)。为明确诊断, 下一步应首选的处理是

- A. 宫颈冷刀锥切
- B. 宫颈电热圈切除术
- C. 阴道镜下活检
- D. 宫颈管搔刮
- E. HPV-DNA 检测

96. 女, 30 岁。月经规律, 尿妊娠试验阳性, 子宫附件区出现肿块, 首先应考虑

- A. 输卵管妊娠
- B. 附件炎性肿块
- C. 卵巢黄素囊肿
- D. 输卵管卵巢囊肿
- E. 卵巢肿瘤

97. 患者外阴痒 1 周, 查阴道黏膜覆以膜状物, 擦除后露出红肿黏膜面。正确的处理应是

- A.局部用氢化可的松软膏
- B.阴道内放置硝酸咪康唑栓
- C.阴道内放置甲硝唑片
- D.阴道内放置尼尔雌醇片
- E.外阴部用0.5%醋酸液洗涤

98.男,70岁。进行性排尿困难10年,夜尿3~4次,从未药物治疗。直肠指检:前列腺体积增大,中央沟消失,表面尚光滑,质地中等。B超:双肾无积水,输尿管未见扩张。最规流率10 mL/s。首先考虑的疾病是

- A.膀胱结石
- B.膀胱颈部挛缩
- C.前列腺癌
- D.前列腺增生
- E.神经源性膀胱

99.婴儿,8月龄。因皮肤黏膜苍白,食欲欠佳来诊。查体发现肝脾轻度肿大。化验:Hb 70 g/L,RBC $3.5 \times 10^{12}/L$,血涂片可见RBC大小不等,以小细胞为主,中心淡染区扩大,最可能的诊断是

- A.地中海贫血
- B.再生障碍性贫血
- C.铁粒幼红细胞性贫血
- D.营养性巨幼细胞性贫血
- E.营养性缺铁性贫血

100.男婴,9月龄。3天来腹泻,6~8次/日,为黄色水样便,呕吐3~5次/日,为胃内容物,尿量减少,哭时少泪。查体:精神萎靡,口唇干燥,呼吸略深长,皮肤弹性差,眼窝及前囟明显凹陷,血钠132 mmol/L。最可能的诊断是

- A.重度低渗性脱水
- B.中度低渗性脱水
- C.中度等渗性脱水
- D.重度等渗性脱水
- E.轻度等渗性脱水

101.女,26岁。病史不清,昏迷不醒、抽搐来就诊,查体:呼吸困难、皮肤湿冷、瞳孔明显缩小,下列哪种疾病可能性大

- A.CO中毒

- B.阿托品中毒
- C.巴比妥类药物中毒
- D.有机磷中毒
- E.脑血管意外

102.北方农村某农户,冬季采用炉灶取暖,家中老人晨起后感到胸闷,呼吸困难,皮肤黏膜呈樱桃红色,引起这些症状的污染物最可能是

- A.二氧化氮
- B.甲醛
- C.一氧化碳
- D.二氧化碳
- E.二氧化硫

103.1990年,某城市有麻疹暴发流行。经调查发现,此时期有大量的流动儿童迁入。从人群易感性角度考虑,这主要是因为

- A.免疫人口减少
- B.免疫力自然消退
- C.易感人群迁入
- D.隐性感染减少
- E.儿童比例增加

104.某临床医生欲调查某社区近期最主要的公共卫生问题及其影响因素,进行社区诊断时最常使用的流行病学调查方法是

- A.暴发调查
- B.现况调查
- C.个案调查
- D.问卷调查
- E.典型调查

105.20世纪80年代,发现某省部分地区的居民因长期饮用深井高碘水导致高碘性甲状腺肿,随即抽查得到该地区甲、乙两村常住居民的高碘性甲状腺肿患病率,甲村为20.6%,乙村为25.3%,则甲乙两村该病的合计患病率应为

- A.甲乙两村调查人群中患该病总人数除以调查总人数
- B.两患病率的几何平均数,得29.11%
- C.两患病率相加,得45.9%
- D.两个患病率相乘,得5.21%

E.两患病率的平均数,为 22.95%

106.对于一个没有戒烟愿望的人,要改变其吸烟行为,根据行为转变阶段理论,下列哪项干预方法效果更好

- A.提供怎样戒烟的具体方法
- B.提高他对吸烟危害的认识,产生戒烟愿望
- C.进行经济限制
- D.进行意志力的培养
- E.制定政策控烟

107.小儿,8 月龄。健康状况良好,应接种的疫苗是

- A.卡介苗
- B.流脑疫苗
- C.麻疹减毒活疫苗
- D.百白破混合药剂
- E.脊髓灰质炎减毒活疫苗

108.某人因工作压力大,多年来经常反复出现心烦、心搏过速、胸部不适、出汗,经心电图、血压、血脂、心脏多普勒检查均正常。这个患者的反应有可能为

- A.躯体疾病

A3/A4 型选择题 (111~150 题)

B.心身障碍

C.心理症状

D.神经衰弱

E.精神疾病

109.某地卫生计生部门对其乡镇卫生院在医疗废物集中处置专项检查,按照相关规定,医疗机构对其医疗废物暂时贮存的时间不得超过

- A.2 天
- B.3 天
- C.5 天
- D.6 天
- E.7 天

110.处方开具当日有效,特殊情况下需延长有效期的,有开具处方的医师注明有效期限,单有效期最长不得超过

- A.1 天
- B.2 天
- C.3 天
- D.4 天
- E.5 天

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道试题。请根据案例所提供的信息,在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(111~113 题共用题干)

女,44 岁。4 周来反复胸痛,发作与劳累及情绪有关,休息可以缓解。4 h 前出现持续性疼痛,进行性加剧,并气促,不能平卧,血压 110/70 mmHg,心率 130 次/min,律齐,心尖部可闻及 3/6 级收缩期杂音,双肺散在哮鸣音及湿啰音。

111.根据上述临床表现,该患者的诊断最可能是

- A.风湿性心脏病二尖瓣关闭不全
- B.扩张型心肌病
- C.支气管哮喘
- D.肺部感染
- E.急性心肌梗死并发左心衰竭

112.首选检查为

- A.X 线胸片
- B.心电图
- C.超声心动图

D.造影

E.心肌核素扫描

113. 首选治疗方案应为

A. β 受体阻滞剂预防室性心律失常

B. 抗生素控制感染

C. 洋地黄类药物

D. 肾上腺皮质激素减轻支气管痉挛

E. 吗啡和利尿剂

(114~115 题共用题干)

男,64 岁。突发心悸 4 h 就诊。心电图示:P 波消失,代之以 f 波,心室率 130 次/min,节律绝对不规则。

114. 该患者最可能的心律失常为

A. 阵发性室上性心动过速

B. 窦性心律不齐

C. 心房颤动

D. 频发室性期前收缩

E. 心房扑动

115. 为减慢心室率,应选择的药物是

A. 美托洛尔

B. 阿托品

C. 沙丁胺醇

D. 利多卡因

E. 新斯的明

(116~118 题共用题干)

男,41 岁。淋雨后发热、咳嗽 2 天,右上腹痛伴气急、恶心 1 天。

116. 除考虑急腹症外,重点鉴别的疾病是

A. 自发性气胸

B. 肺梗死

C. 肺炎链球菌肺炎

D. 肺结核

E. 膈神经麻痹

117. 体检应注意有无

A. 右上腹肌紧张

B. 上腹部压痛

C. 肺肝浊音界

D. 肺部异常呼吸音

E. 肠鸣音

118. 治疗首选药物是

A. 阿奇霉素

B. 庆大霉素

C. 青霉素

D. 头孢他啶

E. 胃肠道解痉剂

(119~121 题共用题干)

男,67 岁。慢性咳嗽、咳痰 20 多年,活动后气急 4 年。查体:双肺散在干、湿啰音,心脏正常。血 WBC $9.0 \times 10^9/L$,胸片双肺中下叶纹理增强。

119. 此患者最可能的诊断是

A. 支气管哮喘

B. 支气管扩张

C. 慢性阻塞性肺疾病

D. 细菌性肺炎

E. 支气管内膜结核

120. 该患者做胸部 X 线检查目的

A. 确定诊断

B. 了解病情变化

C. 帮助判定预后

D. 疗效的客观指标

E. 鉴别诊断和确定有无并发症

121. 该患者最主要的治疗措施是

A. 支气管舒张剂应用

B. 糖皮质激素应用

C. 低流量吸氧

D. 控制感染

E. 中药治疗

(122~124 题共用题干)

男,25 岁。突感上腹部剧痛。查体:血压

130/80 mmHg, 脉搏 110 次/min, 板状腹, 肠鸣音消失。Hb 120 g/L, WBC $8.0 \times 10^7/L$ 。

122. 首先应采取的检查为

- A. 腹部立位 X 线平片
- B. 腹部 B 超
- C. 腹腔穿刺
- D. 腹部 MRI
- E. 腹部 CT

123. 以下提示病情危险的是

- A. 恶心、呕吐频繁
- B. 体温持续升高, 寒战
- C. 脉搏加快, 体温上升
- D. 腹痛加重, 大汗淋漓
- E. 脉搏加快, 体温下降

124. 若腹穿抽出较多液体, 应尽早采取的治疗措施是

- A. 胃肠减压、输液
- B. 镇痛镇静治疗
- C. 全身应用抗生素
- D. 输液, 纠正水、电解质、酸碱失衡
- E. 手术探查

(125~126 题共用题干)

男, 40 岁。腹腔积液 1 个月, 6 天前反复呕血、黑便, 经抢救治疗后好转, 稳定, 近日来嗜睡、认人不清。

125. 下列诊断最合适的是

- A. 贫血
- B. 失血性休克
- C. 氮质血症
- D. 电解质紊乱
- E. 肝性脑病

126. 下列检查对诊断最有帮助的是

- A. 脑电图
- B. 扑翼震颤
- C. 血氨

D. 诱发电位

E. 脑 CT

(127~128 题共用题干)

男, 36 岁。12 h 前工作中突然出现右上腹痛, 继之出现豆油色尿, 半小时前出现上腹痛向腰背部放射, 俯首弯腰可减轻腹痛, 血压 120/80 mmHg, 呼吸 18 次/min。

127. 下列检查哪项可能出现异常且最有意义

- A. 心电图
- B. 血淀粉酶
- C. X 线腹部平片
- D. 肝脏 B 超
- E. 血脂肪酶

128. 下列诊断哪项可能性最大

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性胰腺炎
- C. 肾绞痛
- D. 阑尾穿孔
- E. 肠系膜血管栓塞

(129~130 题共用题干)

女, 26 岁。间歇性牙龈出血伴月经过多 1 年。查体: 双下肢可见散在出血点及紫癜, 肝脾不大。血红蛋白 120 g/L, 红细胞 $4.6 \times 10^{12}/L$, 白细胞 $5.5 \times 10^9/L$, 分类正常, 血小板 $25 \times 10^9/L$ 。

129. 若确诊首先应

- A. 出血时间测定
- B. D-二聚体测定
- C. 血小板相关抗体测定
- D. 骨髓象检查
- E. 血 VWF 测定

130. 若骨髓穿刺结果示: 骨髓增生活跃, 粒: 红 = 3 : 1, 颗粒巨核细胞及以上阶段的原始巨核细胞或幼稚巨核细胞明显增生, 而产血

小板巨核细胞明显减少,则最符合的诊断为

- A.脾功能亢进
- B.特发性血小板减少性紫癜
- C.过敏性紫癜
- D.骨髓增生异常综合征
- E.再生障碍性贫血

(131~133 题共用题干)

男,23岁。神志不清3h入院,既往患1型糖尿病4年,长期皮下注射胰岛素,近4天因腹泻而停用。查体:血压70/50mmHg,皮肤中度失水征,呼吸深大,有烂苹果味,心率130次/min。

131.最可能的诊断是

- A.糖尿病高渗性昏迷
- B.糖尿病酮症酸中毒
- C.糖尿病乳酸性酸中毒
- D.低血糖昏迷
- E.肺部感染

132.最可能与诊断无关的检查是

- A.血气分析
- B.血电解质测定
- C.血糖
- D.尿糖、尿酮
- E.血培养

133.需立即采取的治疗措施是

- A.手术治疗
- B.纠正电解质紊乱
- C.补液并恢复皮下注射胰岛素
- D.补液加有效的抗生素
- E.补液同时静脉滴注胰岛素

(134~135 题共用题干)

男,58岁。高血压病史,演讲时突发头痛、呕吐、右侧偏瘫,行头CT检查示左基底节区高密度影。

134.最可能的诊断是

- A.脑出血
- B.蛛网膜下腔出血
- C.动脉瘤破裂
- D.短暂性脑缺血发作
- E.脑血栓形成

135.此时应迅速给予

- A.止血治疗
- B.降血压治疗
- C.降颅压治疗
- D.维持生命体征
- E.防治血管痉挛

(136~137 题共用题干)

女,24岁。2年来有发作性神志丧失,四肢抽搐,服药不规律。今日凌晨开始又有发作,意识一直不清醒。来院后又有一次四肢抽搐发作。

136.首先应选用的治疗药物是

- A.地西泮10mg静注
- B.苯妥英钠0.25g肌注
- C.地西泮20mg肌注
- D.副醛5mL灌肠
- E.苯巴比妥0.5g肌注

137.患者目前处于下列哪一种状态

- A.癫痫持续状态
- B.癫痫强直-阵挛发作
- C.单纯部分发作继全面性发作
- D.复杂部分发作继全面性发作
- E.癫痫发作后昏睡期

(138~139 题共用题干)

女,72岁。摔伤右腕部,既往全身情况良好。查体:右下肢缩短,外旋畸形,下肢轴向叩击痛阳性。

138.最可能的诊断是

- A.髋关节后脱位
- B.股骨干骨折

- C. 髋部软组织损伤
- D. 股骨颈骨折
- E. 髋关节前脱位

139. 首选的检查方法是

- A. X 线片
- B. 核素扫描
- C. 关节造影
- D. MRI
- E. CT

(140~141 题共用题干)

患儿,9 岁。眼睑水肿 4 天,近 2 日加重,水肿渐及全身,尿少,今晨感觉上腹部不适,频咳,气急。查体:体温 37.5℃,眼睑及下肢水肿,血压 150/100 mmHg,心率 116 次/min,心音钝,双肺闻及水泡音,肝肋下 2.0 cm。尿常规:蛋白(++),红细胞 20~30 个/HP,血尿素氮 6 mmol/L。

140. 诊断考虑为

- A. 急性肾炎伴肺炎
- B. 急性肾炎伴肾功能不全
- C. 急性肾炎伴循环充血
- D. 急性肾炎伴高血压脑病
- E. 急性肾炎伴心肌炎

141. 该病急性期应卧床休息至

- A. 血沉降至正常
- B. 抗“O”恢复正常
- C. 肉眼血尿消失,血压正常
- D. 镜下血尿消失,水肿消退
- E. 尿 Addis 计数正常

(142~143 题共用题干)

新生儿,生后第 3 天,家长发现患儿双眼发红流泪,且伴有大量脓性分泌物。查体:双眼睑高度水肿,结膜充血水肿,结膜囊可见大量黄绿色脓性分泌物,角膜清,余检查不配合。

142. 该患儿最可能的诊断是

- A. 春季结膜炎
- B. 新生儿淋球菌性结膜炎
- C. 病毒性结膜炎
- D. 包涵体性结膜炎
- E. 过敏性结膜炎

143. 本病的治疗原则不包括

- A. 急性期应包扎患眼
- B. 滴眼液滴眼
- C. 眼膏涂眼
- D. 必要时结膜囊冲洗
- E. 根据病情选用全身治疗

(144~145 题共用题干)

女,29 岁。右乳红肿 3 个月。查体:右乳皮肤红肿,呈橘皮样改变,未触及肿块,右腋窝可触及多个肿大、质硬、融合淋巴结。皮肤活检在真皮淋巴管内查见癌栓,ER、PR 阳性,C-erbB2(HER2)阴性。

144. 最可能的诊断是

- A. 炎性乳腺癌
- B. 黏液腺癌
- C. 乳头状癌
- D. 髓样癌
- E. 乳头湿疹样乳腺癌

145. 关于本病的预防,下列说法错误的是

- A. 病因尚不清楚,目前没有效果明确的预防措施
- B. 定期体检有利于早期发现
- C. 乳腺癌发病高危因素的女性更应注意定期体检
- D. 早期诊断、早期治疗有利于改善患者预后
- E. 发现、治疗的早晚对患者病情无明显影响

(146~147 题共用题干)

男,55 岁。因高热 1 天来诊。查体:精神

萎靡,四肢末梢凉,T36.9℃,BP 80/50 mmHg,右肺下背部呼吸音弱,未闻啰音,右上腹触痛(±)。

146.考虑诊断可能是

- A.急性胆道感染并感染性休克
- B.肺炎并感染性休克
- C.肝脓肿并感染性休克
- D.右气胸并休克
- E.休克原因待查

147.须即刻做的是

- A.病情危重,向家属交待预后不良
- B.静滴高效、广谱低毒抗生素
- C.采血验血白细胞和分类、肾功能等
- D.静滴血管活性药物并补液
- E.床头摄胸 X 线片,做肝胆 B 超

(148~150 题共用题干)

女,25岁,已婚。急诊入院时已处于休克状态。查体见腹部膨隆。妇科检查:后穹隆饱满,子宫软,正常大小,有漂浮感,双附件触诊不满意。

148.首先应向家属询问的是

- A.有无婚育史
- B.避孕史
- C.有无停经史
- D.有无腹痛
- E.有无性生活史

149.下列哪一项体征对进一步处理最有意义

- A.子宫软硬度
- B.宫颈着色程度
- C.黑格征是否存在
- D.宫颈口开大程度
- E.宫颈摇摆痛

150.首先的处理是

- A.给予大量止血剂
- B.边抗休克边剖腹探查
- C.边抗休克边清宫
- D.急抗休克,待休克好转后清宫
- E.急查 B 型超声,以明确出血原

第二单元

A1 型选择题(1~101 题)

答题说明

每一道试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 以下各项属于影响传染病流行过程的自然环境因素的是

- A. 社会制度
- B. 地貌水文
- C. 经济水平
- D. 文化教育
- E. 卫生服务

2. 健康教育的目标之一是使社区内高血压患者减少食用盐的摄入量,每日食用盐的摄入量控制在 6 g 以内,则健康教育的主要对象是

- A. 副食店的售货员和小商小贩
- B. 高血压患者及其家属
- C. 小学师生
- D. 街道办事处工作人员
- E. 食堂的工作人员

3. 关于 2 型糖尿病健康指导,不正确的是

- A. 饮食控制
- B. 运动治疗
- C. 控制体重
- D. 保持心态
- E. 大量运动

4. 糖尿病饮食治疗下列各项正确的是

- A. 病情轻可以不用饮食治疗
- B. 有并发症者不用饮食治疗
- C. 用药治疗时,可不用饮食治疗
- D. 肥胖者宜给高热量饮食治疗
- E. 不论病情轻重都需饮食治疗

5. 居民健康档案建立的对象是

- A. 辖区所有人员
- B. 辖区部分人员
- C. 辖区内居住半年以上的户籍居民
- D. 辖区内居住半年以上的户籍居民及非户籍居民
- E. 流动人员

6. 进行学龄前儿童健康管理时,为 4~6 岁儿童每年提供健康管理服务的次数是

- A. 1 次
- B. 2 次
- C. 3 次
- D. 4 次
- E. 5 次

7. 婴儿期指的是

- A. 从出生到 1 周岁之前
- B. 从出生后 28 天到满 1 周岁之前
- C. 从出生 1 个月到 1 周岁之前
- D. 从 1 周岁到 2 周岁之前
- E. 从 1 周岁到 3 周岁之前

8. 孕产期保健不包括

- A. 婚前保健
- B. 孕前保健
- C. 孕早期保健
- D. 孕中晚期保健
- E. 产褥期保健

9. 《中国老年人膳食指南》提出老年人运动的四项原则不包括

- A.安全
B.全面
C.自然
D.适度
E.定时
- 10.乡村医生可采用电话随访严重精神障碍患者,但应保证至少每半年当面随访几次
- A.1次
B.3次
C.5次
D.6次
E.10次
- 11.多环芳烃对人体的主要危害是
- A.刺激作用
B.致敏作用
C.致畸胎作用
D.对肝肾的损害
E.致癌作用
- 12.烟草烟雾中主要有毒有害物质包括一氧化碳、尼古丁和
- A.芳香烃
B.烟焦油
C.黄曲霉素
D.氮氧化物
E.酚类化合物
- 13.“春夏养阳,秋冬养阴”是属于哪一种养生原则
- A.顺应自然
B.养性调神
C.护肾保精
D.调摄饮食
E.体魄锻炼
- 14.在饮食养生中,饮食三宜是指
- A.食宜少,食宜凉,食宜细嚼细咽
B.食宜凉,食宜淡,食宜细嚼细咽
C.食宜少,食宜甜,食宜细嚼细咽
D.食宜咸,食宜润,食宜细嚼细咽
E.食宜软,食宜温,食宜细嚼细咽
- 15.不属于中医预防与养生保健基本原则的是
- A.动静互涵,协调平衡
B.重视先兆,防微杜渐
C.天人相应,顺应自然
D.形神合一,形神共养
E.冬病夏治,夏病冬治
- 16.在过敏性疾病易发期可采取的中医干预措施是
- A.开展食疗
B.发放艾叶燃熏
C.发放板蓝根等中药煎水服用
D.指导运动训练
E.中药熏鼻喷喉
- 17.哺乳期若乳汁不足,可多喝
- A.鱼汤、鸡汤、猪蹄汤
B.生姜羊肉汤
C.益母草红糖水
D.猪腰子菜末粥
E.山药扁豆梗米粥
- 18.世界卫生组织健康的“四大基石”不包括
- A.充足睡眠
B.合理膳食
C.戒烟限酒
D.心理平衡
E.适量运动
- 19.中风的发病好发年龄为
- A.60岁以上
B.30岁以上
C.50岁以上
D.40岁以上
E.55岁以上
- 20.下列各项,属于中风先兆症状的是

- A.鼻痒、喷嚏、胸闷
B.高热、寒战
C.眩晕、胸闷
D.头痛、恶心呕吐、眼球震颤
E.头晕、头痛、一侧肢体麻木
- 21.痹证发病特点为不分年龄、性别,但易罹患于
- A.青壮年和体力劳动者、运动员以及体育爱好者
B.儿童
C.老年人
D.体弱多病者
E.冠心病患者
- 22.嗜食肥甘厚味,易形成
- A.火旺体质
B.痰湿体质
C.心气虚体质
D.脾气虚体质
E.肝郁体质
- 23.痰湿体质总体特征是
- A.脾气暴躁
B.形体消瘦
C.腹部肥满
D.口苦口干
E.面垢油光
- 24.平和质的发病倾向是
- A.平素患病较少
B.易患感冒、内脏下垂等病
C.易患消渴、中风、胸痹等病
D.易患虚劳、失精、不寐等病
E.易患脏躁、梅核气、百合病等
- 25.阴虚质对外界环境的适应能力是
- A.耐夏不耐冬,易感风、寒、湿邪
B.耐冬不耐夏,不耐受暑、热、燥邪
C.对自然环境和社会环境适应能力较强
D.对精神刺激适应能力较差,不适应阴雨

天气

E.对夏末秋初湿热气候、湿重或气温偏高环境较难适应

26.特禀质的总体特征是

- A.以生理缺陷、过敏反应等为主
B.以神情抑郁、忧虑脆弱等为主
C.以口燥咽干、手足心热等为主
D.以畏寒怕冷、手足不温等为主
E.以面垢油光、口苦、苔黄腻等为主

27.表现为面部皮肤油脂较多,多汗且黏,胸闷,痰多,口黏腻或甜,喜食肥甘甜黏,苔腻,脉滑的体质是

- A.平和质
B.气虚质
C.阳虚质
D.阴虚质
E.痰湿质

28.老年人易患感冒、内脏下垂等病,病后康复缓慢。符合的体质类型是

- A.血瘀质
B.气郁质
C.湿热质
D.气虚质
E.痰湿质

29.老年人心理特征表现为性格外向,易急躁。其体质是

- A.血瘀质
B.气郁质
C.阳虚质
D.阴虚质
E.痰湿质

30.老年人常见哮喘、风团、咽痒、鼻塞、喷嚏等表现。其体质是

- A.血瘀质
B.气郁质
C.阳虚质

- D.阴虚质
E.特禀质
- 31.依据儿童中医体质调养服务流程,向家长传授按揉迎香穴方法的时间是
- A.1,6月龄
B.6,12月龄
C.12,18月龄
D.18,24月龄
E.24,30月龄
- 32.下列关于小儿的中医理论叙述,错误的是
- A.脏腑娇嫩
B.发育迅速
C.形气充满
D.生机蓬勃
E.形气未充
- 33.儿童中医保健方法中具有宣通鼻窍作用的是
- A.摩腹
B.捏脊
C.按揉迎香穴
D.按揉四神聪穴
E.揉腹
- 34.医师在执业活动中享有的权利之一是
- A.宣传普及卫生保健知识
B.尊重患者隐私权
C.人格尊严、人身安全不受侵犯
D.努力钻研业务,及时更新知识
E.爱岗敬业,努力工作
- 35.《医疗机构管理条例》规定的医疗机构执业规则是
- A.符合医疗机构的基本标准
B.按照核准登记的诊疗科目开展诊疗活动
C.符合区域医疗机构设置规划
D.能够独立承担民事责任
E.可进行执业登记
- 36.某医疗机构对有能力诊治的危重患者应该采取的处置措施是
- A.办理住院手续
B.抢救
C.报告当地卫生行政部门
D.报告当值院领导
E.转院
- 37.对于心理的解释,不正确的是
- A.客观现实是心理的源泉
B.心理是人脑对客观现实的反应
C.心理是对客观现实主观的反应
D.心理是对现实的客观反应
E.心理反应具有能动性
- 38.医学心理学的基本观点不包括
- A.遗传决定论的观点
B.主动适应与调节的观点
C.情绪因素作用的观点
D.个性特征作用的观点
E.认知评价的观点
- 39.心身疾病的诊断标准不包括
- A.根据临床症状、体征和特殊检查明确器质性改变
B.疾病的发生有相平行的心理社会因素
C.排除神经症和精神疾病
D.单纯的生物医学疗法收效甚微
E.由某种躯体疾病引发心理障碍
- 40.不属于患者权利的内容是
- A.受到社会尊重和理解
B.遵守医疗部门规章制度
C.享受医疗服务
D.保守个人秘密
E.免除或部分免除健康时的社会责任
- 41.医疗机构为预防传染病院内传播应承担的职责是
- A.实施传染病预防控制规划

- B.收集和分析传染病疫情信息
C.对传染病预防工作进行指导
D.流行病学调查
E.医疗废物处理
- 42.医疗机构对限于设备或者技术条件不能诊治的患者,应当依法采取的措施是
A.立即抢救
B.及时转诊
C.继续观察
D.提请上级医院派人会诊
E.请示当地卫生局依法处理
- 43.下列中国古代医德思想中不包括
A.仁爱救人,赤诚济世的行医宗旨
B.不图名利,清廉正直的道德品质
C.探索研究,大胆创新的敬业精神
D.普同一等,一心赴救的服务态度
E.注重自律,忠于医业的献身精神
- 44.国家鼓励境内外组织和个人通过
A.开办中医药教育机构发展中医药事业
B.开办中医医疗机构发展中医药事业
C.捐资、投资等方式扶持中医药事业发展
D.以国家为主投资开办中医医疗机构
E.以民间投资为改革方向开办中医医疗机构
- 45.作为中医药专家学术经验和专业技术专长继承工作的继承人应当具备的学历条件是
A.硕士
B.大学本科
C.大学专科
D.高中毕业
E.无要求
- 46.实行家庭签约服务,是实现从()到()转变的重要抓手
A.以治病为中心,以预防为中心
B.以治病为中心,以健康为中心
C.以治病为中心,以康复为中心
D.以预防为中心,以健康为中心
E.以预防为中心,以康复为中心
- 47.为促进中医药事业的发展,对其保障措施中,以下描述不正确的是
A.医保支持
B.经费支持
C.文献保护
D.西药保护
E.中药材保护
- 48.症见阴部瘙痒,带下色黄臭秽,舌红苔黄腻,脉弦数。证属
A.肝郁气滞
B.肝火炽盛
C.胆郁痰扰
D.肝胆湿热
E.湿热蕴脾
- 49.中医学的基本特点,主要是
A.阴阳五行与藏象经络
B.整体观念与辨证论治
C.以五脏为主的整体观
D.望闻问切与辨证论治
E.辨证求因与审因论治
- 50.下列各项中,属于阴的是
A.脉象洪大
B.面色鲜明
C.迟脉
D.脉象滑数
E.声高
- 51.以下属于“疾病”的是
A.痢疾
B.角弓反张
C.心血不足
D.恶寒发热
E.脉象沉迟
- 52.下述各项,属于里证辨证要点的是
A.见于外感疾病的中、后期阶段

- B.新起恶寒发热并见
C.一般病情较轻
D.病位较浅
E.病程较短
- 53.戴阳证患者的表现为
A.面黄隐隐
B.面色红赤
C.面色淡白
D.面色淡青
E.面色苍白,颧颊部嫩红如妆
- 54.热扰神明,或颅内压增高时的临床表现是
A.吐势徐缓,声音微弱,呕吐物清稀
B.吐势较猛,声音壮厉,呕吐出黏稠黄水,或酸或苦
C.呕吐呈喷射状
D.呕吐酸腐味食糜
E.口干欲饮,饮后则吐
- 55.舌苔由薄转厚提示
A.内伤病轻
B.正气胜邪
C.邪气渐盛
D.胃气暴绝
B.外感初起
- 56.口气臭秽者的临床意义是
A.食积胃肠
B.胃热
C.内有溃腐脓疡
D.牙疮
E.寒邪犯胃
- 57.前额头痛连及眉棱骨属于
A.阳明头痛
B.少阳头痛
C.太阳头痛
D.厥阴头痛
E.太阴头痛
- 58.三部脉举之无力,按之空豁的脉是
A.浮脉
B.沉脉
C.细脉
D.虚脉
E.微脉
- 59.半表半里证的特有表现是
A.腹痛吐泻
B.口渴喜饮
C.胸胁苦满
D.鼻塞流涕
E.小便清长
- 60.分布于上肢外侧前缘的经脉是
A.手少阴肺经
B.手阳明大肠经
C.手厥阴心包经
D.手少阳三焦经
E.手太阳小肠经
- 61.肝阳头痛的治法是
A.疏风清热和络
B.祛风胜湿通窍
C.平肝潜阳息风
D.健脾燥湿化痰
E.疏风散寒止痛
- 62.热邪犯肺,肺津被灼时的临床表现是
A.咳声重浊沉闷
B.咳声轻清低微
C.咳声不扬,痰稠色黄,不易咯出
D.咳有痰声,痰多容易咯出
E.干咳无痰或少痰
- 63.下列各项,对于鉴别普通感冒与时行感冒无意义的是
A.病情轻重
B.有无流行性
C.有无传变
D.病程长短及预后

E.有无发热

64.瘀血致痛的特点是

A.胀痛

B.刺痛

C.重痛

D.走窜痛

E.空痛

65.下列不属于肝阳头痛的症候表现是

A.头昏胀痛,两侧为重

B.心烦易怒,夜寐不宁

C.遇风尤剧

D.口苦面红,或兼胁痛

E.舌红苔黄,脉弦数

66.驱虫药的服用时间是

A.饭前服

B.清晨空腹服

C.饭后服

D.定时服

E.睡前服

67.循行于下肢外侧中线的经脉是

A.胆经

B.脾经

C.胃经

D.膀胱经

E.三焦经

68.不寐心胆气虚证的治法是

A.疏肝泻火

B.补益心脾

C.滋阴降火

D.养血安神

E.安神定志

69.肝阳头痛证常选用的中成药是

A.天麻钩藤颗粒

B.脑安胶囊

C.川芎茶调散

D.头风痛胶囊

E.天王补心丹

70.疝病好发于下列除哪项外

A.习惯性便秘者

B.消渴病者

C.营养不良者

D.臀部

E.四肢

71.下列不是月经先后无定期肝郁证表现的是

A.腰骶酸痛,头晕耳鸣

B.经量或多或少

C.色暗红或紫红,或有血块

D.胸胁、乳房、少腹胀痛

E.脘闷不舒,时叹息,暖气食少

72.推拿疗法以推三关、补脾土、补大肠、摩腹、推上七节骨、捏脊为原则,治疗小儿泄泻的适应证是

A.风寒泄泻

B.风热泄泻

C.湿热泄泻

D.伤食泄泻

E.脾虚泄泻

73.关于针刺注意事项的叙述,正确的是

A.小儿囟门可针刺

B.妇女怀孕者可针刺小腹部

C.皮肤有肿瘤的部位可针刺

D.身体虚弱、气血亏虚者针刺手法宜重

E.胸、胁、腰、背脏腑所居之处不宜直刺、深刺

74.治疗婴幼儿风寒泄泻,常选用的中成药是

A.藿香正气液

B.葛根芩连微丸

C.小儿化食丸

D.健脾八珍糕

E.保和丸

75. 与含莨菪烷类生物碱的中药合用后可增加毒性的西药有

- A. 异烟肼
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 强心苷类
- D. 氯丙嗪
- E. 氨茶碱

76. 婴幼儿患者合理使用中药的原则不包括

- A. 不宜滥用滋补之品
- B. 宜佐凉肝定惊之品
- C. 宜佐健脾和胃之品
- D. 宜用大补之品
- E. 用药及时, 用量要轻

77. 用于治疗恶寒壮热, 头痛咽干, 小便短赤, 大便秘结, 疮痍初起, 风疹湿疮的中成药是

- A. 双清口服液
- B. 葛根芩连丸
- C. 正柴胡饮颗粒
- D. 桂枝合剂
- E. 防风通圣丸

78. 速效救心丸的功效是

- A. 理气, 宽胸, 止痛
- B. 行气活血, 祛瘀止痛
- C. 散瘀止血, 消肿止痛
- D. 芳香温通, 益气强心
- E. 益气和中, 通络止痛

79. 可以治疗体倦乏力、子宫脱垂的中成药是

- A. 左归丸
- B. 生脉饮
- C. 补中益气丸
- D. 二陈丸
- E. 玉屏风颗粒

80. 食积停滞, 脘腹胀满, 噎腐吞酸应选用

- A. 保和丸

B. 枳实导滞丸

C. 血府逐瘀口服液

D. 六味安消散

E. 抗栓再造丸

81. 茵栀黄口服液的功效是

- A. 清热解毒, 利湿退黄
- B. 清湿热, 利小便
- C. 清热, 祛湿, 利胆
- D. 清热化湿, 行气止痛
- E. 清热解毒, 凉血通淋

82. 不属于妇科千金片注意事项的是

A. 青春期少女、哺乳期妇女应在医师指导下服用

下服用

- B. 忌食辛辣厚味之品
- C. 糖尿病患者慎用
- D. 寒凝血瘀者宜用
- E. 过敏体质者慎用

83. 适用秋季腹泻及迁延性、慢性腹泻的中成药是

- A. 启脾丸
- B. 肥儿宝颗粒
- C. 健儿口服液
- D. 小儿泻速停颗粒
- E. 龙牡壮骨颗粒

84. 连翘败毒丸的功效是

- A. 清热解毒, 消肿止痛
- B. 清热解毒, 凉血祛湿
- C. 清热解毒, 活血消肿
- D. 清热解毒, 祛风化湿
- E. 清热解毒, 凉血泻热

85. 跌打丸的功效是

- A. 活血散瘀, 消肿止痛
- B. 化瘀止血, 活血止痛
- C. 舒筋活络, 活血散痛
- D. 活血化瘀, 接骨续筋
- E. 化瘀消肿, 止痛止血

- 86.有关鼻炎康片的描述,不正确的是
- A.具有清热解毒、宣肺通窍、消肿止痛功能
- B.孕妇慎用
- C.适用于过敏性鼻炎属虚寒证者
- D.用药期间不宜驾驶车辆、管理机械及高空作业
- E.高血压病、心脏病等患者,应在医师指导下服用
- 87.能解表通里、清热解毒的中成药是
- A.葛根芩连丸
- B.清热解毒口服液
- C.防风通圣丸
- D.牛黄解毒丸
- E.双清口服液
- 88.保和丸既能消食导滞,又能
- A.健脾消食
- B.行气消痞
- C.行气利水
- D.和胃
- E.通络止痛
- 89.杞菊地黄丸的主治是
- A.阴虚火旺
- B.气血两虚,脾肺不足
- C.肺肾两亏
- D.肝肾阴亏
- E.气阴两亏
- 90.七厘散的功效是
- A.活血化瘀,接骨续筋
- B.活血散瘀,消肿止痛
- C.活血止痛,解毒消肿
- D.舒经活络,活血散瘀
- E.化瘀消肿,止痛止血
- 91.更年安片既能滋阴清热,又能
- A.补气养血
- B.养血调经
- C.除烦安神
- D.活血止痛
- E.养心安神
- 92.影响药物排泄的中西药联用药组是
- A.风痛药酒与二甲双胍
- B.牛黄解毒片与利福平
- C.银杏叶胶囊与地高辛
- D.补中益气丸与环磷酰胺
- E.大山楂丸与阿司匹林
- 93.下列哪一项不属于疖的特点
- A.色红、灼热、疼痛
- B.突起根浅
- C.肿势局限
- D.范围多在 2 cm 以下
- E.易脓、易溃、易敛
- 94.月经先后无定期的常见病因是
- A.肝郁
- B.血虚
- C.血瘀
- D.气滞
- E.虚寒
- 95.用于肝郁脾虚引起的月经不调的是
- A.固经丸
- B.乌鸡白凤丸
- C.逍遥丸
- D.女金丸
- E.艾附暖宫丸
- 96.有清热燥湿、活血消肿、祛腐生肌的功能,主要用于治疗湿热瘀阻所致痔疮的中成药是
- A.槐角丸
- B.地榆槐角丸
- C.地榆散
- D.马应龙麝香痔疮膏
- E.肛泰
- 97.知柏地黄丸的功效是

- A.温肾敛肺
- B.温肾益精
- C.温肾纳气
- D.滋阴降火
- E.温补气血

98.下列中成药既可治疗跌打损伤又可以治疗皮肤感染性疾病的是

- A.七厘散
- B.云南白药胶囊
- C.舒筋活血片
- D.跌打丸
- E.活血止痛片

99.艾附暖宫丸除调经外又能

- A.养血安神
- B.健脾益气
- C.理气养血

A2型选择题(102~143)

- D.疏肝健脾
- E.除湿止带

100.藿香正气水的功效是

- A.清热解暑,祛湿生津
- B.解表化湿,理气和中
- C.解表散寒,宣肺止嗽
- D.祛暑除湿,和胃消食
- E.清肺止咳,化痰通便

101.用于病毒性感冒,咽喉肿痛的中成药是

- A.参苏丸
- B.荆防颗粒
- C.清开灵口服液
- D.午时茶颗粒
- E.感冒清热颗粒

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的,其下面都有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

102.男孩,3岁。此阶段的健康教育重点是

- A.先天缺陷的筛查
- B.母乳喂养和辅食添加
- C.传染病和意外伤害的预防
- D.预防接种
- E.智力开发

103.某山区为碘缺乏病的流行地区,如果已经引起了群众的重视,但群众不了解病因,应重点采取哪项措施

- A.利用媒体宣传,引起注意
- B.积极强化正确的行为
- C.提供碘盐的使用方法
- D.进行知识的普及教育
- E.积极调查涉及范围

104.某乡镇医生要想了解某种疾病在某地的危害情况,最初进行现况调查时,宜选用下列何种方法

- A.个案调查
- B.抽样调查
- C.普查
- D.典型病例调整
- E.住院病例调查

105.某地为了解某城市儿童龋齿的流行情况拟进行一次普查,要说明调查结果可用

- A.感染率
- B.罹患率
- C.患病率
- D.累积发病率
- E.发病率

106. 欲在某乡村进行糖尿病知识的健康教育。在基层,特别是在农村,仍然是比较普遍采用的健康信息传播方式,制作简便、成本低的宣传方式是

- A. 健康教育处方
- B. 小册子
- C. 折页
- D. 传单
- E. 黑板报、宣传栏

107. 健康教育的核心是帮助人们建立健康行为和生活方式。关于社区健康教育与健康促进特征描述,下列不正确的是

- A. 以促进社区居民健康为宗旨
- B. 以提高社区卫生机构经济效益为目标
- C. 以社区居民为对象
- D. 有组织、有计划、有评价的活动
- E. 以社区为单位

108. 某地相继发生多例以急性发病、高热、头痛等症状为主要临床表现的病因不明的疾病,被确定为突发公共卫生事件。当地乡卫生院以床位紧张为由,拒绝收治此类患者,被患者家属投诉。县卫生局经调查核实后,决定给予乡卫生院行政处罚。该处罚是

- A. 限期整改
- B. 责令改正
- C. 责令检测
- D. 警告
- E. 通报批评

109. 某医生在给乙型肝炎病毒(HBV)携带者注射时,不慎被患者用过的针头刺伤手指。为预防乙型肝炎病毒感染,应首先采取的措施是

- A. 注射抗生素
- B. 注射丙种球蛋白
- C. 注射乙型肝炎疫苗
- D. 注射乙肝免疫球蛋白

E. 注射 α 干扰素

110. 8 个月小儿进行麻疹疫苗免疫接种后第二天,接种部位出现 3 cm 红肿伴淋巴结轻度肿大,属于

- A. 局部反应阴性
- B. 局部中等反应
- C. 局部强反应
- D. 全身弱反应
- E. 全身中等反应

111. 女婴,10 月龄。此阶段的健康教育重点是

- A. 预防接种
- B. 意外伤害的预防
- C. 对贫血、营养缺乏、佝偻病等防治进行教育
- D. 预防传染病
- E. 防治发育迟缓、智力落后、语言障碍

112. 男,50 岁,高血压患者。对其给予降压治疗,下述哪项是不对的

- A. 除危重病例外,降压药物从小剂量开始
- B. 绝大多数患者需要长期用药
- C. 血压降至正常时,即可停药
- D. 首选第一线降压药物
- E. 根据个体化原则选用降压药物

113. 医生为某居民建立健康档案时询问其饮酒情况,村医告诉其饮酒行为属于

- A. 保健行为
- B. 预警行为
- C. 日常危害健康行为
- D. 避开有害环境行为
- E. 戒除不良嗜好行为

114. 女婴,10 月龄。因食欲差,母乳少,以米糊、稀饭喂养,未添加其他食物,诊断为营养不良 I 度。最先出现的症状是

- A. 身长低于正常
- B. 体重不增

- C.皮肤干燥
- D.皮下脂肪减少
- E.肌张力低下

115.医生在门诊遇到一位妊娠后期的孕妇,在指导产后的母乳喂养时,以下哪一项是不正确的

- A.越早开奶越好
- B.乳母要树立自己喂孩子的信心
- C.从出生后开始养成定时喂奶的习惯
- D.乳母要心情愉快
- E.一侧乳房吸空后再吸另一侧

116.女,23岁。月经周期规律,其末次月经为2017年5月17日,则其预产期为

- A.2018年2月28日
- B.2018年2月27日
- C.2018年2月26日
- D.2018年2月25日
- E.2018年2月24日

117.女,24岁,已婚。现为正常妊娠24周末,子宫底高度在

- A.脐下2横指
- B.脐下1横指
- C.平脐
- D.脐上1横指
- E.脐上2横指

118.男,60岁。患有感冒。告知其做好自我防护,护理应做到

- A.最好进冷食物
- B.常规用抗生素
- C.病要早治,药要早吃
- D.多食肉类、鱼、虾
- E.可以过度吸烟、饮酒

119.女,56岁。身高1.62m,体重75kg,最近一次测量空腹血糖值6.5mmol/L,甘油三酯4.25mmol/L。其具备的糖尿病高危因素是

- A.1项

- B.2项
- C.3项
- D.4项
- E.5项

120.某幼儿在预防接种门诊接种麻疹疫苗,针对其接种注意事项,下列说法错误的是

A.接种部位要避免瘢痕、炎症、硬结和皮肤病变处

B.接种前皮肤消毒禁用碘酊,可使用75%乙醇

C.在相同接种条件下剂量越大,免疫效果越好

D.一次性注射器使用后不得回套针帽

E.自毁型注射器使用后应立即放入安全盒中

121.男,50岁,糖尿病患者。采取相应的措施来保护其劳动能力、提高生活质量、延长寿命,这些措施属于

A.糖尿病一级预防

B.糖尿病二级预防

C.糖尿病三级预防

D.糖尿病临床前期预防

E.糖尿病病因预防

122.男,55岁。胸痛反复发作2个月,现胸部刺痛,夜间尤甚,持续10min左右,病处固定,多因生气及受寒后加重,时有心悸,舌质紫暗,脉象沉涩,首选方为

A.丹萎片

B.龙胆泻肝丸

C.血府逐瘀丸

D.乌头赤石脂丸

E.苏合香丸

123.患者为黎明前泄泻,完谷不化,腹部喜暖,泻后则安,腰膝酸软,舌淡苔白,脉沉细。其治法为

A.散寒化湿

- B. 清热利湿
- C. 消食导滞
- D. 温肾健脾
- E. 抑肝扶脾

124. 患者眩晕绵绵, 动则加剧, 劳累则发, 面色少华, 神疲懒言, 舌淡, 边有齿印, 脉细。其证候是

- A. 痰瘀阻窍
- B. 肝肾亏虚
- C. 肝阳上亢
- D. 痰热上扰
- E. 气血亏虚

125. 男, 28 岁。肛门口剧痛 2 天, 肛缘可触及肿物, 表面色紫, 触痛明显。应首先考虑的是

- A. 肛裂
- B. 肛旁皮下脓肿
- C. 血栓性外痔
- D. 肛管癌
- E. 内痔嵌顿

126. 女, 45 岁。眩晕, 动则加剧, 劳累即发, 面色淡白, 神疲乏力, 倦怠懒言, 唇甲不华, 发色不泽, 心悸少寐, 纳少腹胀, 舌淡苔薄白, 脉细弱。其治法是

- A. 化痰祛湿, 健脾和胃
- B. 益气健脾, 升阳除热
- C. 补益气血, 调养心脾
- D. 滋养肝肾, 益精填髓
- E. 平肝潜阳, 清火息风

127. 女, 50 岁。1 周前因情志不舒而出现胃脘胀痛, 痛连两胁, 暖气、矢气则痛舒, 胸闷暖气, 喜长叹息, 大便不畅, 舌苔薄白, 脉弦。其诊断是

- A. 胃痛饮食伤胃证
- B. 胃痛脾胃虚寒证
- C. 胃痛肝气犯胃证

- D. 胁痛肝气郁滞证
- E. 胁痛肝络失养证

128. 患者腰痛如刺, 痛有定处, 痛处拒按, 日轻夜重, 轻者俯仰不便, 重则不能转侧, 舌质暗紫, 或有瘀斑, 脉涩。其常用中成药是

- A. 小活络丸
- B. 四妙丸
- C. 舒筋活血片
- D. 益肾蠲痹丸
- E. 金匱肾气丸

129. 患者肢体关节疼痛酸楚, 屈伸不利, 疼痛呈游走性, 有恶风发热, 舌苔薄白, 脉浮。治疗应首选

- A. 木瓜丸
- B. 小活络丸
- C. 四妙丸
- D. 九味羌活丸
- E. 正清风痛宁片

130. 患者带下量多, 色黄如脓, 有臭气, 外阴瘙痒, 小腹作痛, 口苦口腻, 舌红, 苔黄腻, 脉滑数。其证候是

- A. 脾虚肝郁证
- B. 寒湿内停证
- C. 湿毒蕴结证
- D. 阴虚夹湿证
- E. 湿热下注证

131. 患儿, 3 岁。咳嗽频作, 咽痒声重, 痰白清稀, 鼻流清涕, 恶寒无汗, 发热头痛, 全身酸痛, 舌淡红, 舌苔薄白, 脉浮紧。其首选中成药是

- A. 通宣理肺丸
- B. 清金化痰丸
- C. 小儿肺咳颗粒
- D. 感冒清热颗粒
- E. 小儿咳喘灵颗粒

132. 患者经期小腹冷痛拒按, 得热痛减,

月经推后,量少,经色暗而有瘀块,面色青白,肢冷畏寒,舌暗,苔白,脉沉紧。其治法是

- A.温经扶阳,暖宫止痛
- B.温经散寒,化瘀止痛
- C.补肾温阳,散寒止痛
- D.补肾益气,散寒止痛
- E.温经补肾,暖宫止痛

133.患儿,6月龄。今晨起啼哭不安,阵阵捧腹啼叫,已解清稀大便3次,便多泡沫,臭气轻,可闻肠鸣,指纹淡红。其证候是

- A.湿热泄泻
- B.风寒泄泻
- C.伤食泄泻
- D.脾虚泄泻
- E.脾肾阳虚泻

134.患者突发左眼睑闭合不全,口角歪斜3天,伴头痛恶风,无发热,舌淡红,苔薄白,脉浮,诊断为面瘫。若为风寒证,其配穴选取

- A.风池、列缺
- B.外关、曲池
- C.足三里、气海
- D.水沟
- E.迎香

135.患者以发热就诊,表现为恶风,头胀痛,鼻塞,流浊涕,咽红肿痛,咳嗽,舌边尖红,苔白或微黄,脉浮数。其治法是

- A.疏风宣肺散寒
- B.宣肺祛邪利气
- C.辛温解表散寒
- D.清暑祛湿解表
- E.辛凉解表,宣肺清热

136.患者干咳,咳声短促,痰少黏白;或痰中带血丝,或声音逐渐嘶哑,口干咽燥,或午后潮热,颧红,盗汗,日渐消瘦,神疲,舌质红少苔,脉细数。应首选的药物是

- A.通宣理肺丸

B.养阴清肺丸

C.藿香正气水

D.银翘解毒丸

E.正柴胡饮颗粒

137.女,48岁。常感心胸满闷,隐痛阵发,痛无定处,时欲太息,或兼有脘痞胀闷,苔薄或薄腻,脉细弦。其治法是

- A.益气温阳,活血通络
- B.滋阴益肾,养心安神
- C.通阳泄浊,豁痰宣痹
- D.疏肝理气,活血通络
- E.活血化瘀,通脉止痛

138.女,55岁。胸痹急性发作,可选用的处理方法是

- A.服用复方丹参滴丸
- B.服用通心络胶囊
- C.按压膻中
- D.按压内关、足三里
- E.含服麝香保心丸或速效救心丸

139.男,41岁。3年来头晕伴头目胀痛,口苦,遇郁怒则加重,颜面潮红,急躁易怒,肢麻震颤,舌红苔黄,脉弦数。其治法是

- A.化痰祛湿,健脾和胃
- B.益气健脾,升阳除热
- C.补益气血,调养心脾
- D.滋养肝肾,益精填髓
- E.平肝潜阳,清火息风

140.患者久患胁痛,痛势隐隐,绵绵不休,口干咽燥,心烦少寐,头晕目眩,舌红少苔,脉弦细。其治法是

- A.养血通络
- B.养阴柔肝
- C.滋阴养血
- D.滋养肝肾
- E.养阴润燥

141.患者胃痛,脘腹胀满,嗳腐吞酸,吐不

消化食物,大便不爽,舌苔厚腻,脉滑。其治法是

- A.理气消胀
- B.消食导滞
- C.理气和胃
- D.消食健脾
- E.和胃止呕

142.患者大便并不干硬,虽有便意,但排便困难,用力努挣则汗出短气,便后乏力,面白神疲,肢倦懒言,舌淡苔白,脉弱。其证候是

- A.热秘
- B.气秘

- C.湿热秘
- D.气虚便秘
- E.阳虚便秘

143.患者低热,头晕眼花,身倦乏力,心悸不宁,面白少华,唇甲淡白,舌质淡,脉细弱。其治法是

- A.益气养血
- B.益气健脾
- C.滋阴清热
- D.活血化瘀
- E.疏肝清热

A3/A4 型选择题(144~150 题)

答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干道试题。请根据案例所提供的信息,在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(144~146 题共用题干)

女,57 岁。在乡镇卫生院接受 2 型糖尿病管理 1 年,血糖一直控制在正常范围。今早到乡镇卫生院检查发现,空腹血糖 11.2 mmol/L,餐后 2 h 血糖 14.1 mmol/L, BP 152/98 mmHg。经询问发现患者按医嘱服药,无药物不良反应,但最近很少运动,没有饮食控制。

144.该患者血糖检测满意的标准应是

- A.空腹血糖值<5.6 mmol/L
- B.空腹血糖值<6.1 mmol/L
- C.空腹血糖值<7.0 mmol/L
- D.空腹血糖值<7.8 mmol/L
- E.空腹血糖值<11.1 mmol/L

145.再次随访管理时,对该患者评估的内容不包括

- A.服药情况
- B.患者的糖尿病家族史
- C.上次就诊到这次就诊期间存在的临床

症状

D.测量体重,计算 BMI,检查足背动脉搏动

E.生活方式情况,包括吸烟、饮酒、体育锻炼、饮食控制等

146.按照糖尿病健康管理要求,对该患者进行分类干预的正确措施是

- A.血糖控制满意,探视随访
- B.再次出现血糖控制不满意,调整药物 2 周内主动随访
- C.连续 2 次随访血糖控制不满意,建议转诊,2 周内主动随访转诊情况
- D.连续 2 次药物不良反应没有改善,建议转诊,2 周内主动随访转诊情况
- E.有新的并发症出现或原有并发症加重,建议转诊,2 周内主动随访转诊情况

(147~148 题共用题干)

赵某因为输血不幸成为一名艾滋病病毒

感染者,现在怀孕3个月。赵某到其住所地的妇幼保健院进行正常的产前检查,医生钱某接待了她。

147.医生钱某的下列做法不正确的是

A.为赵某提供预防艾滋病母婴传播的咨询

B.为赵某提供产前的指导

C.为赵某提供治疗服务

D.为赵某提供检测

E.向医疗机构负责人请示后决定是否为该孕妇提供服务

148.假设钱某在听到赵某说她是一名艾滋病病毒感染者后,就拒绝为赵某进行相关的产前检查服务,此时卫生行政部门应当作出的处罚是

A.对钱某所在的医院通报批评,给予警告

B.对妇幼保健院罚款500元

C.吊销钱某的执业医师证书

D.追究钱某的刑事责任

E.开除钱某

(149~150题共用题干)

2008年,吉林省内B县医疗机构发现该县发生重大食物中毒事件。

149.此时该医疗机构应当在几小时内向所在县级人民政府卫生行政部门报告

A.1 h

B.2 h

C.3 h

D.4 h

E.5 h

150.该县人民政府卫生行政部门应当在几小时内向本级人民政府报告

A.1 h

B.2 h

C.3 h

D.4 h

E.5 h

参考答案

第一单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	D	B	E	A	D	D	A	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	C	C	E	A	A	A	C	C	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	D	A	B	E	C	A	B	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	B	A	E	D	C	E	E	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	E	D	D	A	B	E	C	D	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	A	E	E	D	E	B	B	B	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	C	B	A	D	A	B	E	A	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	E	B	D	A	E	E	D	E	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	D	C	E	D	E	E	D	B	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	A	B	D	C	A	B	D	E	C
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	C	C	B	A	B	C	B	A	C
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
E	B	E	C	A	C	D	C	C	E
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	A	E	E	E	E	B	B	D	B
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
B	E	E	A	C	A	A	D	A	C
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	B	A	A	E	B	D	C	E	B

第二单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	E	E	D	A	A	A	E	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	A	E	E	E	A	A	D	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	C	A	B	A	E	D	D	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	C	C	C	B	B	D	A	E	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	B	C	C	B	B	D	D	B	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	A	E	C	C	B	A	D	C	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	E	E	B	C	B	A	E	A	E
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	E	E	A	C	D	E	B	C	A
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	D	D	A	A	C	C	D	D	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	E	D	A	C	D	D	B	C	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	C	D	B	C	E	B	B	D	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	C	C	B	C	E	D	C	D	C
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
C	C	D	E	C	C	C	C	D	E
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
A	B	B	A	E	B	D	E	E	B
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	D	A	C	B	E	E	A	B	B