

模拟试卷

第一单元

1.关于毛果芸香碱对眼的作用描述正确的是

- A.降低眼内压、扩瞳、调节痉挛
- B.升高眼内压、扩瞳、调节痉挛
- C.降低眼内压、缩瞳、调节痉挛
- D.降低眼内压、缩瞳、调节麻痹
- E.升高眼内压、缩瞳、调节痉挛

2.有机磷急性中毒表现为

- A.腺体分泌减少、胃肠平滑肌兴奋
- B.支气管平滑肌松弛、唾液腺分泌增加
- C.膀胱逼尿肌松弛、呼吸肌麻痹
- D.神经节兴奋、心血管作用复杂
- E.脑内乙酰胆碱水平下降、瞳孔扩大

3.异丙肾上腺素的作用描述正确的是

- A.收缩血管、舒张支气管、增加组织耗氧量
- B.舒张血管、舒张支气管、降低组织耗氧量
- C.舒张血管、舒张支气管、增加组织耗氧量
- D.收缩血管、舒张支气管、降低组织耗氧量
- E.舒张血管、收缩支气管、降低组织耗氧量

4.男,30岁。过敏性休克,使用肾上腺素,心血管系统可出现的反应是

- A.减慢心率
- B.降低机体代谢
- C.心率加快
- D.禁止用于支气管哮喘
- E.扩张肾动脉

5.癫痫持续状态首选的治疗药物是

- A.苯妥英钠
- B.地西洋
- C.水合氯醛
- D.异戊巴比妥
- E.苯巴比妥钠

6.乙琥胺是治疗何种癫痫的常用药物

- A.失神小发作
- B.大发作

C.癫痫持续状态

D.部分性发作

E.中枢疼痛综合征

7.增加左旋多巴抗帕金森病疗效,减少不良反应的药物是

- A.卡比多巴
- B.维生素 B₆
- C.利血平
- D.苯乙肼
- E.丙胺太林

8.男,55岁。35年吸烟史,支气管镜活检可见鳞状上皮和支气管腺体,此种病理变化属于

- A.支气管黏膜化生
- B.支气管鳞状细胞癌
- C.支气管黏膜萎缩
- D.支气管黏膜肥大
- E.支气管上皮恶变

9.可以发生坏疽的器官是

- A.阑尾
- B.心
- C.脾
- D.肝
- E.脑

10.坏疽是指坏死组织表现为

- A.干酪样改变
- B.缺血性改变
- C.淤血性改变
- D.充血性改变
- E.腐败菌的感染

11.软化灶是指局部脑组织的

- A.萎缩
- B.变性
- C.坏死
- D.脓肿
- E.水肿

12. 细胞水肿时, 主要发生病变的细胞器是
- 内质网和中心体
 - 核糖体和中心体
 - 核糖体和内质网
 - 线粒体和内质网
 - 高尔基复合体和线粒体
13. 虎斑心属于
- 黏液变性
 - 玻璃样变
 - 细胞水肿
 - 淀粉样变
 - 脂肪沉积(脂肪变性)
14. 病毒性肝炎肝细胞气球样变的特征是
- 肝细胞体积增大, 双核, 核仁明显
 - 肝细胞轮廓可见, 胞核浓缩, 核膜消失
 - 肝细胞体积缩小, 胞质疏松, 透明度增加
 - 肝细胞体积增大, 胞质疏松, 淡染, 透明度增加
 - 肝细胞体积增大, 胞质内大小不等的空泡, 苏丹Ⅲ染色(+)
15. 股骨骨折后因处理不当, 大量脂肪滴进入血液, 该脂肪栓子常栓塞于
- 左心室
 - 左心房
 - 肺静脉及其分支
 - 主动脉分支
 - 肺动脉及其分支
16. 减压病引起的栓塞为
- 异物栓塞
 - 血栓栓塞
 - 羊水栓塞
 - 脂肪栓塞
 - 气体栓塞
17. 癌前病变的定义正确的是
- 癌肿的早期阶段
 - 良性肿瘤发生了癌变
 - 一种恶性病变, 不可逆转
 - 有癌变潜在可能的良性病变, 有可能逆转
 - 有癌变潜在可能的良性病变, 但必然会发展为癌肿
18. 肿瘤分期是指
- 肿瘤细胞的分化程度
 - 肿瘤细胞核分裂象的多少
 - 肿瘤细胞的恶性程度
 - 肿瘤的生长范围和扩散程度
 - 肿瘤细胞的大小
19. 单纯二尖瓣狭窄患者可有
- 左房扩大, 右房缩小
 - 右室缩小, 左房扩大
 - 右房扩大, 左房缩小
 - 左室缩小或正常, 左房扩大
 - 以上都不是
20. Na^+ 通过离子通道的跨膜转运过程属于
- 单纯扩散
 - 易化扩散
 - 主动转运
 - 继发主动转运
 - 出胞作用或者入胞作用
21. 动作电位下降支的产生是由于
- K^+ 内流
 - Cl^- 内流
 - Na^+ 内流
 - K^+ 外流
 - Ca^{2+} 内流
22. 下列哪种缓冲对决定着血浆的 pH
- $\text{Na}_2\text{HPO}_4/\text{NaH}_2\text{PO}_4$
 - $\text{K}_2\text{HPO}_4/\text{KH}_2\text{PO}_4$
 - $\text{NaHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$
 - $\text{KHCO}_3/\text{H}_2\text{CO}_3$
 - 蛋白质钠盐/蛋白质
23. 构成血浆晶体渗透压的主要成分是
- 氯化钾
 - 氯化钠
 - 碳酸氢钾
 - 钙离子
 - 白蛋白
24. 心动周期中, 主动脉压的最高值与最低值之差是
- 舒张压

- B.中心静脉压
- C.平均动脉压
- D.收缩压
- E.脉压

25.患者,女性,55岁。心悸、头晕2小时。既往高血压病史3个月,规律服用降压药,平时血压135~160/60~80 mmHg。查体:中心静脉压50 mmHg,心率40次/分。该患者血压降低最可能的原因是

- A.左心室后负荷增加
- B.左心室舒张功能损害
- C.每搏输出量降低
- D.心包内压力增加
- E.左心室前负荷增加

26.正常人气体交换的关键是

- A.生物膜的通透性
- B.气体的溶解度、温度
- C.交换部位两侧气体的气压差
- D.通气/血流比
- E.湿度

27.决定肺部气体交换方向的主要因素是

- A.气体的溶解度
- B.气体的分压差
- C.肺泡膜的通透性
- D.气体分子量的大小
- E.肺泡膜的面积

28.CO₂在血液中运输的主要形式是

- A.物理溶解
- B.形成碳酸
- C.形成碳酸氢盐
- D.与血浆白蛋白结合
- E.形成氨基甲酰血红蛋白

29.维持蛋白质分子一级结构的主要化学键是

- A.盐键
- B.氢键
- C.疏水键
- D.二硫键
- E.肽键

30.蛋白质分子中 α -螺旋构象的特点是

- A.肽键平面充分伸展

- B.靠盐键维持稳定
- C.螺旋方向与长轴垂直
- D.多为左手螺旋
- E.以上都不是

31.cAMP 蛋白激酶 A 途径和 DG 蛋白激酶 C 途径的共同特点是

- A.由 G 蛋白介导
- B.Ca²⁺可激活激酶
- C.磷脂酰丝氨酸可激活酶
- D.钙泵可拮抗激酶活性
- E.cAMP 和 DG 均为小分子,故都可在胞

液内自由扩散

32.下列有关密码子的叙述错误的是

- A.密码子无标点符号
- B.有终止密码子和起始密码子
- C.密码子有简并性
- D.密码子有通用性
- E.蛋白质中的氨基酸均有一个相应密码子

33.维系 DNA 双链间碱基配对的化学键是

- A.氢键
- B.磷酸二酯键
- C.肽键
- D.疏水键
- E.糖苷键

34.下列关于酶结构与功能的叙述,正确的是

- A.酶只在体内发挥作用
- B.酶的催化作用与温度无关
- C.酶能改变反应的平衡点
- D.酶能大大降低反应的活化能
- E.酶的催化作用不受调控

35.一碳单位的载体是

- A.二氢叶酸
- B.四氢叶酸
- C.生物素
- D.焦磷酸硫胺素
- E.硫辛酸

36.下列哪项不是受体与配体结合的特点

- A.高度专一性
- B.高度亲和力
- C.可饱和性

- D.不可逆性
E.非共价键结合
- 37.动物饥饿后摄食,其肝细胞的主要糖代谢途径是
A.糖异生
B.糖有氧氧化
C.糖酵解
D.糖原分解
E.磷酸戊糖途径
- 38.在有氧条件下,下述反应中能产生 $FADH_2$ 的步骤是
A.琥珀酸→延胡索酸
B.异柠檬酸→ α -酮戊二酸
C. α -酮戊二酸→琥珀酰 CoA
D.琥珀酰 CoA→琥珀酸
E.苹果酸→草酰乙酸
- 39.三羧酸循环和有关的呼吸链反应中能产生 ATP 最多的步骤是
A.柠檬酸→异柠檬酸
B.异柠檬酸→ α -酮戊二酸
C. α -酮戊二酸→琥珀酸
D.琥珀酸→苹果酸
E.苹果酸→草酰乙酸
- 40.位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成和糖原分解各条代谢途径交汇点上的化合物是
A.1-磷酸葡萄糖
B.6-磷酸葡萄糖
C.1,6-二磷酸果糖
D.3-磷酸甘油酸
E.6-磷酸果糖
- 41.下列激素中能促进脂肪动员的激素是
A.肾上腺素
B.胰高血糖素
C.促甲状腺素
D.ACTH
E.以上都是
- 42.肝脏生成乙酰乙酸的直接前体是
A.乙酰乙酰辅酶 A
B. β -羟甲基戊二酸单酰辅酶 A
C. β -羟丁酸
D.甲羟戊酸
E. β -羟丁酰辅酶 A
- 43.细菌内毒素的描述,错误的是
A.由革兰氏阴性菌裂解产生
B.毒性较弱且无特异性
C.化学成分为脂多糖
D.耐热,160 °C,2~4 小时才被破坏
E.抗原性强,经甲醛处理可制成类毒素
- 44.仅含一种类型核酸的病原体是
A.单纯疱疹病毒
B.结核分枝杆菌
C.衣氏放线菌
D.沙眼衣原体
E.白假丝酵母菌
- 45.使细菌具有侵袭力的结构成分是
A.芽孢
B.肽聚糖
C.荚膜
D.核糖体
E.异染颗粒
- 46.细菌个体的繁殖方式是
A.有性繁殖
B.菌丝断裂
C.细胞出芽
D.无性二分裂
E.核酸复制
- 47.细菌细胞壁特有的成分是
A.肽聚糖
B.外膜
C.脂蛋白
D.脂多糖
E.类脂
- 48.引起肠道菌群失调的最主要病因是
A.正常菌群异位
B.宿主免疫力低下
C.滥用抗生素
D.黏膜表面损伤
E.长期大剂量应用糖皮质激素
- 49.发热 1 周疑似伤寒的患者,此时阳性率最高的微生物学检查方法是
A.胆汁培养

- B.粪便培养
- C.肥达反应
- D.血培养
- E.尿液培养
- 50.化脓性细菌侵入血流引起的症状称为
 - A.败血症
 - B.毒血症
 - C.菌血症
 - D.脓毒血症
 - E.病毒血症
- 51.免疫系统的三大功能为
 - A.免疫防御、免疫应答、免疫记忆
 - B.免疫应答、免疫记忆、免疫监视
 - C.免疫防御、免疫记忆、免疫监视
 - D.免疫防御、免疫自稳、免疫监视
 - E.免疫应答、免疫自稳、免疫监视
- 52.适应性免疫的三大主要特点
 - A.稳定性、耐受性、活化性
 - B.获得性、特异性、记忆性
 - C.免疫性、耐受性、获得性
 - D.特异性、活化性、记忆性
 - E.特异性、耐受性、记忆性
- 53.属于黏膜免疫系统的免疫器官是
 - A.胸腺
 - B.脾脏
 - C.扁桃体
 - D.骨髓
 - E.肝脏
- 54.含 T 细胞百分率最高的部位是
 - A.脾脏
 - B.扁桃体
 - C.胸腺
 - D.骨髓
 - E.肝脏
- 55.参与黏膜免疫的免疫球蛋白是
 - A.IgM
 - B.IgE
 - C.IgG
 - D.IgA
 - E.IgD
- 56.下列关于 Ig 的叙述,正确的是

- A.具有抗原性
- B.IgM 中含分泌片
- C.Ig 有 K 和 X 两类重链
- D.可被胃蛋白酶水解成 Fab 和 Fc 段
- E.IgD 构成的免疫复合物可通过 C1 激活补体
- 57.免疫应答的基本过程为
 - A.识别、活化、效应三个阶段
 - B.识别、活化、增殖三个阶段
 - C.识别、活化、反应三个阶段
 - D.识别、活化、排斥三个阶段
 - E.识别、活化、应答三个阶段
- 58.参与 TD-Ag 刺激机体产生抗体的细胞是
 - A.B 细胞
 - B.T 细胞和 B 细胞
 - C.巨噬细胞和 T 细胞
 - D.巨噬细胞和 B 细胞
 - E.巨噬细胞、B 细胞和 T 细胞
- 59.免疫应答发生的基地是
 - A.脾
 - B.骨髓
 - C.胸腺
 - D.淋巴结
 - E.外周免疫器官
- 60.预防医学是研究
 - A.人体健康与环境的关系
 - B.个体与群体的健康
 - C.人群的健康
 - D.社会环境与健康的关系
 - E.健康和无症状患者
- 61.属于第二级预防措施的是
 - A.接种疫苗
 - B.疾病筛检
 - C.遗传咨询
 - D.健康促进
 - E.病后康复
- 62.下列疾病的预防以第一级预防为主要控制策略的是
 - A.结肠直肠癌
 - B.类风湿关节炎

- C.乳腺癌
D.胰腺癌
E.碘缺乏病
63. 流行病学的研究方法不包括
A. 实验性方法
B. 理论性方法
C. 描述性方法
D. 推论性方法
E. 分析性方法
64. 某研究者采用随机单盲临床试验比较两种降压药(波依定与洛汀新)对轻、中度原发性高血压患者的降压疗效。其单盲设计中不了解试验分组情况的人是
A. 测量血压的护士
B. 实施治疗的医生
C. 负责设计的研究者
D. 统计分析人员
E. 接受治疗的患者
65. 衡量人群中在短时间内新发病例的频率,采用的指标为
A. 罹患率
B. 发病率
C. 患病率
D. 感染率
E. 发病比
66. 某幼儿园有 200 名儿童,近一周内有 30 名儿童相继出现发热,手心、脚心出疹子,口腔有溃疡等症状,经诊断均为手足口病。提示该病流行强度为
A. 聚集
B. 散发
C. 流行
D. 大流行
E. 暴发
67. 疾病的三间分布是指
A. 国家、地区和城乡分布
B. 职业、家庭和环境分布
C. 时间、地区和人间分布
D. 年龄、性别和种族分布
E. 短期波动、季节性和周期性分布
68. 在流行病学调查中,系统抽样的方法是
A. 将对象编号,再用随机数字表抽样
B. 先将对象主要特征分层,再随机抽样
C. 将总体分为若干群,然后随机抽样
D. 按一定顺序,机械的每隔一定的数量单位抽取一个单位
E. 以上都不对
69. 在流行病学研究中,由因到果的研究为
A. 生态学研究
B. 筛检
C. 队列研究
D. 现状研究
E. 病例对照研究
70. 为探索新生儿缺氧缺血性脑病(HIE)的病因,选择 200 例确诊的 HIE 病例和同期同医院出生的正常新生儿 200 例,然后对母亲孕产期病史及分娩情况进行回顾性分析,调查 HIE 相关的危险因素。这种研究方法是
A. 病例对照研究
B. 实验研究
C. 现况研究
D. 临床随访研究
E. 前瞻性研究
71. 为制订某地区人群原发性高血压的综合防治方案,拟对该地区某时点的人群原发性高血压的患病情况进行调查。此类研究是
A. 病例对照研究
B. 队列研究
C. 现况研究
D. 临床试验
E. 人群现场试验
72. 衡量某病和某暴露因素间联系强度的最佳指标是
A. 相对危险度
B. 特异危险度
C. 暴露者的发病率
D. 暴露者的死亡率
E. 暴露者的病死率
73. 在临床试验中,将研究对象进行随机分组的目的是

- A.提高研究对象的依从性
B.增强研究对象的代表性
C.增强试验组和对照组的可比性
D.使试验组和对照组都受益
E.降低试验组的失访率
- 74.某病早期治疗效果好,若漏诊后病情加重,对此病的诊断试验应特别注重
- A.提高阴性预测值
B.提高阳性预测值
C.降低假阳性率
D.提高特异度
E.提高灵敏度
- 75.关于疾病监测的论述,正确的是
- A.疾病监测是一种横向研究
B.哨点监测属于被动监测
C.漏报调查属于主动监测
D.常规报告系统是一种主动监测
E.疾病监测获得的信息应该纵向反馈,而不能横向反馈
- 76.下列不属于临床预防服务内容的是
- A.慢性病的自我管理
B.健康筛检
C.化学预防
D.健康教育
E.免疫接种
- 77.某糖尿病患者为了控制血糖,在医生的建议下准备和营养师一起制定一份饮食计划。患者家属表示积极配合,本人也了解饮食控制的好处,但总认为无法管住自己,计划难以实施。对于这样的患者的干预重点是
- A.提高自我效能
B.培养行为能力
C.建立支持性环境
D.提供社会支持
E.提高结果预期
- 78.在健康信念模式中,促进个体行为改变的关键事件和暗示称为
- A.行为线索
B.自我效能
C.行为能力
D.对疾病易感性的认识
E.对疾病严重性的认识
- 79.医院开设戒烟门诊,提供行为咨询和药物帮助吸烟者戒烟,这属于
- A.强化因素
B.倾向因素
C.增权因素
D.易感因素
E.促成因素
- 80.利用健康高危人群的就医机会进行的针对性检查称为
- A.特殊性体检
B.健康体检
C.社会性体检
D.医疗性体检
E.机会性筛检
- 81.某公司员工36岁,因感冒去医院看病,医生帮他测量血压。这是
- A.医疗性体检
B.社会性体检
C.机会性筛检
D.定期健康体检
E.随机性筛检
- 82.对儿童进行乙型肝炎疫苗接种的临床实验研究,为评价其流行病学预防效果,最好选用的指标是
- A.发病率
B.效果指数
C.感染率
D.死亡率
E.病死率
- 83.癌症二级预防的目的是
- A.减轻患者痛苦
B.延长患者生命
C.提高生存质量
D.减少癌症发病率
E.降低癌症死亡率
- 84.属于环境中二次污染的是
- A.汞
B.二手烟
C.镉
D.光化学烟雾

E.二氧化碳
85.男,46岁。从事粮食烘干工作25年,近期出现视物模糊,确诊为白内障。最可能的致病原因是

- A.微波
- B.铅
- C.苯胺
- D.拟除虫菊酯
- E.紫外线辐射

86.南方某村,居民以玉米为主食。某年秋天突然有10余人出现发热、呕吐、厌食、黄疸,随后出现腹水、水肿,因抢救及时未出现死亡病例,经医生诊断排除了传染性肝炎。分析原因与居民主食玉米有关,该情况最可能是

- A.污水灌田引起玉米中镉超标
- B.玉米晾晒过程被多环芳烃污染
- C.玉米中有农药残留
- D.玉米被黄曲霉毒素污染
- E.玉米中混进了有毒植物种子

87.《执业医师法》明确规定,医师在执业过程中应当履行的职责是

- A.以患者为中心,实行人道主义精神
- B.防病治病,救死扶伤
- C.遵守职业道德,保护患者隐私
- D.树立敬业精神,尽职尽责为患者服务
- E.防病治病,救死扶伤,保护人民健康

88.某医师因重大医疗事故受到吊销医师执业证书的行政处罚。半年后重新申请执业注册,卫生行政部门未予批准。理由是该医师自处罚决定之日起至申请注册之日止不满法定期限。该法定期限是

- A.3年
- B.5年
- C.2年
- D.4年
- E.1年

89.某医师从医院辞职到一家药品生产企业从事营销工作,后因事业不顺,想重回医院工作,但因其中止医师执业活动已满法定期限被卫生计生行政部门注销了注册。该法定期限是

- A.6个月
- B.1年
- C.2年
- D.3年
- E.4年

90.一位服用了60多片安定的精神病患者被送到医院急救,患者父母表示无力承担抢救费用。按照急救伦理的要求,医生应选择的处理措施是

- A.在征得患者父母和医院领导同意的情况下,迅速实施抢救
- B.在征得患者父母同意的情况下,放弃治疗
- C.放弃抢救,让患者父母将其接回家
- D.向民政部门反映,争取社会支持,并由他们决定是否抢救
- E.仅给予患者家庭能够承受费用的支持疗法

91.《医师考核管理办法》规定,对考核不合格的医师,卫生行政部门可以

- A.吊销其医师执业证书
- B.责令其暂停执业活动三个月至六个月,并接受培训和继续教育
- C.降低其执业等级
- D.变更其工作岗位
- E.给予行政或纪律处分

92.《执业医师法》规定,医师因考核不合格者被责令暂停执业活动3个月,并接受培训和继续医学教育,期满后仍然不合格者,由县级以上卫生行政部门对其

- A.变更注册
- B.不予注册
- C.重新注册
- D.注销注册
- E.暂缓注册

93.某医院未经批准新设医疗美容科,从外地聘请了一位退休外科医师担任主治医师,该院行为的性质属于

- A.非法行医
- B.超范围执业
- C.正常医疗行为

- D.特殊情况
E.开展新技术
- 94.《医疗机构管理条例》规定,医疗机构不得使用非卫生技术人员从事
- A.医疗后勤服务工作
B.医疗卫生技术工作
C.医院安全保卫工作
D.医院财务审计工作
E.医疗器械采购工作
- 95.医疗机构限于设备或者技术条件不能诊治的患者,应当依法采取的措施是
- A.立即抢救
B.及时转诊
C.继续观察
D.提请上级医院派人会诊
E.请示当地卫生局依法处理
- 96.卫生计生行政部门可以责令发生医疗事故的医务人员暂停执业活动的期限是
- A.1个月以上3个月以下
B.3个月以上6个月以下
C.6个月以上1年以下
D.1年以上18个月以下
E.1年以上3年以下
- 97.患者陈某因手术效果不佳与医院发生争议,要求复制病历资料。医院按照规定复制了病历资料,并告知陈某另有部分病历资料不予复制,只能在医患双方在场的情况下封存,这部分病历资料是
- A.病程记录
B.医学影像检查资料
C.手术及麻醉记录单
D.住院志
E.医嘱单
- 98.因抢救急危患者,未能及时书写病历的,有关医务人员应当在抢救结束后据实补记,并加以注明,其时限是
- A.2小时内
B.4小时内
C.6小时内
D.8小时内
E.12小时内

99.内科医师王某,在春节探家的火车上遇到一位产妇临产,因车上无其他医务人员,王某遂协助产妇分娩。在分娩过程中,因牵拉过度,导致新生儿左上肢臂丛神经损伤。王某行为的性质为

- A.属于违规操作,构成医疗事故
B.属于非法行医,不属医疗事故
C.属于超范围执业,构成医疗事故
D.属于见义勇为,不构成医疗事故
E.虽造成不良后果,但不属医疗事故

100.青年李某,男性,因包茎到某医院做包皮环切术。在局部注射利多卡因后,即刻出现休克反应,经全力抢救无效死亡。经专家会诊认为其死亡是利多卡因变态反应所致,在临床中极为少见。根据《医疗事故处理条例》规定,李某的死亡后果,应当属于

- A.一级医疗事故
B.二级医疗事故
C.三级医疗事故
D.因不可抗力而造成的不良后果
E.因患者体质特殊而发生的医疗意外

101.某患者凌晨因心脏病发作被送入医院抢救,但不幸于当日上午8时死亡。下午3时,患者家属要求查阅病历,院方以抢救时间紧急,尚未补记病历为由不予提供,引起患者家属不满,投诉至卫生局。根据《医疗事故处理条例》规定,卫生局应给予该医院的处理是

- A.限期整改
B.责令改正
C.罚款
D.吊销执业许可证
E.警告

102.医学心理学的研究任务不包括

- A.人格特征或行为模式在疾病与健康中的意义
B.如何运用心理治疗的方法达到保健的目的
C.医院管理中存在的心理问题系统的解决方法
D.疾病的发展和变化过程中心理因素作用的规律

- E.心理评估手段在疾病的预防中的作用
- 103.医学心理学对于健康和疾病的基本观点不包括
- A.认知评价的观点
B.个性特征作用的观点
C.情绪因素作用的观点
D.被动适应的观点
E.心身统一的观点
- 104.某心外科医生在实施一例先天性心脏病手术之前的晚上,在自己脑海中反复想象手术的过程、路径以及手术意外的应对措施等,这种思维方式是
- A.形象思维
B.聚合思维
C.发散思维
D.抽象思维
E.创造思维
- 105.“入芝兰之室,久而不知其香”,说明的是
- A.感觉过敏
B.感觉适应
C.感觉相互作用
D.感觉减退
E.感受性补偿
- 106.某医学生希望毕业后成为外科医生,在临床实习中主动向老师请教,积极为患者服务,并能结合临床案例查阅相关书籍和文献。他的行为表现在意志品质中属于
- A.坚韧性
B.果断性
C.随意性
D.自制力
E.自觉性
- 107.马斯洛的需要层次理论中,处于最高层次的需要是
- A.爱和归属的需要
B.生理的需要
C.尊重的需要
D.安全的需要
E.自我实现的需要
- 108.动机产生的两个条件是
- A.需要和目的
B.需求和目标
C.诱因与目的
D.意志与目的
E.需要与诱因
- 109.胆汁质气质的人,其高级神经活动类型属于
- A.强、均衡而灵活的活泼型
B.强、均衡而不灵活的安静型
C.强、不均衡而灵活的兴奋型
D.弱、不均衡、不灵活的抑制型
E.弱、均衡、灵活的灵活型
- 110.有些人在工作中认真负责,有些人敷衍了事,有些人得过且过。这些表现在人的性格特征中属于
- A.态度特征
B.理智特征
C.认知特征
D.情绪特征
E.意志特征
- 111.男,22岁,大学生。平常乐于助人、尊师爱校。不仅在学习上经常帮助同学,而且在生活上也常常照顾他人,并能积极组织班级的集体活动。这种行为方式在性格的特征中属于
- A.行为特征
B.意志特征
C.态度特征
D.情绪特征
E.理智特征
- 112.心理健康不包括
- A.智力正常
B.健康行为
C.情绪乐观
D.意识清晰
E.人格健全
- 113.医学伦理学属于
- A.环境伦理学
B.社会伦理学
C.元伦理学
D.描述伦理学

- E.规范伦理学
- 114.提出以“最大多数人的最大幸福”作为道德判断准则的学者是
- A.边沁
B.密尔
C.苏格拉底
D.亚里士多德
E.康德
- 115.“大医精诚论”的作者是
- A.张仲景
B.华佗
C.扁鹊
D.孙思邈
E.希波克拉底
- 116.不属于医学伦理学任务的是
- A.确定符合时代要求的医德原则和规范
B.反映社会对医学职业道德的需要
C.直接提高医务人员的医疗技术
D.为医学的发展导向
E.为符合道德的医学行为辩护
- 117.无行为能力的患者,由其家属代理履行知情同意,符合的原则是
- A.尊重原则
B.有利原则
C.不伤害原则
D.公益原则
E.公正原则
- 118.慢性阻塞性肺疾病最主要的发病危险因素是
- A.空气污染
B.呼吸道感染
C.寒冷气候
D.吸烟
E.过敏
- 119.慢性阻塞性肺疾病急性发作最常见的原因是
- A.空气污染
B.接触香烟烟雾
C.接触过敏原
D.气候变化
E.感染
- 120.COPD 气道炎症最主要的效应细胞是
- A.肥大细胞
B.嗜酸性粒细胞
C.中性粒细胞
D.巨噬细胞
E.淋巴细胞
- 121.慢性阻塞性肺疾病最主要的病理生理特征是
- A.明显的肺外效应
B.肺泡通气量下降
C.持续性气流受限
D.气道结构重塑
E.肺泡弹性回缩力减退
- 122.评估呼吸气流是否受限最常用的指标是
- A.残气量/肺总量(RV/TLC)
B.FEV₁%预计值
C.峰流速(PEF)
D.FEV₁/FVC
E.用力肺活量(FVC)
- 123.目前用于判断慢性阻塞性肺疾病严重程度的肺功能指标是
- A.用力肺活量(FVC)占预计值百分比
B.最大通气量(MVV)占预计值百分比
C.一秒率(FEV₁/FVC)
D.残总比(RV/TLC)
E.一秒量(FEV₁)占预计值百分比
- 124.女性,58岁。反复咳嗽、咳痰、喘息32年,加重3天。查体:桶状胸,双肺满布哮鸣音,血气分析 PaO₂ 58 mmHg, PaCO₂ 55 mmHg。此时该患者呼吸功能检查结果最可能的是
- A.VC 正常、FEV₁%正常、RV/TLC<40%
B.VC 降低、FEV₁%正常、RV/TLC<40%
C.VC 降低、FEV₁%增加、RV/TLC>40%
D.VC 正常、FEV₁%降低、RV/TLC<40%
E.VC 降低、FEV₁%降低、RV/TLC>40%
- 125.男,50岁。常规体检胸部 X 线片示双肺纹理增粗紊乱。既往体健,吸烟 20 余年。行肺功能检查示 FEV₁/FVC 为 68.5%,FEV₁占预计值的 68%。支气管舒张试验 FEV₁改善 2.5%(30 mL)。患者首先考虑的诊断是

- A. 支气管扩张
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 持续性气流受限
- D. 支气管哮喘
- E. 慢性支气管炎

126. 女, 76 岁。1 小时前被家属发现意识不清急送入院。有慢性阻塞性肺疾病病史 20 年, 近 1 周来嗜睡。查体: BP 150/90 mmHg, 昏迷, 球结膜水肿, 口唇发绀, 双下肺可闻及湿啰音, 该患者最可能的诊断是

- A. 电解质紊乱
- B. 左心衰竭
- C. 脑梗死
- D. 肺性脑病
- E. 感染中毒性脑病

127. 男, 68 岁。反复咳嗽、咳痰 20 年, 气短 10 年, 喘息加重 2 天。吸烟 30 年, 每日约 1 包。查体: 神志清楚, 呼吸急促, 端坐位, 口唇发绀, 桶状胸, 左下肺呼吸音明显减弱, 右肺可闻及哮鸣音和湿啰音。WBC $6.3 \times 10^9/L$, N 0.85。为进一步诊治, 首选的检查是

- A. 心电图
- B. 痰培养
- C. 肺功能
- D. 胸部 X 线片
- E. 血气分析

128. 男, 68 岁。慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 病史 12 年。动脉血气分析 pH 7.36, PaO_2 43 mmHg, $PaCO_2$ 52 mmHg。对该患者可以改善预后的措施是

- A. 预防性使用抗生素
- B. 吸入糖皮质激素
- C. 使用支气管舒张剂
- D. 肺康复锻炼
- E. 长期家庭氧疗

129. 男, 64 岁。COPD 患者, 近来活动耐力下降就诊, 针对患者因迷走神经张力过高所致气道狭窄, 宜选用的药物是

- A. 白三烯调节剂
- B. 异丙托溴铵
- C. 吸入型糖皮质激素

- D. 沙丁胺醇
- E. 茶碱

130. 慢性肺心病引起的心律失常最常见的是

- A. 房室传导阻滞
- B. 心房颤动
- C. 室性期前收缩
- D. 室性心动过速
- E. 房性期前收缩和室上性心动过速

131. 引起继发性肺动脉高压最常见的原

- 因是
- A. 结缔组织病
- B. 肺血栓栓塞
- C. 慢性阻塞性肺疾病
- D. 间质性肺炎
- E. 肺结核

132. 引起慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 肺动脉高压最重要的原因是

- A. 肺小动脉原位血栓形成
- B. 肺小动脉内膜增厚
- C. 肺小动脉痉挛
- D. 肺小动脉壁纤维化
- E. 肺小动脉微血栓栓塞

133. 肺心病肺动脉高压形成的多项因素中, 可经治疗后明显降低肺动脉压的是

- A. 慢支所致血管炎
- B. 缺氧性肺血管收缩
- C. 肺气肿压迫肺毛细血管
- D. 慢性缺氧所致肺血管重建
- E. 肺泡壁破裂所致肺循环阻力增大

134. 提示肺动脉高压最主要的临床表现是

- A. 肺气肿
- B. 呼吸衰竭
- C. P_2 亢进
- D. 剑突下异常搏动
- E. 三尖瓣区收缩期杂音

135. 提示慢性肺心病右心室肥大的最主要临床表现是

- A. 心音低钝
- B. 心界缩小

- C. $P_2 = A_2$
- D. 剑突下有明显搏动
- E. 双肺听诊有湿啰音

136. 男, 68 岁。反复咳嗽、咳痰、气促 41 年, 心悸、水肿 5 年, 近 1 周来症状加重入院。查体: 呼吸急促, 双肺可闻及干湿啰音, P_2 亢进, 三尖瓣区闻及 3/6 级收缩期杂音。肝右肋下 4 cm, 压痛(+), 肝颈回流征阳性, 下肢水肿。此时首选的治疗是使用

- A. 强心剂
- B. 利尿剂
- C. 心血管扩张剂
- D. 抗生素
- E. 祛痰剂

137. 男, 69 岁。反复咳嗽、咳痰、喘息 20 年, 加重 2 周, 嗜睡 1 周。无发热、咯血。既往吸烟 30 年, 每日约 1 包。查体: $T 36.8^{\circ}\text{C}$, $BP 160/95 \text{ mmHg}$, 昏睡状, 口唇发绀, 颈静脉充盈, 肝颈静脉回流征阳性, 双肺可闻及哮鸣音和细湿啰音, 心律 130 次/分, $P_2 > A_2$, 双下肢水肿, 病理征(-)。该患者早期肺动脉高压形成的最主要机制是

- A. 肺小动脉结构重塑
- B. 肺毛细血管静水压升高
- C. 原位血栓形成
- D. 血红蛋白浓度升高
- E. 缺氧、 CO_2 潴留致血管收缩

138. 男, 54 岁。因“进行性呼吸困难 1 年”就诊, 既往体健。查体: 口唇轻度发绀, 双肺呼吸音清晰, 未闻及干湿啰音。心界无扩大, P_2 亢进、分裂, 三尖瓣区可闻及 2/6 级收缩期杂音。左下肢轻度凹陷性水肿, 并可见浅静脉曲张。该患者最可能的诊断是

- A. 慢性肺源性心脏病
- B. 冠心病
- C. 扩张型心肌病
- D. 先天性心脏病
- E. 风湿性心脏瓣膜病

139. 男, 67 岁, 吸烟者。家属发现患者呼之不应半小时送医院。COPD 病史 30 余年。查体: $BP 150/50 \text{ mmHg}$, 浅昏迷状, 球结膜水

肿, 双肺可闻及干湿啰音, $A_2 < P_2$, 下肢水肿。为明确诊断首选的检查是

- A. 动脉血气分析
- B. 胸部 X 线片
- C. 心脏超声波
- D. 动态心电图
- E. 肺功能

140. 女, 36 岁。呼吸困难伴声嘶 2 个月, 活动后明显, 无慢性咳嗽、咳痰和关节疼痛病史。查体: 口唇发绀, 颈静脉充盈, 肝颈回流征阳性亢进, 三尖瓣区可闻及 3/6 级收缩期杂音, 双下肢水肿。其最可能的诊断是

- A. 特发性肺动脉高压
- B. 风湿性心脏瓣膜病
- C. 房间隔缺损
- D. 室间隔缺损
- E. 扩张型心肌病

A3/A4 型题

(141~142 题共用题干)

女, 55 岁。反复咳嗽、咳痰、气促 30 年, 加重伴低热 1 周。既往高血压病史 10 年, 血压控制满意。查体: $T 38^{\circ}\text{C}$, 110 次/分, $R 24$ 次/分, $BP 160/90 \text{ mmHg}$ 。口唇发绀, 颈静脉怒张, 双肺可闻及哮鸣音和湿啰音, 心率 110 次/分, 律齐, $P_2 > A_2$, 剑突下可闻及 3/6 级收缩期杂音。腹膨隆, 肝肋下 4 cm, 压痛(+), 肝颈静脉回流征阳性, 双下肢水肿。

141. 该患者最可能的诊断是

- A. 冠心病
- B. 心肌病
- C. 肺血栓栓塞
- D. 肺心病
- E. 风湿性心脏瓣膜病

142. 对明确诊断, 最有价值的检查是

- A. 胸部 X 线片
- B. 超声心动图
- C. 血气分析
- D. 心电图
- E. 血 D-二聚体

(143~145 题共用题干)

某年夏季, 某县中心小学 47 名学生相继

出现剧烈呕吐、上腹部剧烈疼痛、腹泻等症状,少数患者有低热。调查得知发病学生在当天上午均吃过学校供应的课间餐(外购的奶油蛋糕),未吃者不发病。患者发病的潜伏期最短为1小时,最长为6小时。

143.引起此次食物中毒最可能的细菌(或毒素)是

- A.副溶血性弧菌
- B.沙门菌属
- C.肉毒梭菌毒素
- D.蜡样芽孢杆菌
- E.金黄色葡萄球菌肠毒素

144.引起此类中毒的食物除了奶制品、含奶糕点外,主要还有

- A.海产品
- B.蔬菜
- C.水果
- D.罐头制品
- E.肉类、剩饭

145.针对这起食物中毒事件,主要的治疗措施为

- A.应用多价抗毒素血清
 - B.服用改变肠道菌群的制剂
 - C.应用止痛剂
 - D.彻底洗胃、灌肠
 - E.静脉补充水、电解质,静脉输注抗生素
- (146~147题共用备选答案)

- A.3年
- B.5年
- C.1年
- D.4年
- E.2年

146.取得执业助理医师执业证书后,具有高等学校医学专科学历的,可以在医疗、预防、保健机构中工作满一定年限后报考执业医师资格考试,该年限是

147.具有高等学校医学专业本科以上学历,报考执业医师资格考试的,需要在医疗、预防、保健机构中试用期满一定年限,该年限是(148~150题共用备选答案)

A.医师在执业活动中,人格尊严、人身安全不受侵犯

B.医师在执业活动中,应当遵守法律、法规,遵守技术操作规范

C.对医学专业技术有重大突破,作用显著贡献的医师,应当给予表彰或者奖励

D.医师应当使用经国家有关部门批准使用的药品、消毒剂和医疗器械

E.对考核不合格的医师,可以责令其接受培训和继续医学教育

148.属于医师执业权利的是

149.属于医师执业义务的是

150.属于医师执业规则的是

第二单元

1.有关气道高反应性(AHR)的描述正确的是

- A.AHR检测阳性者可诊断支气管哮喘
- B.肺泡巨噬细胞激活后可降低AHR
- C.AHR是哮喘发病的重要神经机制
- D.气道炎症是导致AHR的重要机制
- E.AHR不受遗传因素的影响

2.可释放组胺引起哮喘等过敏反应的白细胞是

- A.中性粒细胞
- B.单核细胞

C.淋巴细胞

D.嗜酸性粒细胞

E.嗜碱性粒细胞

3.外源性支气管哮喘,浆细胞产生的使人致敏的抗体是

A.IgA

B.IgG

C.IgE

D.IgM

E.IgD

4.支气管哮喘发作时,最有诊断意义的体

征是

- A. 胸廓饱满
- B. 肋间隙增宽
- C. 触诊胸部语颤减弱
- D. 叩诊胸部过清音
- E. 听诊两肺广泛哮鸣音

5. 支气管哮喘最有意义的临床表现特点是

- A. 有哮鸣音
- B. 有肺气肿体征
- C. 呈进行性加重
- D. 呈发作性,可缓解
- E. 呈反复发作,持续不能缓解

6. 男,18岁。发作性胸闷3年、再发2天。发作多以凌晨为著,无咯血和发热,发作时不经药物治疗可逐渐缓解。查体:双肺呼吸音清晰。该患者最可能的诊断是

- A. 胃食管反流病
- B. 支气管哮喘
- C. 左心衰竭
- D. 过敏性肺炎
- E. 慢性支气管炎

7. 女,45岁。间断干咳3年,无低热、咯血等,反复抗生素治疗无效。查体无明显阳性体征,胸部X线片未见明显异常。最可能的诊断是

- A. 支原体肺炎
- B. 支气管结核
- C. 支气管扩张
- D. 咳嗽变异型哮喘
- E. 慢性支气管炎

8. 女,62岁。反复咳嗽、喘息15年,1个月前搬入新居后再发加重,口服“茶碱类”药物有所缓解。查体:双肺呼吸音低,呼气相延长。胸部X线片未见明显异常。肺功能检查示 FEV_1/FVC 56%,舒张试验示 $FEV_1\%$ 改善率12%。该患者应首先考虑的诊断是

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 支气管哮喘
- C. 慢性充血性心力衰竭
- D. 过敏性肺炎

E. 嗜酸性粒细胞性肺炎

9. 女性,28岁。今日凌晨突觉胸闷、呼吸困难急诊。查体: T 37.3℃, P 100次/分, R 24次/分。烦躁,双肺可闻及哮鸣音。 PaO_2 78 mmHg, $PaCO_2$ 28 mmHg。该患者属于哮喘

- A. 急性发作轻度
- B. 急性发作中度
- C. 急性发作重度
- D. 急性发作极重度
- E. 非急性发作重度

10. 男性,25岁。因支气管哮喘住院治疗已半月,症状基本控制,今晨花园散步后突发胸痛、胸闷,用氨茶碱、甲泼尼龙静滴后仍不缓解,此时考虑可能有

- A. 支气管哮喘急性发作
- B. 自发性气胸
- C. 继发感染
- D. 心力衰竭
- E. 肺不张

11. 支气管-肺感染和阻塞是主要发病因素的疾病是

- A. 支气管扩张症
- B. 支气管肺癌
- C. 慢性支气管炎
- D. 支气管哮喘
- E. 阻塞性肺气肿

12. 反复感染的支气管扩张患者,在抗感染治疗时应覆盖的病原体是

- A. 军团菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 白色念珠菌
- E. 铜绿假单胞菌

13. 体检发现单侧肺底部湿性啰音,且长期固定存在的情况最常见于

- A. 支气管扩张
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 心力衰竭
- D. 肺结核
- E. 特发性肺纤维化

14. 支气管扩张症最有意义的体征是

- A. 贫血
B. 杵状指
C. 固定的局限性湿啰音
D. 消瘦
E. 多变的哮鸣音
15. 慢性咳嗽, 大量脓痰, 反复咯血最多见于
- A. 慢性支气管炎
B. 支气管肺癌
C. 支气管扩张
D. 肺结核
E. 肺炎
16. 女, 35 岁。间断咳嗽、咳脓痰伴咯血 10 余年, 再发 2 天入院。咯血总量约 600 mL, 经抗感染、静脉点滴垂体后叶素治疗后咯血停止。行胸部 X 线检查示多发囊状及柱状影, 部分囊内可见液平, 余肺未见异常。该患者进一步采取的最佳治疗措施是
- A. 支气管动脉栓塞
B. 规律使用流感疫苗
C. 感染时联合使用抗生素
D. 手术切除病变肺叶
E. 抗生素预防感染
17. 女, 35 岁。间断咳嗽、咳痰伴咯血 20 年, 行 HRCT 检查示右中叶支气管囊状扩张, 其余肺叶未见异常。今日再次咯血, 量约 200 mL, 给予静脉点滴垂体后叶素治疗, 效果欠佳。该患者宜选择的最佳治疗措施为
- A. 手术切除病变肺叶
B. 换用酚妥拉明静脉滴注
C. 静脉滴注鱼精蛋白
D. 支气管镜下止血
E. 支气管动脉栓塞
18. 哪种细菌性肺炎极少并发肺脓肿、空洞
- A. 金黄色葡萄球菌肺炎
B. 流感嗜血杆菌肺炎
C. 克雷伯菌肺炎
D. 绿脓杆菌肺炎
E. 肺炎双球菌肺炎
19. 肺炎支原体肺炎最常见的胸部 X 线表

现是

- A. 早期为下叶间质性改变, 肺实变后为边缘模糊的斑片状阴影
B. 肺叶和小叶实变, 叶间隙呈弧形下坠, 多发性蜂窝状脓肿形成
C. 肺叶或肺段实变, 呈多发性、周围性肺浸润, 可伴气囊肿
D. 呈叶、段分布的炎性实变阴影, 在实变阴影中可见支气管充气征
E. 病变多在肺上部, 呈大片浓密阴影, 密度不均, 历久不消散, 可形成空洞
20. 关于支原体肺炎, 以下哪项是错误的
- A. 秋季发病多
B. 儿童青少年多
C. 可引起肺炎性浸润和空洞形成
D. 有咽炎, 支气管炎表现
E. 半数病例无症状
21. 男, 45 岁。发热、咳嗽 3 天就诊, 最高体温 39.7 °C。血常规: WBC $15.5 \times 10^9/L$, N 0.89, 胸部 X 线片示右下肺炎。给予头孢唑辛静点滴治疗, 2 天后体温下降至 37.7 °C, 咳嗽无明显好转。此时应采取的措施是
- A. 胸部 CT 检查
B. 复查胸部 X 线片
C. 换用氟喹诺酮类药物
D. 支气管镜检查
E. 继续目前治疗
22. 男, 20 岁。3 天前受凉后出现咳嗽、咳白黏痰, 发热 39 °C, 胸片示左下肺大片渗出影, 予青霉素静点, 如有效则最先出现的是
- A. 胸片示片状阴影消散
B. 咳嗽好转
C. 体温降至正常
D. 痰色转黄
E. 痰量减少
23. 男性, 25 岁。2 周前感冒后畏寒、发热、咳嗽, 1 周前咳大量黄色脓性痰, 痰中带血, 经青霉素、头孢噻肟等治疗无效。体检: 体温 40 °C, 呼吸急促, 双肺中下闻及湿啰音。血白细胞计数 $25 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.90。X 线胸片显示双肺中下斑片状实变阴影, 并有多

个脓肿和肺气囊肿。本例诊断应首先考虑为

- A.肺炎球菌肺炎
- B.葡萄球菌肺炎
- C.克雷伯菌肺炎
- D.支原体肺炎
- E.干酪性肺炎

24.女,24岁。一天来寒战高热,咳嗽伴右胸痛,咳砖红色胶冻痰,量多。胸片右肺呈多发性蜂窝状阴影。正确选用的抗生素为

- A.青霉素
- B.青霉素+链霉素
- C.青霉素+庆大霉素
- D.庆大霉素+头孢曲松钠
- E.红霉素

25.某患者诊断吸入性肺脓肿,经足量多种抗生素治疗4个月,仍有发热,咳脓痰,胸片示空洞壁增厚,周围有明显纤维条索影。进一步治疗应选择

- A.更换广谱抗生素+甲硝唑
- B.体位引流+气管内滴入抗生素
- C.手术切除
- D.纤支镜吸脓引流及局部注药
- E.局部穿刺,脓肿腔内注药

26.患者,男性,17岁。寒战、高热、咳嗽4天。1周前脚趾曾划伤化脓感染,经治疗后愈合。听诊双肺可闻及湿啰音,血常规血 WBC $17 \times 10^9/L$, N 0.92,胸部 X 线片示两肺多发性团块状密度增高影,部分有空洞形成。最可能的诊断是

- A.肺血管炎
- B.肺结核
- C.肺囊肿继发感染
- D.肺脓肿
- E.真菌性肺炎

27.男性,33岁。颜面部疔肿2周,近三天高热,咳嗽,咳血痰,脓性痰少量。查体:双肺散在干、湿啰音。血 WBC $27 \times 10^9/L$, N 0.92。该患者应选用的抗生素是

- A.链霉素
- B.氟康唑
- C.甲硝唑

- D.万古霉素
- E.克林霉素

28.某患者3周前突然发冷,发热,查体:T 39°C ,按肺炎治疗未愈,一周前开始咳大量脓臭痰,痰培养为脆弱类杆菌,胸片示右上肺大片致密影及大空洞,不可选用的抗生素是

- A.甲硝唑
- B.克林霉素
- C.青霉素
- D.林可霉素
- E.替硝唑

29.某患者诊断急性原发性肺脓肿,根据痰细菌学检查结果,给予足量青霉素、链霉素,积极支持疗法,治疗两周,痰量减少,但高热不退,白细胞持续增高。此时治疗应采取

- A.气管内滴注抗生素
- B.体位引流排痰
- C.纤维支气管镜吸引并滴注抗菌药
- D.更换抗生素
- E.雾化吸入抗生素

30.下列抗结核药物,不属于杀菌剂的是

- A.利福平
- B.异烟肼
- C.吡嗪酰胺
- D.乙胺丁醇
- E.链霉素

31.判断 PPD 试验的结果是依据

- A.24~72 小时测量皮肤红斑直径
- B.12~24 小时测量皮肤硬结直径
- C.48~72 小时测量皮肤红斑直径
- D.24~48 小时测量皮肤红斑直径
- E.48~72 小时测量皮肤硬结直径

32.关于原发性肺结核,下列哪项正确

- A.好发生于双肺锁骨上、下
- B.多发生明显结核中毒症状
- C.极少发生血行播散
- D.原发灶及淋巴结不会发生干酪性坏死
- E.肺门或纵隔淋巴结结核较原发综合征更为常见

33.女性,16岁。低热、咳嗽1个月,查体:消瘦,右颈部可触及数个绿豆大小淋巴结,稍

硬、活动、无压痛,右肺呼吸音稍减弱,胸片见右上钙化灶,右肺门淋巴结肿大,诊断首先考虑的是

- A.原发型肺结核
- B.浸润性肺结核
- C.血行播散型肺结核
- D.结核性渗出性胸膜炎
- E.慢性纤维空洞性肺结核

34.男,25岁。因肺结核咯血入院,2小时前又咯血约100 mL,现在患者感胸闷气促、咯血不畅,继之两手乱抓、不能说话、张口瞪目。急救措施是

- A.口对口人工呼吸
- B.高压氧
- C.垂体后叶素静脉推注
- D.胸外按压
- E.使呈头低足高位,拍背

35.女,62岁。反复咳嗽、痰中带血伴低热1个月余。查体:气管向左移位,左肺可闻及细湿啰音。为明确诊断,首选的检查是

- A.结核抗体检测
- B.胸部X线
- C.支气管镜
- D.痰结核分枝杆菌培养
- E.结核菌素试验

36.女,47岁。低热、干咳2周,经胸部X线片诊断为浸润性肺结核。既往有高血压病史6年,痛风史4年,口服药物治疗。在患者进行抗结核治疗时,应避免使用的药物是

- A.异烟肼
- B.利福平
- C.乙胺丁醇
- D.吡嗪酰胺
- E.链霉素

37.患者,男性,26岁。发热,咳嗽2个月,胸部X线片示:左上肺不规则片状阴影,予抗结核治疗1月余。查体:T 36.5℃,巩膜稍黄染。双肺未闻及干湿啰音。血 WBC $4.3 \times 10^9/L$ 。N 0.55。肝功能检查示:ALT、AST正常,总胆红素 $40.6 \mu\text{mol/L}$,直接胆红素 $17.8 \mu\text{mol/L}$ 。该患者现停用的药物是

- A.利福平
- B.异烟肼
- C.吡嗪酰胺
- D.乙胺丁醇
- E.链霉素

38.患者,男性,19岁。学生,咳嗽、发热1月余,多为干咳,下午3时发热,体温 38.5°C ,可自行退热,无咯血。发病以来体重下降2.5 kg,胸部X线片示:右肺门处可见密度增高的团块影。“青霉素”治疗半月未见好转。查体:T 37.5°C ,消瘦,双肺未闻及干湿啰音。该患者最可能的诊断是

- A.结节病
- B.肺门淋巴结结核
- C.右肺脓肿
- D.肺部真菌感染
- E.淋巴瘤

39.患者,女性,22岁。患肺结核近5年,近两个月来低热,咳嗽,痰中带血。2小时前突然咯血不止急诊入院。治疗应首选

- A.输液
- B.镇静剂
- C.氧气吸入
- D.镇咳剂
- E.垂体后叶素

40.患者,女性,22岁。干咳、低热、盗汗半月,今日突然咯血两口而就诊。左上肺可闻及湿啰音。首先考虑的诊断是

- A.肺炎球菌性肺炎
- B.支气管扩张
- C.肺脓肿
- D.肺结核
- E.肺癌

41.患者,女性,63岁。间断咳嗽15年,活动后气短3年,pH 7.32,PaCO₂ 56 mmHg,PaO₂ 52 mmHg,下述氧疗和呼吸支持治疗措施中,应首选的是

- A.雾化治疗
- B.气道保护治疗
- C.机械通气
- D.支气管扩张药

E. 抗生素治疗

42. 患者, 男性, 67 岁。反复咳嗽、咳痰、喘息 5 年, 再发加重 1 周。查体: 嗜睡, 口唇发绀, 两肺可闻及哮鸣音和湿性啰音, 心率 120 次/分, 动脉血气分析 pH 7.10, PaO₂ 54 mmHg, PaCO₂ 103 mmHg, 该患者发生呼吸衰竭最主要的机制是

- A. 肺泡通气量减少
- B. 无效腔通气减少
- C. 呼吸中枢抑制
- D. 胸廓扩张受限
- E. 弥散功能障碍

43. 男, 72 岁。咳嗽、咳痰 30 年, 加重伴气短 10 天。查体: 神志清楚, 口唇发绀, 桶状胸, 双肺闻及少许干湿啰音。胸部 X 线片示双肺纹理增粗、紊乱。血气分析示: PaO₂ 55 mmHg, PaCO₂ 39 mmHg。该患者发生呼吸衰竭最主要的机制是

- A. 肺内分流
- B. 弥散功能障碍
- C. 肺通气不足
- D. 氧耗量增加
- E. 通气/血流比例失调

44. 女, 79 岁。1 小时前家属发现其呼吸困难而来诊。查体: T 36.8 °C, R 32 次/分, BP 140/90 mmHg。嗜睡, 球结膜水肿, 皮肤潮湿, 口唇发绀, 双下肺可闻及细湿啰音和哮鸣音。心率 120 次/分, 双下肢水肿。为明确诊断, 进一步检查宜首选

- A. 胸部 CT
- B. 心肌坏死标志物
- C. 心电图
- D. 头颅 CT
- E. 动脉血气分析

45. 女, 65 岁。间断咳嗽, 咳痰 10 年, 加重伴呼吸困难 2 天。血气分析: pH 7.35, PaO₂ 56 mmHg, PaCO₂ 46 mmHg, 给予该患者鼻导管吸氧治疗, 如需使用的吸氧浓度为 27%, 则其氧流量应调整为

- A. 1.0 L/min
- B. 1.5 L/min

C. 2.0 L/min

D. 2.5 L/min

E. 3.0 L/min

46. 男, 74 岁。反复咳嗽、咳痰 30 年, 近 5 年来长期夜间家庭氧疗。1 周前因受凉出现喘息, 夜间入睡困难。昨夜自服“舒乐安定(艾司唑仑)”2 片, 并将吸氧流量提高至 4 L/min, 自觉喘息症状有所改善。今晨家属发现其呼之不应。入院查体: 双肺呼吸音低。双侧 Babinski 征(±)。该患者最可能出现的问题是

- A. 电解质紊乱
- B. 氧中毒
- C. 肺性脑病
- D. 镇静剂中毒
- E. 脑梗死

47. 男, 67 岁。反复咳嗽、咳痰 30 余年, 加重 1 周。查体: 双肺可闻及干湿啰音。动脉血气分析示: pH 7.21, PaCO₂ 75 mmHg, PaO₂ 50 mmHg, HCO₃⁻ 19.6 mmol/L, 酸碱平衡失调的类型是

- A. 代谢性碱中毒
- B. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- C. 代谢性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒
- E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

48. 男, 46 岁。吸烟史 20 年, 发热 2 周(37.5~38 °C), 右胸痛, 近 4 天胸痛减轻, 感胸闷、气促。查体: 右下胸语音震颤减弱, 叩诊浊音, 呼吸音降低。最可能的诊断是

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 支原体肺炎
- C. 结核性胸膜炎
- D. 浸润性肺结核
- E. 支气管肺癌

49. 女, 21 岁。午后发热伴胸闷、气短 1 周入院。胸部 X 线片示: 左侧胸腔积液(大量)。其气短的最主要的原因是

- A. 阻塞性通气功能障碍
- B. 肺组织弥散功能障碍
- C. 限制性通气功能障碍

- D.通气/血流比例失调
E.动-静脉分流
- 50.患者,男性,78岁。因进行性气短2周就诊,无咳嗽、发热、胸痛,胸部X线片示左侧大量胸腔积液。血WBC $8.9 \times 10^9/L$, N 0.72, Hb 110 g/L, ESR 36 mm/h。为明确诊断首先应进行的检查是
- A.支气管镜
B.胸腔穿刺
C.胸腔镜
D.纵隔镜
E.胸部CT
- 51.目前慢性心力衰竭的最常见病因是
- A.心房颤动
B.冠心病
C.风湿性心脏瓣膜病
D.扩张型心肌病
E.甲状腺功能亢进致心肌损害
- 52.慢性心力衰竭症状急性加重的最常见诱因是
- A.情绪激动
B.肺血栓栓塞
C.药物治疗不当
D.体力活动
E.感染
- 53.临床上能增加左心室后负荷的是
- A.二尖瓣反流
B.高血压
C.房间隔缺损
D.主动脉瓣反流
E.室间隔缺损
- 54.不是容量负荷过重所致心力衰竭的疾病是
- A.主动脉瓣关闭不全
B.甲状腺功能亢进症
C.二尖瓣关闭不全
D.室间隔缺损
E.高血压
- 55.最可能引起左心室前负荷增加的是
- A.二尖瓣狭窄
B.肺动脉瓣狭窄
C.主动脉瓣关闭不全
D.主动脉瓣狭窄
E.体循环动脉高压
- 56.下面哪项指标最能反映心力衰竭时心肌收缩减弱
- A.心输出量减少
B.心脏指数减少
C.射血分数减少
D.肺动脉压增高
E.中心静脉压增高
- 57.贫血和甲亢对心脏产生的影响使
- A.左室压力负荷加重
B.左室容量负荷加重
C.右室压力负荷加重
D.右室容量负荷加重
E.左、右室容量负荷加重
- 58.患者无心力衰竭的症状和(或)体征,但已出现心脏结构的改变,其心功能分期是
- A.C期
B.不能分期
C.A期
D.B期
E.D期
- 59.按心力衰竭发展阶段分级,临床心力衰竭阶段至少相当于
- A.NYHA 分级Ⅱ级
B.NYHA 分级Ⅳ级
C.NYHA 分级Ⅰ级
D.NYHA 分级Ⅲ级
E.Killip 分级Ⅰ级
- 60.心力衰竭患者水肿通常首先出现在
- A.眼睑
B.双手
C.颜面
D.身体最低部位
E.腹部
- 61.患者,男性,56岁。充血性心力衰竭,心率长期维持在100~110次/分,口服地高辛0.25 mg 每日1次,治疗2周后心率无明显下降。为了控制心率应首选的治疗措施是
- A.增加地高辛用量

- B.加用普罗帕酮
- C.加用胺碘酮
- D.加用维拉帕米
- E.β受体阻断药

62.患者,男性,26岁。近3年时有夜间阵发性呼吸困难,入院前一天出现气促,咳粉红色泡沫痰。体检:P 135次/分,心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音。心电图示:窦性心动过速,下列哪项治疗措施不宜使用

- A.经酒精湿化吸氧
- B.皮下注射吗啡
- C.静脉注射呋塞米
- D.静脉注射硝酸甘油
- E.静脉注射西地兰

63.女性,28岁。劳累后心悸、气促伴反复咯血4年。近来加重。夜间不能平卧。查体:心率110次/分。心音强弱不等,节律不整,心尖部舒张期隆隆样杂音,肺底可听到细小水泡音,下列哪项治疗是错误的

- A.静脉滴注低分子右旋糖酐
- B.静脉注射呋塞米
- C.吸氧
- D.口服硝酸异山梨酯
- E.口服地高辛

64.女,60岁。慢性心力衰竭2年。查体:BP 130/90 mmHg,双肺呼吸音清,心率98次/分,律齐,双下肢无水肿。加用美托洛尔治疗,其主要目的是

- A.改善心肌顺应性
- B.降低心脏前负荷
- C.降低心脏后负荷
- D.扩张冠状动脉
- E.降低心肌耗氧量

65.男,71岁。咳嗽、咳痰20年,气短2天,高血压病史20年。查体:T 37.5℃,BP 150/90 mmHg,半坐位,口唇发绀,呼吸相延长,双肺可闻及干湿啰音,心界向左下扩大,心率120次/分,律齐。为改善患者的临床症状,下列药物应首选的是

- A.西地兰(西地兰)
- B.氨茶碱

- C.肾上腺素
- D.吗啡
- E.呋塞米

66.女,64岁。突发气急4小时,伴咳嗽、咳粉红色泡沫样痰,不能平卧。高血压病史10余年。查体:BP 190/110 mmHg。心率110次/分,律齐,双肺可闻干性啰音及细湿啰音。治疗措施不正确的是

- A.静脉推注呋塞米
- B.静脉推注美托洛尔
- C.静脉滴注硝酸钠
- D.静脉推注吗啡
- E.高流量吸氧

67.男,56岁。间断活动时喘憋1年余,近期加重,重体力活动即感喘憋,有夜间憋醒。既往高血压病8年余,糖尿病4年余。查体:BP 150/100 mmHg,双肺呼吸音清,心率76次/分,律齐。患者经药物治疗症状好转,为改善预后需要长期使用的药物是

- A.洋地黄类药物
- B.肾上腺素能受体激动剂
- C.磷酸二酯酶抑制剂
- D.利尿剂
- E.血管紧张素转换酶抑制剂

68.男,71岁。高血压20年,规律服用福辛普利及氢氯噻嗪10年。近2年出现活动耐量下降,伴夜间憋醒。1周来患者感心悸,不能平卧。查体:P 100次/分,BP 130/80 mmHg,双肺底可闻及湿性啰音,心率128次/分,心律不齐,S₁强弱不等,心尖部可闻及2/6级收缩期杂音。缓解该患者心悸的最适宜药物是

- A.地高辛
- B.利多卡因
- C.美托洛尔
- D.地尔硫草
- E.普罗帕酮

69.男,43岁。进行性活动后心悸、气短5年。1周前受凉后咳嗽、咳黄痰,喘憋加重,夜间不能平卧。否认慢性咳嗽史。查体:BP 100/60 mmHg,双肺可闻及细湿啰音。心界向左扩大,心率115次/分,律齐,P₂亢进。该患

者喘憋的最可能原因是

- A. 支气管哮喘
- B. 心力衰竭
- C. 肺栓塞
- D. 急性心肌炎
- E. 慢性支气管炎急性发作

70. 患者, 男性, 19 岁。心肌炎全心衰竭患者, 服用地高辛 0.25 mg/d, 一周后检查心电图出现洋地黄中毒。其诊断依据可能是

- A. ST-T 鱼钩样下移
- B. 房速伴 2:1 传导阻滞
- C. Q-T 间期缩短
- D. P-P 间期延长
- E. 出现 U 波

71. 男, 87 岁。高血压病史 10 余年, 长期服用钙通道阻滞剂, 1 个月前因血压控制不满意加用美托洛尔 25 mg Bid, 近 1 周出现乏力、倦怠、间断黑蒙。查体: BP 110/70 mmHg, 心率 50 次/分, 心律不齐, 各瓣膜区未闻及杂音。心电图示“PR 间期逐渐延长直至 QRS 波群脱落”最恰当的处理是

- A. 植入永久起搏器
- B. 将美托洛尔调整为 12.5 mg Bid
- C. 将美托洛尔调整为 25 mg Qd
- D. 停用美托洛尔
- E. 将美托洛尔更换为地尔硫草 30 mg Tid

72. 男, 68 岁。持续心房纤颤 6 年, 一直服用地高辛治疗。近 1 周感心悸, 头晕。查体: 心率 41 次/分, 律齐。最可能的诊断是

- A. 窦性心动过缓
- B. 心房扑动 6:1 下传
- C. 病态窦房结综合征
- D. 房性逸搏心律
- E. 心房纤颤合并完全性房室传导阻滞

73. 女, 68 岁。1 年前于坐位早餐时无明显诱因突感心悸, 随之意识丧失跌倒, 数分钟后意识恢复。无大汗、肢体抽搐、口吐白沫和大小便失禁。1 年来反复发作上述症状 3 次。发作与体位和运动无关。查体: BP 130/70 mmHg, 心率 48 次/分。心电图示二度 II 型房室传导阻滞。该患者意识丧失最可能的原

因是

- A. 心律失常
- B. 迷走神经张力增高
- C. 癫痫发作
- D. 直立性低血压
- E. 低血糖

74. 女, 64 岁。持续胸痛 4 小时, 突然出现头晕。查体 BP 95/65 mmHg, 心率 32 次/分, 心律齐。心电图: II、III、aVF 导联 ST 段弓背向上抬高 0.3 mV。V₁ ~ V₅ 导联 ST 段压低 0.2 mV, QRS 波群时限 0.14 秒。该患者最可能出现的心律失常是

- A. 二度窦房传导阻滞
- B. 完全性右束支传导阻滞
- C. 三度房室传导阻滞
- D. 心房扑动
- E. 窦性心动过缓

75. 男性, 56 岁。近日来感心悸, 乏力, 头晕。心电图示: P-R 间期在相继的心动周期中逐渐延长, 最后发生 QRS 波群脱落。如此周而复始, 最可能是

- A. 二度 II 型房室传导阻滞
- B. 二度 I 型房室传导阻滞
- C. 心房颤动
- D. 一度房室传导阻滞
- E. 三度房室传导阻滞

76. 心电图示: P 波规律出现, P-R 间期为 0.22 秒, 每隔 2 个 P 波后有一次 QRS 波群脱落, 心房率 75 次/分, 心室率 50 次/分, 其诊断应为

- A. 一度房室传导阻滞
- B. 二度 I 型房室传导阻滞
- C. 二度 II 型房室传导阻滞
- D. 三度房室传导阻滞
- E. 房性心动过速伴 3:2 房室传导阻滞

77. 女性, 18 岁。患上呼吸道感染 1 周后, 感心悸, 气短, 乏力, 心率 98 次/分。心电图示 P-R 间期为 0.22 s。应诊断为

- A. 窦性心动过速
- B. 一度房室传导阻滞
- C. 二度 I 型房室传导阻滞

- D.二度Ⅱ型房室传导阻滞
E.窦性心律不齐
- 78.男,52岁。心悸头晕,四肢冰凉,见宽QRS波,心动过速,心律不规则,采取最合理的治疗是
- A.直流电复律
B.静脉注射普罗帕酮
C.静脉注射利多卡因
D.静脉注射普鲁卡因胺
E.静脉注射胺碘酮
- 79.男,65岁。心悸、头晕10分钟。BP 75/40 mmHg,心电图提示室性心动过速。最恰当的治疗是立即使用
- A.胺碘酮
B.索他洛尔
C.普罗帕酮
D.利多卡因
E.直流电复律
- 80.对药物治疗无效的反复发作室性心动过速/心室颤动的心力衰竭患者,最适宜的治疗为
- A.植入型心脏转复除颤器
B.服用阿托品
C.服用奎尼丁
D.安置房室顺序起搏器
E.静注维拉帕米
- 81.男,40岁。10小时前搬重物时突发上胸部疼痛,呈撕裂样,并逐渐向下胸部和腹部延伸。高血压病史15年。查体:T 36.3℃,BP 170/100 mmHg(左上肢),BP 140/75 mmHg(右上肢)。心率105次/分,心律齐。腹平软,Murphy征阴性。CK-MB正常。心电图正常。胸部X线片显示主动脉明显增宽。该患者胸痛最可能的病因是
- A.急性心肌梗死
B.变异型心绞痛
C.主动脉夹层
D.急性胆囊炎
E.急性心包炎
- 82.男,45岁。1年前发现血压170/110 mmHg,长期口服氨氯地平药物治疗。2个

月前诊断为糖尿病,口服降糖药治疗,目前血压、血糖均在正常范围。该患者高血压诊断正确的是

- A.高血压3级,高危
B.高血压1级
C.高血压3级,很高危
D.高血压2级,很高危
E.高血压2级,高危
- 83.男,32岁。发现血压增高3年。近1年血压持续为170~200/130~140 mmHg,近1周头痛、视力模糊。眼底检查发现视盘水肿,最可能的诊断为
- A.急性视盘病变
B.脑出血
C.恶性高血压
D.脑梗死
E.高血压脑病
- 84.患者,男性,65岁。患高血压病多年,1年来血压经常为170~180/110~120 mmHg。X线胸片示左室增大,肺淤血。眼底为高血压三级改变,尿常规正常,诊断为
- A.高血压病一级
B.高血压病二级
C.高血压病三级
D.急性高血压
E.高血压危象
- 85.男性,45岁。经常头痛,头晕近10年,2天来头痛加重,伴有恶心呕吐送往急诊。检查神志模糊,血压230/120 mmHg,尿蛋白(+),尿糖(+)。最可能的诊断是
- A.糖尿病酮症酸中毒
B.恶性高血压
C.高血压危象
D.肾性高血压
E.高血压脑病
- 86.患者,男性,50岁。有高血压病史5年,因近期未按时服药,近日出现明显头痛,烦躁,心悸多汗,面色苍白,视力模糊,测血压为230/130 mmHg。可能的诊断为
- A.库欣综合征
B.恶性高血压

- C. 高血压危象
- D. 高血压脑病
- E. 高血压肾脏改变

87. 男, 50 岁。突发眼底出血 1 小时。高血压病史 10 年, 规律服用降压药 1 年, 平时血压 140/95 ~ 100 mmHg。查体: 血压 210/120 mmHg, 结膜无出血、充血, 双肺呼吸音清, 心率 90 次/分, 律齐, 双下肢无水肿。治疗宜首选

- A. 肌肉注射利血平
- B. 口服美托洛尔
- C. 口服卡托普利
- D. 口服氨氯地平
- E. 静脉滴注硝普钠

88. 高血压患者, 突然胸闷, 气短。咳嗽, 不能平卧。查体: 血压 180/100 mmHg, 心尖区舒张期奔马律。心率 120 次/分, 两肺底湿性啰音, 下列哪组治疗最为适宜

- A. 地高辛、氢氯噻嗪、美托洛尔
- B. 呋塞米、硝酸甘油
- C. 西地兰、呋塞米、硝普钠
- D. 甘露醇、降压灵、安定
- E. 酚妥拉明、氨茶碱

89. 某高血压患者, 测其血压为 220/120 mmHg。急起呼吸困难。不能平卧, 双肺满布湿性啰音, 宜选用哪种血管扩张剂治疗

- A. 酚妥拉明
- B. 卡托普利
- C. 硝普钠
- D. 肼屈嗪
- E. 硝苯地平

90. 男, 68 岁。活动后心悸、气短 4 年, 突发憋喘 1 小时来诊。高血压病史 10 年余, 平时血压波动于 130 ~ 150/70 ~ 90 mmHg。查体: BP 230/100 mmHg, 端坐位, 双肺底可闻及少量湿啰音, 心率 114 次/分。该患者最适宜的治疗是

- A. 口服阿替洛尔
- B. 口服硝苯地平
- C. 口服哌唑嗪
- D. 肌内注射利血平

E. 静脉滴注硝普钠

91. 男, 68 岁。持续胸痛 2 小时, 既往体健。查体: BP 110/65 mmHg, 双肺呼吸音清, 心率 94 次/分, 心音低钝, $A_2 > P_2$ 。心电图 $V_1 \sim V_6$ 导联 ST 段弓背向上抬高 0.3 ~ 0.5 mV。实验室检查: 血清肌钙蛋白 I 水平正常。该患者最可能的诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 肺血栓栓塞
- C. 不稳定型心绞痛
- D. 急性心包炎
- E. 急性心肌炎

92. 男, 48 岁。发作性胸痛 1 个月, 每次发作含硝酸甘油后缓解, 考虑冠心病心绞痛。最常用的检查方法是

- A. 心脏 X 线摄影
- B. 心电图运动负荷试验
- C. 放射性核素检查
- D. 动态心电图
- E. 超声心动图

93. 男, 55 岁。近 6 个月来反复发生活动时胸骨后闷痛, 每于快步行走或负重时发生, 每月约发作 1 次, 每次持续 3 ~ 5 分钟, 休息后可自行缓解, 该患者的心绞痛类型是

- A. 初发劳力型心绞痛
- B. 变异型心绞痛
- C. 混合型心绞痛
- D. 恶化劳力型心绞痛
- E. 稳定劳力型心绞痛

94. 男, 50 岁。劳累时胸痛 2 年, 每于上 3 层楼梯时症状发作, 含服硝酸甘油 1 ~ 3 分钟可缓解。既往高血压病史 5 年, 糖尿病病史 4 年。可改善该患者预后的治疗措施是

- A. 长期口服他汀类药物
- B. 长期口服营养心肌类药物
- C. 冠状动脉支架植入术
- D. 冠状动脉旁路移植术
- E. 皮下注射低分子肝素

95. 男性, 54 岁。1 年前日常活动后出现胸骨后疼痛, 每日 2 ~ 3 次, 近 2 个月发作次数增多, 每日 5 ~ 6 次, 轻微活动也能诱发, 发作

时心电图 ST 段呈一过性水平压低,应诊断为

- A. 稳定型心绞痛
- B. 不稳定型心绞痛
- C. 心内膜下心肌梗死
- D. 中间综合征
- E. 变异型心绞痛

96. 患者, 男性, 55 岁。1 年来反复发作胸骨后疼痛, 发作和劳累关系不大。发作时含硝酸甘油可缓解。平时心电图示 II、III、aVF 导联 ST 段水平压低 0.75 mm。发作时心电图正常。最可能的诊断是

- A. 劳力型心绞痛
- B. 变异型心绞痛
- C. 急性心肌梗死极早期
- D. 心绞痛合并心包炎
- E. 卧位型心绞痛

97. 女性, 48 岁。间发心前区闷痛 1 个月, 常夜间发作。发作时心电图 II、III、aVF 导联 ST 段上抬考虑为冠心病心绞痛, 缓解期治疗最好选用哪种药物

- A. 长效硝酸甘油
- B. 普萘洛尔
- C. 双嘧达莫
- D. 异山梨酯
- E. 地尔硫革

98. 女性, 57 岁。高血压、冠心病患者, 近日心前区闷痛发作频繁, 伴头胀, 测血压为 150/100 mmHg, 心电图示胸痛发作时相关导联 ST 段一过性抬高。应采取何种药物治疗最为适宜

- A. 洋地黄
- B. 硝苯地平
- C. 利多卡因
- D. β 受体阻断药
- E. 利尿药

99. 患者, 男性, 45 岁。因心前区剧痛 2 小时来急诊, 心电图检查结论为后壁心肌梗死。梗死图形应出现在下列哪些导联

- A. $V_1 \sim V_3$
- B. $V_4 \sim V_6$
- C. I、aVL

D. $V_4 \sim V_6$ 及 I、aVL、II

E. $V_7 \sim V_8$

100. 患者, 男性, 66 岁。因胸痛 9 小时来院急诊, 心电图证实为急性前壁心梗, 下列哪项检查特异性最高

- A. 血清 cTnI/T 增高
- B. SGOT 增高
- C. 血沉加快
- D. 血清 CPK 增高
- E. 血清 LDH 增高

101. 男, 55 岁。急性心肌梗死 4 周, 今晨再发胸痛, 持续 8 小时不缓解, 遂来急诊。查体: BP 100/60 mmHg, 心率 95 次/分, 心肺检查无异常。心电图: I、aVL 导联 ST 段弓背向上抬高。血清肌钙蛋白升高。该患者胸痛最可能的原因是

- A. 心脏破裂
- B. 心室膨胀瘤
- C. 急性心包炎
- D. 再发急性心肌梗死
- E. 心绞痛

102. 男, 65 岁。急性广泛前壁心肌梗死 4 天, 突发喘憋 2 小时。查体: 血压 90/60 mmHg, 双肺未闻及干湿啰音, 心率 105 次/分, 律齐, 胸骨左缘第 4 肋间可闻及响亮的收缩期杂音伴震颤。该患者喘憋最可能的原因是

- A. 支气管哮喘
- B. 心房颤动
- C. 感染性心内膜炎
- D. 室间隔穿孔
- E. 肺炎

103. 男性, 48 岁。急性前壁心肌梗死 15 小时, 合并急性左心功能不全, BP 170/100 mmHg。治疗其心功能不全应首选

- A. β 受体阻滞药
- B. 地高辛
- C. 硝普钠
- D. α 受体阻滞药
- E. 卡托普利

104. 男性, 51 岁。急性前壁心肌梗死, 起病第 2 天发生心房颤动。心室率 184 次/分,

血压 84/60 mmHg,气急发绀,宜首选哪项治疗措施

- A. 静脉注射西地兰
- B. 同步电击除颤
- C. 静脉注射美托洛尔
- D. 静脉注射多巴酚丁胺
- E. 静注胺碘酮

105. 男性,58岁。3小时前急起剧烈胸痛,大汗,尿量减少,脉细弱。PCWP与左室舒张末期压力均明显升高。为早期进行冠脉再灌注,宜首选哪种方法

- A. 链激酶溶栓治疗
- B. 急诊冠脉旁路移植术
- C. 经皮腔内冠状动脉成形术
- D. 大量输液补充血容量
- E. 主动脉内气囊反搏

106. 患者,男性,65岁。心绞痛发作持续4小时。含硝酸甘油无效。心电图示Ⅱ、Ⅲ、aVF导联呈弓背样抬高6mm, V₁~V₃导联ST段水平样压低4mm,偶发室性期前收缩1次,诊断为急性心肌梗死。10小时后出现烦躁不安,血压偏低,心率45次/分,心电示Ⅲ度房室传导阻滞,频发房性期前收缩,此时治疗应首先

- A. 静滴异丙肾上腺素
- B. 静滴普罗帕酮
- C. 应用升压药
- D. 临时心脏起搏
- E. 静滴阿托品

107. 患者,男性,54岁。因急剧胸痛8小时入院,含服硝酸甘油效果不佳,BP 165/95 mmHg,心率110次/分,伴偶发性室性期前收缩,心电图示胸导T波高尖,哪种治疗效果佳

- A. 口服卡托普利
- B. 口服地尔硫革
- C. 静注利多卡因
- D. 口服美西律
- E. 静注美托洛尔继以口服

108. 患者,男性,55岁。突然胸痛2小时不缓解。心电图示急性广泛前壁心肌梗死,无特殊病史。首选的关键性治疗措施应该是

- A. 静点硝酸甘油
- B. 皮下注射肝素
- C. 溶栓治疗
- D. 肌注吗啡
- E. 吸氧

109. 男性,70岁,糖尿病10年,以往无心悸、胸痛史,今日早餐后1小时,突然胸闷明显,面色苍白,烦躁,出汗恐惧感,2小时未缓解。体检:心率100次/分。血压86/70 mmHg,最可能诊断为

- A. 糖尿病酸中毒
- B. 不典型心绞痛
- C. 低血糖
- D. 变异型心绞痛
- E. 急性心肌梗死

110. 二尖瓣关闭不全的特异性体征是

- A. 胸骨左缘第2肋间连续性机器样杂音
- B. 胸骨右缘第2肋间收缩期喷射样杂音
- C. 心尖部全收缩期吹风样杂音
- D. 胸骨左缘第3肋间舒张期叹气样杂音
- E. 心尖部舒张中晚期隆隆样杂音

111. 患者,男性,27岁。劳累时心悸、胸骨后疼痛1年。查体:可闻及主动脉瓣区收缩期粗糙的喷射性杂音,主动脉瓣区第二心音减弱。X线检查示:左室扩大和升主动脉扩张,可能的诊断是

- A. 冠心病心绞痛
- B. 非梗阻性肥厚型心肌病
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 高血压性心脏病

112. 38岁,女性。活动后心悸、气喘1年余。查体轻度贫血,心率快,律齐,胸骨右缘第2肋间闻及响亮而粗糙的收缩期杂音(3/6级)。首先应想到的疾病为

- A. 动脉导管未闭
- B. 主动脉瓣关闭不全
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 室间隔缺损
- E. 主动脉瓣狭窄

113. 女,65岁。发作性左胸痛5年,疼痛

放射至左肩,发作持续3分钟,休息后可缓解。今日下午劳动时突发晕厥急诊。查体:BP 90/50 mmHg,神清,心率140次/分,主动脉瓣区可闻及收缩期喷射样杂音伴震颤,杂音向颈部传导,双肺呼吸音清。最可能的诊断是

- A. 高血压病
- B. 主动脉扩张
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉粥样硬化
- E. 主动脉瓣关闭不全

114.女,34岁。风湿性心脏瓣膜病主动脉瓣狭窄9年,进行性活动耐力减低,近1年来,每于剧烈运动中发生晕厥。无高血压、糖尿病、高脂血症病史。查体:BP 100/70 mmHg。心率78次/分,律齐,主动脉瓣区可闻及收缩期喷射性杂音。超声心动图提示左心室增大,LVEF 40%,主动脉瓣瓣口面积 1.1 cm^2 ,平均压力阶差55 mmHg,跨瓣峰速度5.4 m/s。对该患者最恰当的处置是

- A. 晕厥时硝酸甘油急救
- B. 主动脉瓣置换术
- C. 口服阿托伐他汀
- D. 每日口服单硝酸异山梨酯
- E. 避免竞技性运动,其他体力活动不受限

115.老年男性,因咳嗽、咳黄痰3天就诊。查体发现主动脉瓣区粗糙的收缩期杂音。超声心动图示主动脉瓣狭窄,左室射血分数0.55,心电图检查正常。对该患者处置方法不正确的是

- A. 抗生素
- B. 化痰药物
- C. 血管紧张素转换酶抑制剂
- D. 定期做超声心动图
- E. 胸部X线检查

116.男性,30岁。原有风心病史,因持续性发热,乏力,食欲缺乏来诊。经检查拟诊为亚急性感染性心内膜炎,体格检查时下列哪个体征不可能出现

- A. 环形红斑
- B. 瘀点
- C. 心脏杂音变化

D. 心率40次/分,心电图示Ⅲ度房室传导阻滞

E. 脾肿大伴脾区摩擦音

117.男,38岁。发热半个月,弛张热型,伴寒战、关节痛。体检:皮肤瘀点、Osler结节,心脏有杂音,考虑为感染性心内膜炎。确诊的直接证据来自

- A. 超声心动图
- B. 心电图检查
- C. 血液学检查
- D. 免疫学检查
- E. 细菌学检查

118.患者,女,心脏联合瓣膜病10年,发热1个月,体温 $37.2\sim 37.6\text{ }^{\circ}\text{C}$,厌食,消瘦,贫血貌。确诊手段首选

- A. 胸部X线
- B. 血培养
- C. 测定血红蛋白
- D. 心肌酶检查
- E. 测定血沉

119.女,55岁。拔牙后间断发热2个月。既往有室间隔缺损病史。实验室检查:血培养为草绿色链球菌。最有助于明确发热病因的检查是

- A. 血类风湿因子
- B. 经食道超声心动图
- C. 血清补体
- D. 血涂片
- E. 眼底检查

120.女,30岁。持续发热2周,有先天性心脏病病史。入院查体:贫血貌,胸骨左缘3~4肋间4/6级粗糙收缩期杂音伴震颤,脾肋下2cm,血培养2次阳性。入院后3天突感呼吸困难、胸痛,咯血多次。可能性最大的诊断是

- A. 室间隔缺损合并急性心衰
- B. 感染性心内膜炎合并急性肺栓塞
- C. 感染性心内膜炎合并肺部感染
- D. 室间隔缺损合并肺部感染
- E. 室间隔缺损合并支气管扩张症

121.某医院新生儿室发现多名发热、流涕、口唇发绀患儿。体检时均表现为心动过

速,心音低钝,肺部体征(-)。心动图检查呈心肌炎表现。患儿最可能感染的病毒是

- A. 流感病毒
- B. 疱疹病毒
- C. 脊髓灰质炎病毒
- D. 麻疹病毒
- E. 柯萨奇病毒

122. 患者,女性,32岁。心悸气短2年,夜间喘憋半年,下肢水肿3个月。查体:心脏大,心音低钝,肝大,下肢水肿。X片:心影明显增大,心胸比率 $>60\%$,肺淤血。心电图示 V_1 、 V_2 、 V_3 病理性Q波,低电压,ST-T改变。以下检查最有意义的是

- A. 脑电图
- B. 脑CT
- C. 心脏ECT
- D. 超声心动图
- E. 食管钡透

123. 患者,男性,35岁。气短少尿1周。查体:半坐位,全心扩大,心率135次/分,房颤,心音低钝,心尖部3/6收缩期吹风样杂音,两肺湿啰音,肝大,腹水征(+)。UCG:全心扩大,室壁运动明显减弱。为明确诊断应做以下哪项检查

- A. 心脏核素扫描
- B. 心脏CT
- C. 普萘洛尔试验
- D. 糖耐量试验
- E. 心肌活检

124. 男,38岁。1年来活动后气促,伴腹胀及双下肢水肿,自述既往无不适,生活工作正常。查体:BP 100/60 mmHg,颈静脉怒张,双肺底可闻及湿性啰音,心界向两侧扩大, S_1 减弱,心尖部可闻及3/6级收缩期杂音,肝肋下3 cm,双下肢凹陷性水肿。该患者最可能的诊断是

- A. 冠心病
- B. 扩张型心肌病
- C. 肥厚型心肌病
- D. 风湿性心脏病
- E. 缩窄性心包炎

125. 男,36岁。活动性气急、夜间阵发性呼吸困难3年。查体:血压100/60 mmHg,无颈静脉怒张,双下肺可闻及少许湿啰音,心率90次/分,双下肢水肿(+)。超声心动图显示:全心扩大,以左心室扩大为主,二尖瓣前叶舒张活动振幅降低,瓣口开放小,呈钻石样双峰图形。该患者最可能的诊断是

- A. 风湿性心脏病
- B. 纤维蛋白性心包炎
- C. 渗出性心包炎
- D. 肥厚型心肌病
- E. 扩张型心肌病

126. 男性,79岁。原有慢性支气管炎,肺气肿及慢性肝病史。本次因气急,腹胀,下肢水肿。入院检查,疑有心包疾患,体检发现有腹腔积液,下列体检结果哪项最支持心包疾病引起的腹腔积液

- A. 颈静脉怒张
- B. 下肢水肿
- C. 肝颈回流征(+)
- D. 心界叩诊不扩大
- E. 肝大

127. 男性,18岁。不慎被车床击伤左胸部来急诊,检查时高度怀疑有心包积血,此时可能出现下列哪种脉搏

- A. 短绌脉
- B. 交替脉
- C. 奇脉
- D. 水冲脉
- E. 细脉

128. 男性,30岁。1月来发热伴心悸、气急来诊,超声心动图示左室后壁和右心室前壁有2.5~3 cm液性暗区。此时体检,下列哪项体征是不会存在的

- A. 心绝对浊音界向两侧增大
- B. 吸气时脉搏增强
- C. 背部左肩胛下角呈浊音,语颤增强
- D. 胸骨右缘等3~6肋间叩诊呈实音
- E. 腹部移动性浊音阳性

129. 男性,38岁。半月来发热,乏力就诊,无胸痛与关节痛,体检颈静脉充盈,心界向两

侧扩大,心音遥远,心率 103 次/分,肝大。化验血,白细胞计数 $10 \times 10^9/L$ 。血沉 25 mm/h, B 超检查为心包积液,心包穿刺抽出 800 mL 浅草黄色液体,光镜检查白细胞 $0.4 \times 10^9/L$ ($400/mm^3$),中性 40%,淋巴 60%。本例心包炎的病因以哪项可能性最大

- A.急性非特异性
- B.风湿性
- C.化脓性
- D.结核性
- E.阿米巴性

130.女,37 岁。因阵发性室上性心动过速行射频消融术治疗,术中患者突然出现胸闷、烦躁、呼吸困难。查体 BP 80/70 mmHg,颈静脉怒张,两肺呼吸音清,心界稍向两侧扩大,心率 120 次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音,奇脉(+)。导致其临床表现的机制是

- A.心排血量增加,静脉压升高
- B.心排血量不变,静脉压升高
- C.心排血量下降,静脉压降低
- D.心排血量增加,静脉压降低
- E.心排血量下降,静脉压升高

131.休克患者经补液后,血压仍低,中心静脉压不高,5~10 分钟内经静脉注入等渗盐水 250 mL,如血压升高,而中心静脉压不变,提示

- A.心功能不全
- B.血容量过多
- C.血容量不足
- D.血管张力过高
- E.以上均不是

132.男性,因交通事故致脾破裂,入院时血压 80/60 mmHg,脉搏 120 次/分,神志尚清,口渴,肤色苍白,尿少,估计失血量

- A.100~300 mL
- B.400~600 mL
- C.800~1 600 mL
- D.1 800~2 000 mL
- E.大于 2 000 mL

133.男性,50 岁。车祸后 6 小时入院,神志淡漠,四肢冰冷,血压 70/50 mmHg,诊断为

- A.轻度低血容量性休克
- B.中度低血容量性休克
- C.重度低血容量性休克
- D.中度感染性休克
- E.重度感染性休克

134.男,19 岁。被人踢伤腹部,腹痛 8 小时,尿少 2 小时。查体:BP 68/50 mmHg,意识模糊,面色苍白,四肢厥冷,脉搏细速,全腹压痛,有肌紧张,反跳痛(+),移动性浊音(+).该患者目前的病情为

- A.神经性休克
- B.心源性休克
- C.过敏性休克
- D.感染性休克
- E.低血容量性休克

135.男,35 岁。车祸后双侧股骨干骨折。BP 90/60 mmHg,中心静脉压 8 cmH₂O,首选的处理措施是

- A.大量输血
- B.强心药治疗
- C.糖皮质激素治疗
- D.应用肾上腺素
- E.补液治疗

(136~138 题共用题干)

男,56 岁。近 1 周来“上呼吸道感染”后出现呼吸困难,夜间为著,可逐渐自行缓解。白天症状不明显。既往高血压病史 10 年,血压控制欠满意。已戒烟 10 年。过敏鼻炎病史 5 年。门诊心肺检查及胸部 X 线片未见异常,行超声心动图检查未见异常。

136.该患者首先考虑的诊断是

- A.慢性阻塞性肺疾病
- B.支气管哮喘
- C.心力衰竭
- D.睡眠呼吸暂停综合征
- E.冠心病

137.为明确诊断首先采取的检查是

- A.肺功能
- B.睡眠呼吸监测
- C.胸部 CT
- D.动脉血气分析

E. 冠状动脉 CT 血管造影术

138. 该患者入院后仍间断发作憋气, 在进行检查和临床观察时应特别关注的是

- A. 症状缓解时的活动耐力
- B. 上呼吸道检查
- C. 血压波动情况
- D. 发作时心肺体征
- E. 有无杵状指

(139~141 题共用题干)

患者, 男性, 46 岁。风湿性心脏病联合瓣膜病 9 年, 近 4 年来经常因心衰住院治疗。体检: 半卧位, 颈静脉怒张, 心界扩大, 心率 130 次/分, 心尖部奔马律, 二尖瓣主动脉瓣双期杂音, 左肺底湿啰音, 右肺叩浊, 呼吸音消失, 肝大, 下肢水肿。X 线片: 右侧胸腔积液。

139. 本例右侧胸腔积液产生的机制是

- A. 营养不良, 血浆蛋白降低
- B. 心源性肝硬化
- C. 胸膜脏层和壁层静脉回流受阻
- D. 水钠潴留
- E. 胸膜缺氧, 毛细血管通透性增高

140. 在慢性充血性心力衰竭急性发作的诱因中最常见的是

- A. 严重心律失常
- B. 妊娠与分娩
- C. 过劳和情绪激动
- D. 肺部感染
- E. 输液过量和过快

141. 本例肝大和肝病的肝大, 最主要的鉴别是

- A. 血浆白蛋白正常
- B. 静脉压增高
- C. 无黄疸
- D. 两对半阴性
- E. 转氨酶正常

(142~143 题共用题干)

男, 46 岁。体检发现血压升高 6 个月。查体: 血压 150/100 mmHg, 心率 86 次/分, 律齐。实验室检查: 血肌酐 96 $\mu\text{mol/L}$, 尿酸 500 $\mu\text{mol/L}$ 。

142. 该患者控制血压的目标值是血压

低于

- A. 130/80 mmHg
- B. 120/70 mmHg
- C. 140/90 mmHg
- D. 130/90 mmHg
- E. 140/80 mmHg

143. 该患者不宜选用的降压药是

- A. 血管紧张素 II 受体拮抗剂
- B. 噻嗪类利尿剂
- C. 钙通道阻滞剂
- D. 血管紧张素转换酶抑制剂
- E. β 受体拮抗剂

B1 型题

(144~145 题共用备选答案)

- A. 支原体肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 慢性支气管炎急性发作期
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管扩张症

144. 病变肺部叩诊浊音, 语颤增强, 闻及支气管呼吸音, 常见于

145. 发作时两肺广泛哮鸣音, 缓解后哮鸣音消失, 常见于

(146~147 题共用备选答案)

- A. 肺炎克雷伯菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 金黄色葡萄球菌
- E. 流感嗜血杆菌

146. 上述病原体中, 最常见于社区获得性肺炎的是

147. 上述病原体中, 血浆凝固酶(+)的是

(148~150 题共用备选答案)

- A. I 级
- B. II 级
- C. III 级
- D. IV 级
- E. V 级

148. 一般体力活动不受限仅在强、快或长时间劳动时发生心绞痛是

149. 一切体力活动都引起不适, 静息时也

可发生心绞痛是

150.一般体力活动轻度受限,快步、饭后、

寒冷或刮风、精神应激或醒后数小时内步行或

登楼引起心绞痛是

第三单元

1.患儿,男,3岁。腹泻3天,加重1天。腹泻10~12次/日,水样便。尿量减少。查体:眼窝凹陷,皮肤弹性差,脉搏可扪及。查血钠135 mmol/L。该患儿脱水的程度与性质应是

- A.重度低渗性
- B.重度等渗性
- C.重度高渗性
- D.中度等渗性
- E.中度高渗性

2.患儿,男,7个月。因腹泻一天,发热39℃,于9月13日入院。查体:精神可,无明显脱水征,咽红,大便呈蛋花汤样,脂肪球(+).其引起腹泻的最可能病因是

- A.细菌性痢疾
- B.进食过量或喂养不当
- C.病毒性肠炎
- D.生理性腹泻
- E.致病性大肠杆菌肠炎

3.8个月婴儿,于11月8日因呕吐、水样泻、发热、流涕2天入院,大便镜检:白细胞1~3/HP,可见脂肪滴,大便pH偏酸性。可能的病原体是

- A.致病性大肠杆菌
- B.霉菌
- C.腺病毒
- D.金黄色葡萄球菌
- E.轮状病毒

4.用于胃食管反流病诊断性治疗的药物是

- A.多潘立酮
- B.枸橼酸铋钾
- C.奥美拉唑
- D.铝碳酸镁
- E.雷尼替丁

5.食管癌分型不包括

- A.髓质型
- B.缩窄、硬化型
- C.蕈伞型
- D.溃疡型
- E.梗阻型

6.食管癌最常见的发生部位是

- A.胸上段
- B.胸中段
- C.胸下段
- D.腹段
- E.颈段

7.早期食管癌的症状是

- A.持续胸背痛
- B.声嘶
- C.进食呛咳
- D.吞咽困难
- E.进食哽噎

8.食管癌的早期临床表现不包括

- A.食管内异物感
- B.胸骨后针刺样疼痛
- C.咽下食物时哽噎感
- D.进行性吞咽困难
- E.上腹部烧灼感

9.典型的食管癌症状特点是

- A.胸痛
- B.持续性胸骨后异物感
- C.反酸、胃灼热伴吞咽困难
- D.渐进性加重的吞咽困难
- E.间断吞咽困难伴呕吐

10.食管癌的X线表现不包括

- A.食管僵硬
- B.黏膜皱襞增粗
- C.黏膜呈串珠样改变
- D.黏膜皱襞断裂
- E.充盈缺损或龛影

11.男,52岁。头颈部、双上肢浅烧伤,伤

后第3天出现黑便,量约700 mL。查体:P 107次/分,BP 85/60 mmHg。最可能的原因是

- A.慢性胃炎出血
- B.胆道出血
- C.消化性溃疡出血
- D.食管溃疡出血
- E.应激性溃疡出血

12.男,56岁。突发性右侧肢体无力,伴头痛、呕吐,排黑便2次。有高血压和糖尿病史5年。黑便原因很可能是

- A.食管癌
- B.胃癌
- C.胃溃疡
- D.急性胃黏膜病变
- E.胃底静脉曲张破裂出血

13.男性,63岁。上腹痛2小时,伴恶心,呕吐胃内容物2次,在下列疾病诊断中,可能性最小的是

- A.心肌梗死
- B.急性胰腺炎
- C.急性阑尾炎
- D.美尼尔综合征
- E.急性胃炎

14.男,70岁。突发剧烈头痛、呕吐、左侧肢体活动障碍6小时,昏迷5小时。1小时前呕暗红色血液1次。应首先考虑的呕血原因是

- A.急性胃黏膜病变
- B.Dieulafoy病变
- C.胃癌
- D.十二指肠溃疡
- E.肝硬化食管胃底静脉曲张破裂

15.女,18岁。因大面积烧伤住院治疗3天,上腹痛1天,2小时来排柏油便3次。查体:P 96次/分,BP 110/70 mmHg。实验室检查:WBC $11.8 \times 10^9/L$,血红蛋白92 g/L。首选的治疗措施是

- A.口服胃黏膜保护剂
- B.静脉应用止血药
- C.静脉应用质子泵抑制剂

D.静脉应用H₂受体拮抗剂

E.输血

16.患儿,男,1个月。咳嗽1天,发热3小时,T 39.3℃,就诊过程中突然双眼上翻,肢体强直,持续1分钟。查体:咽红,心、肺、腹及神经系统无异常,半年前也有相同病史。最可能的诊断是

- A.癫痫
- B.低钙惊厥
- C.中毒性脑病
- D.化脓性脑膜炎
- E.热性惊厥

17.患者,男,5岁。咳嗽4个月,凌晨及活动后加剧,服用多种抗生素无效,服用特布他林后有缓解。查体:无发热,面及颈部散在湿疹。两肺呼吸音粗。该患儿最可能的诊断是

- A.毛细支气管炎
- B.支气管异物
- C.咳嗽变异型哮喘
- D.支气管淋巴结核
- E.儿童哮喘

18.患儿,男,2岁。发热、咳嗽4天,咳喘加重1天。查体:双肺可闻及散在中小水泡音。血白细胞 $10 \times 10^9/L$,中性0.65,淋巴0.35。最可能的诊断是

- A.支气管炎
- B.支气管肺炎
- C.毛细支气管炎
- D.上呼吸道感染
- E.支气管哮喘

19.患儿,3岁。发热伴咳嗽,诊断为链球菌肺炎,用抗生素治疗的疗程应持续至体温正常后

- A.2~4天
- B.5~7天
- C.8~10天
- D.11~13天
- E.14~16天

20.患者,男,5岁。反复咳嗽3个月,常于夜间咳醒,活动后加重,痰不多,无发热,使用抗生素无效。既往有湿疹史。查体:双肺呼吸

音粗,无哮鸣音。最可能的诊断是

- A. 支气管炎
- B. 喘息性支气管炎
- C. 咳嗽变异型哮喘
- D. 胃食管反流病
- E. 支气管异物

21. 下列属于肝硬化肝肾综合征诊断标准的是

- A. 肝硬化不合并腹水
- B. 有休克
- C. 近期未使用肾毒性药物
- D. 可有肾实质损害
- E. 肌酐大于 $123 \mu\text{mol/L}$

22. 肝硬化合并自发性细菌性腹膜炎时,选择抗生素的原则是

- A. 针对 G^- 杆菌,兼顾 G^+ 球菌
- B. 针对 G^+ 球菌,兼顾厌氧菌
- C. 针对 G^+ 杆菌,联合抗真菌药物
- D. 针对 G^- 球菌,兼顾厌氧菌
- E. 针对 G^- 杆菌,联合抗真菌药物

23. 门静脉高压症的主要原因是

- A. 门静脉主干先天性畸形
- B. 肝静脉血栓形成、狭窄
- C. 肝段下腔静脉阻塞
- D. 肝硬化
- E. 各种原因致脾静脉血流量过大

24. 门静脉血流受阻后,首先出现的是

- A. 充血性脾肿大
- B. 门静脉高压性胃病
- C. 脾功能亢进
- D. 肝性脑病
- E. 腹水

25. 不符合门静脉血流受阻后病理生理变化的是

- A. 腹水
- B. 交通支扩张
- C. 门静脉高压性胃病
- D. 肝性脑病
- E. 脾肿大

26. 男,44岁。右上腹疼痛3天。伴寒战、高热(39.2°C),食欲不振,乏力。右上腹皮肤

有凹陷性水肿,肝肋下5cm,有压痛。血 WBC $19 \times 10^9/\text{L}$, N 0.92。B超示右肝内多个2~3cm大小的液性暗区。X线片示右膈肌升高,肝阴影增大。抗感染治疗主要针对的细菌是

- A. 产气荚膜梭菌
- B. 无芽孢厌氧菌
- C. 溶血性链球菌
- D. 肉毒梭菌
- E. 志贺菌

27. 女,40岁。右上腹胀痛伴畏寒、发热2天,巩膜黄染1天。查体:T 39°C , P 100次/分,右上腹部压痛、反跳痛及肌紧张明显,肝区叩击痛阳性。血见 WBC $18.2 \times 10^9/\text{L}$, N 0.85。B超示胆囊及胆总管结石。该患者最可能感染的致病菌是

- A. 草绿色链球菌
- B. 大肠埃希菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 肺炎链球菌

28. 男,45岁。持续性右上腹痛伴寒战高热、恶心呕吐10天。查体:皮肤、巩膜无黄染,右季肋区饱满,肝肋下4cm,边缘钝,有压痛,无结节,右侧第7、8肋间腋中线皮肤水肿和压痛。血 WBC $18.5 \times 10^9/\text{L}$, N 0.91。腹部:B超示肝右叶内 $8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$ 液性暗区。X线示右膈肌升高,运动受限。最可能的诊断是

- A. 细菌性肝脓肿
- B. 胆囊结石伴感染
- C. 肝癌伴感染
- D. 右膈下脓肿
- E. 肝囊肿

29. 男,55岁。慢性乙型肝炎病史15年,肝区隐痛2个月。腹部B超提示肝后叶直径约2cm的低回声结节。对诊断最有意义的实验室检查是

- A. 碱性磷酸酶
- B. 癌胚抗原
- C. γ -谷氨酰转氨酶
- D. 甲胎蛋白
- E. CA199

30.男,55岁。右季肋部疼痛2个月,逐渐加重,并伴乏力,体重下降6 kg。慢性乙型肝炎病史18年。对明确诊断最有意义的实验室检查是

- A.甲胎蛋白
- B.碱性磷酸酶
- C.谷氨酸转移酶
- D.丙氨酸氨基转移酶
- E.白蛋白

31.急性胆囊炎的典型体征是

- A.上腹部有压痛和反跳痛
- B.Grey-Turner 征阳性
- C.Murphy 征阳性
- D.肝浊音界缩小
- E.McBurney 点有压痛和反跳痛

32.Murphy 征阳性提示

- A.细菌性肝脓肿
- B.急性胆管炎
- C.肝总管结石
- D.左肝管结石
- E.急性胆囊炎

33.急性胆囊炎的表现不包括

- A.右上腹压痛
- B.大多伴有黄疸
- C.右上腹局限性肌紧张
- D.可伴有右肩部不适症状
- E.右上腹持续性痛并阵发性加重

34.胆囊结石反复诱发急性胆囊炎最可靠的治疗是

- A.抗生素治疗
- B.口服溶石剂
- C.口服中药排石汤
- D.手术切除胆囊
- E.碎石治疗

35.急性胆囊炎最严重的并发症是

- A.细菌性肝脓肿
- B.胆囊积脓
- C.胆囊坏疽穿孔
- D.并发急性胰腺炎
- E.胆囊十二指肠内瘘

36.患者,女性,79岁。因胆囊结石、胆囊

炎入院,保守治疗5天后腹痛加剧。查体:T 39.5℃,P 120次/分,BP 106/70 mmHg。皮肤及巩膜无黄染,右上腹肌紧张,局限性压痛、反跳痛。血常规:血 WBC $20 \times 10^9/L$,N 0.89。最适合的治疗是

- A.胆囊造瘘术
- B.胆总管切开引流术
- C.静脉点滴抗菌药物
- D.鼻胆管引流术
- E.腹腔引流术

37.女,31岁。腹痛、寒战、高热、黄疸反复发作3年。1天来上腹部持续性疼痛,伴阵发性绞痛,恶心,无呕吐。查体:T 38.6℃,巩膜黄染,右上腹压痛(+),无反跳痛,胆囊大,Murphy 征(+)。最佳处理措施是

- A.胆总管奥狄氏括约肌切开术
- B.胆囊造瘘术
- C.单纯胆囊切除术
- D.胆囊切除术+胆总管探查T管引流术
- E.胆囊切除+胆总管十二指肠吻合术

38.男,64岁。上腹疼痛5小时。胆囊多发结石病史5年。查体:T 38.3℃,P 100次/分,BP 85/60 mmHg,皮肤、巩膜黄染,右上腹肌紧张,压痛(+).为明确诊断,首选的检查是

- A.腹部B超
- B.腹部CT
- C.胆道镜检查
- D.经皮肝穿刺胆管造影
- E.经内镜逆行胰胆管造影

39.女,59岁。无痛性进行性皮肤巩膜黄染3个月。查体:T 36.4℃,P 60次/分,BP 120/90 mmHg。皮肤巩膜黄染,右上腹可触及肿大的肝脏和胆囊。Murphy 征(-)。首先进行的腹部影像学检查是

- A.MRI
- B.B超
- C.X线
- D.核素扫描
- E.CT

40.男,62岁。皮肤黄染进行性加重1个月,伴上腹胀,隐痛,食欲差,乏力。10天前感

皮肤瘙痒,大便呈白陶土样。查体:消瘦,巩膜黄染,腹部稍胀,无明显压痛,未触及包块,胆囊无肿大。血 AFP $5 \mu\text{g/L}$ 。最可能的诊断是

- A.肝门部胆管癌
- B.胆囊癌
- C.胆总管下段癌
- D.肝癌
- E.胰头癌

41.下列关于胰腺炎的叙述,不正确的是

- A.常在饱餐或饮酒后发作
- B.腹痛多向腰背部放射,以左侧为著
- C.治疗期间禁食、胃肠减压
- D.血清淀粉酶 $>300 \text{ U/dl}$ (Somogyi 法)即可诊断

E.禁食期间靠 TPN 作营养支持

42.急性胰腺炎首选的影像学检查方法是

- A.增强 CT 扫描
- B.腹部 X 片
- C.腹部 B 超
- D.MRI
- E.腹部透视

43.检测血、尿淀粉酶诊断胰腺炎,下列不正确的是

- A.血清淀粉酶常在起病后 6~8 小时开始升高
- B.尿淀粉酶常在起病后 12~24 小时开始升高
- C.血清淀粉酶 $>500 \text{ U/dl}$ (苏氏单位)有诊断意义
- D.血清淀粉酶升高程度与病情严重程度一致
- E.消化性溃疡穿孔、胆囊炎等急腹症血清淀粉酶也可增高

44.与急性胰腺炎预后无关的表现是

- A.休克症状
- B.血钙 $<2 \text{ mmol/L}$
- C.血糖 $>11.2 \text{ mmol/L}$
- D.血淀粉酶显著升高
- E.腹膜刺激征

45.治疗重症胰腺炎合并肠麻痹的患者时,不宜应用的药物是

- A.抗生素
- B.抗酸药
- C.抑酸药
- D.抗胆碱药
- E.抑制胰酶活性药

46.男,60岁。发现皮肤黄染、尿色变深伴皮肤瘙痒2周。查体:皮肤巩膜黄染,右上腹可触及无痛性圆形肿块,随呼吸上下活动。该肿块可能是

- A.胆总管囊肿
- B.肝脏囊肿
- C.肿大胆囊
- D.胰头癌
- E.胆管癌

47.女,50岁。皮肤、巩膜黄染2个月,进行性加重,伴厌食、乏力。大便灰白,体重减轻3kg。查体:巩膜、皮肤黄染,肝肋下3cm,边缘钝,无结节,可触及肿大胆囊,Murphy 征(-)。血清总胆固醇、结合胆红素、ALP、TGT 均显著升高,CA199 升高。首选的影像学检查是

- A.核素扫描
- B.腹部 CT
- C.MRCP
- D.腹部 MRI
- E.腹部 B 超

48.患者,男性,68岁。皮肤及巩膜黄染2周,无腹痛及发热。查体:皮肤、巩膜明显黄染,右上腹可触及肿大的胆囊,张力高,无压痛。最可能的诊断是

- A.胆管结石
- B.肝癌
- C.慢性胰腺炎
- D.胆囊结石
- E.胰头癌

49.女,40岁。确诊为急性胰腺炎,内科正规治疗2周后体温仍在 $38\sim 39\text{ }^{\circ}\text{C}$,左上腹部压痛明显。尿淀粉酶 256 U/dl (WinSlow 法),血白细胞 $16\times 10^9/\text{L}$,可能性最大的是

- A.病情迁延未愈
- B.并发胰腺脓肿

- C. 并发胰腺假性囊肿
D. 败血症
E. 合并急性胆囊炎
50. 男, 40 岁。饮酒后突发腹痛 24 小时, 腹痛剧烈, 呈持续性, 腹痛从上腹部很快波及全腹, 伴恶心, 呕吐。查体: 腹部膨隆, 全腹肌紧张, 有压痛、反跳痛, 脐周 Cullen 征 (+)。血清淀粉酶 8500 U/L (Somogyi 法)。决定手术治疗, 术中常规处理措施最重要的是
- A. 胰腺部分切除
B. 胆囊切除术
C. 空肠造瘘或胃造瘘
D. 探查并解除胆道梗阻
E. 坏死组织清除加引流术
51. 目前认为, 溃疡性结肠炎发病的因素主要是
- A. 细菌感染
B. 精神因素
C. 变态反应
D. 理化因素刺激
E. 免疫和遗传因素
52. 溃疡性结肠炎最多见的临床类型是
- A. 初发型
B. 慢性复发型
C. 慢性持续型
D. 急性暴发型
E. 临床终末型
53. 典型溃疡性结肠炎患者的粪便特点是
- A. 脂肪泻
B. 白陶土样便
C. 含泡沫黄稀便
D. 大量水样便
E. 黏液脓血便
54. 溃疡性结肠炎的临床表现, 错误的是
- A. 腹痛—便意—便后缓解
B. 左下腹有压痛
C. 常有腹胀
D. 易形成肠瘘
E. 可有发热
55. 下列 X 线钡剂灌肠检查所见不符合溃疡性结肠炎的是
- A. 病情轻微者可正常
B. 肠壁呈毛刺状或锯齿状
C. 结肠袋消失
D. 可呈跳跃征
E. 可见圆形或卵圆形充盈缺损
56. 决定急性肠梗阻手术探查的最主要依据是
- A. 是否为绞窄性梗阻
B. 近端肠管扩张程度
C. 梗阻部位
D. 是否为完全性梗阻
E. 梗阻持续时间
57. 肠梗阻非手术治疗期间, 梗阻解除的标志是
- A. 肠胃减压后腹痛减轻
B. 腹壁软, 轻度压痛
C. 肠鸣音消失
D. 肛门排便、排气
E. 生命体征平稳
58. 肠梗阻患者保守治疗期间, 病情进展需手术的最主要指征是
- A. 肠鸣音减弱或消失
B. 腹痛加重
C. 呕吐频繁和量大
D. 腹膜刺激征加重
E. 腹胀程度加重
59. 下列疾病中, 与大肠癌关系不密切的是
- A. 家族性腺瘤样息肉病
B. 绒毛状腺瘤
C. 息肉状腺瘤
D. 混合性腺瘤
E. 增生性息肉
60. 右侧结肠癌最多见的大体形态是
- A. 浸润型
B. 溃疡型
C. 隆起型
D. 浸润溃疡型
E. 弥漫型
61. 2 岁患儿。4 天前发热、流涕、咳嗽, 结膜充血, 畏光, 今晨发现耳后及颈部有淡红色

斑丘疹, T 39℃, 两颊黏膜充血。最可能的诊断是

- A. 风疹
- B. 幼儿急疹
- C. 猩红热
- D. 肠道病毒感染
- E. 麻疹

62. 6个月女婴。发热3天, T 39.2℃。查体: 一般情况良好, 咽充血, 耳后淋巴结肿大, 心肺无异常, 肝脾未触及。患儿退热后, 躯干部出现红色斑丘疹。可能的诊断是

- A. 风疹
- B. 麻疹
- C. 水痘
- D. 猩红热
- E. 幼儿急疹

63. 患儿, 男, 2岁。发热、流涕、咳嗽3天, 今晨前额及耳后出现浅红色斑丘疹, 球结膜充血, 口腔黏膜粗糙, 声音嘶哑, 精神萎靡。两肺呼吸音粗。最可能的诊断是

- A. 川崎病
- B. 风疹
- C. 猩红热
- D. 幼儿急疹
- E. 麻疹

64. 患儿, 男, 5岁。高热1天, 腹泻6~7次, 为黏液脓血便, 腹痛伴里急后重, 反复惊厥, 逐渐出现昏睡、神志不清, 病前吃过未洗的黄瓜, 诊断为细菌性痢疾。其临床类型属于

- A. 重型
- B. 轻型
- C. 普通型
- D. 中毒型
- E. 慢性型

65. 患儿, 男, 4岁。体温39℃, 发热半天后即出疹, 1天布满全身, 密集而均匀的红色细小丘疹。面部潮红, 不见皮疹, 口唇周围发白, 有咽痛, 扁桃体充血、水肿。该患儿最可能的诊断是

- A. 幼儿急疹
- B. 猩红热

- C. 麻疹
- D. 风疹
- E. 水痘

66. 患者, 男性, 30岁。反复黏液脓血便3年, 加重2个月, 抗生素治疗无效。肠镜显示较多糜烂及浅表小溃疡。最可能的诊断是

- A. 溃疡性结肠炎
- B. 克罗恩病
- C. 细菌性痢疾
- D. 阿米巴痢疾
- E. 肠结核

67. 女, 32岁。左下腹痛2个月。黄稀便, 每日3次。结肠镜示: 直肠、乙状结肠糜烂及浅溃疡, 大范围充血、水肿。最可能的诊断是

- A. 克罗恩病
- B. 肠结核
- C. 结肠癌
- D. 慢性肠炎
- E. 溃疡性结肠炎

68. 男, 30岁。间断黏液脓血便10年, 抗生素治疗效果不佳。肠镜示乙状结肠及直肠黏膜广泛充血糜烂, 病理检查可见隐窝脓肿。首选的治疗药物是

- A. 蒙脱石散
- B. 地衣芽孢杆菌制剂
- C. 小檗碱
- D. 5-氨基水杨酸
- E. 左氧氟沙星

69. 患者, 男性, 26岁。间断腹泻6个月, 大便3~4次/日, 带黏液及脓血, 无发热及体重下降, 结肠镜示: 乙状结肠弥漫性充血、水肿, 黏膜颗粒样改变, 质脆易出血。病理可见隐窝脓肿。曾连续口服环丙沙星3周, 无效。该患者最适宜的治疗是

- A. 静脉用头孢菌素
- B. 静脉用甲泼尼龙
- C. 禁食及静脉高营养
- D. 口服蒙脱石散
- E. 口服柳氮磺吡啶

70. 患者, 女性, 18岁。间断排黏液脓血便伴发热2个月, 大便10余次/日, 体温波动在

38.0~39.5℃,广谱抗生素治疗1周后症状无好转。结肠镜检查示:全结肠弥漫性充血、糜烂,伴溃疡形成。首选的治疗是

- A.应用免疫抑制剂
- B.应用糖皮质激素
- C.更换抗生素
- D.应用硫唑嘌呤
- E.应用柳氮磺吡啶

71.女,28岁。腹痛10小时。起初上腹痛伴恶心、呕吐,之后局限在右下腹,持续性腹痛伴阵发性加剧。1小时前腹痛从右下腹扩散到全腹,发热。查体:T 39.1℃,急性病容,全腹肌紧张,压痛和反跳痛(+),右下腹最明显。血常规:WBC $19.1 \times 10^9/L$,N 0.91。考虑病情变化的主要解剖学基础是

- A.阑尾动脉为终末血管,出现梗死缺血坏死
- B.阑尾黏膜内有丰富淋巴系统,出现肿胀梗阻
- C.阑尾在盲肠的开口狭小,出现阻塞
- D.阑尾蠕动慢而弱,进入的残渣和大便秘顿引起坏死
- E.阑尾长,阑尾系膜短,出现扭转坏死

72.女,30岁。转移性右下腹痛5天,加重伴畏寒、发热2天。查体:全腹肌紧张,有明显压痛和反跳痛,麦氏点压痛明显,肠鸣音消失。腹腔穿刺抽出脓性液体,细菌培养结果最有可能是

- A.粪链球菌
- B.铜绿假单胞菌
- C.变形杆菌
- D.金黄色葡萄球菌
- E.大肠埃希菌

73.患者,男性,48岁。转移性右下腹痛3小时,伴恶心、呕吐、发热。最能提示该患者患有阑尾炎的体征是

- A.腹部呼吸减弱
- B.右下腹固定压痛
- C.肠鸣音消失
- D.腹胀
- E.肝浊音界缩小

74.患者,女性,60岁。上腹胀痛伴恶心、呕吐2天,右下腹痛阵发加剧、腹胀半天。查体:T 38.3℃,P 120次/分,BP 150/90 mmHg,全腹压痛(+),右下腹明显,有肌紧张,肝浊音界存在,未闻及肠鸣音。实验室检查:血WBC $13.0 \times 10^9/L$,N 0.88。右下腹穿刺抽出黄色混浊液体2 mL,镜检脓细胞(++)。最可能的诊断是

- A.重症急性胰腺炎
- B.绞窄性肠梗阻
- C.阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎
- D.消化性溃疡穿孔并弥漫性腹膜炎
- E.伤寒肠穿孔并弥漫性腹膜炎

75.患者,男性,27岁。腹痛伴呕吐10小时,起初疼痛在脐周,继而右下腹疼痛逐渐加重,既往无腹痛与便血史。查体:全腹紧张,有明显压痛和反跳痛,麦氏点压痛明显,肠鸣音减弱,腹穿抽出脓性液体。最可能的诊断是

- A.克罗恩病穿孔
- B.阑尾炎穿孔
- C.肠套叠坏死
- D.肠伤寒穿孔
- E.胃穿孔

76.患者,男性,27岁。腹痛伴恶心5天。5小时前脐周疼痛伴呕吐,继而右下腹疼痛逐渐加剧。查体:右下腹部可触及一直径约5 cm肿块,界不清,明显触痛。最可能的诊断是

- A.结肠癌
- B.克罗恩病
- C.阑尾周围脓肿
- D.溃疡性结肠炎
- E.直肠癌

77.男,29岁。急性化脓性阑尾炎7天,非手术治疗,突发高热,寒战,右季肋区疼痛。查体:T 38.5℃,皮肤巩膜轻度黄染,右季肋区叩痛。实验室检查:ALT、AST、总胆红素均轻度升高。腹部超声提示肝脏可见数个液性暗区。最可能的诊断是

- A.细菌性肝脓肿
- B.肝包虫病
- C.阿米巴肝脓肿

D.胆管囊肿继发感染

E.肝转移癌

78.女,25岁。妊娠5个月,因转移性右下腹痛2小时就诊。经检查诊断为急性阑尾炎。其治疗措施错误的是

A.行阑尾切除术

B.围手术期加用黄体酮

C.手术切口应偏低

D.尽量不用腹腔引流

E.可应用广谱抗生素

79.男,36岁。急性坏疽性阑尾炎手术后5天,出现尿频、尿急、大便次数增多、里急后重、发热。其最可能的并发症是

A.急性肾盂肾炎

B.盆腔脓肿

C.肛周脓肿

D.阑尾残株炎

E.急性膀胱炎

80.患者,男性,35岁。因急性阑尾炎穿孔,行阑尾切除手术后5天,仍有腹胀、腹痛,T 38.5℃,大便4~6次/天,有下坠感。首选的检查是

A.查看切口

B.腹部B超

C.粪便常规检查

D.直肠指检

E.血常规检查

81.男,55岁。因低位直肠癌行Dixon术,术后吻合口位于齿状线上1cm。患者术后最可能出现的情况是

A.性功能障碍

B.排尿功能障碍

C.排便功能完全正常

D.排便前有便意,但不能控制排便

E.排便前无明显便意,排便控制不理想

82.男,29岁。排便时肛门剧痛1周。有鲜血滴入便池,排便后肛门疼痛加重。造成排便后肛门疼痛加重的机制是

A.肛门括约肌痉挛

B.截石位的12点处神经敏感

C.粪便干燥,排便用力过度

D.继发肛窦炎

E.肛管皮肤全层裂开并形成慢性溃疡

83.女性,30岁。便秘2年,近半月来排便时肛门疼痛,粪便表面及便纸上附有鲜血,其诊断最可能是

A.内痔

B.外痔

C.直肠癌

D.肛瘘

E.肛裂

84.女,30岁。肛门周围胀痛,伴畏寒、发热3天。检查:肛门周围皮肤发红,压痛明显。最可能的诊断是

A.肛门旁皮下脓肿

B.肛窦炎

C.混合痔

D.内痔

E.肛瘘

85.男,54岁。肛门胀痛6天。为持续性痛,逐渐加重,排便和行走时出现剧痛,有里急后重感和排便困难,伴发热,全身不适。查体:T 39.6℃,肛门左侧红肿,有明显压痛。肛诊:直肠左侧饱满,压痛(+),有波动感。实验室检查:WBC $21 \times 10^9/L$,N 0.92。决定立即行切开引流术,最主要的依据是

A.行走时出现剧痛

B.局部饱满有波动感

C.白细胞增高

D.高热,全身症状

E.有排便困难

86.男,57岁。进食后呕吐大量鲜血6小时,既往乙肝病史30余年。为迅速明确出血病因,首选的检查是

A.腹部CT

B.选择性腹腔动脉造影

C.上消化道X线钡餐造影

D.胃镜

E.腹部B超

87.男,36岁。间断上腹痛10余年,饥饿及夜间加重。1天前饮酒后腹痛加剧,1小时前排柏油样便300mL,伴头晕。为明确诊断,

首选的检查是

- A.腹部 B 超
- B.上消化道钡剂造影
- C.胃镜
- D.结肠镜
- E.粪常规+隐血

88.男,35岁。呕血并黑便3小时。既往有十二指肠溃疡病史5年。目前不宜选择的检查是

- A.腹部 B 超
- B.上消化道 X 线钡剂造影
- C.胃镜
- D.肝功能检查
- E.凝血功能

89.男,22岁。饥饿性上腹痛伴反酸1月余。2小时前呕吐咖啡色液体1次,量约200 mL。近期体重无明显变化,否认慢性肝病史。查体:贫血貌,腹软,上腹部压痛,无反跳痛,肝脾肋下未触及。最合适的药物是

- A.止血环酸
- B.法莫替丁
- C.奥美拉唑
- D.凝血酶
- E.垂体后叶素

90.男,65岁。上腹部无规则隐痛2个月,因饮酒后呕咖啡样物250 mL,柏油样便300 mL来诊,无肝病史。查体:血压90/60 mmHg,脉搏100次/分,血红蛋白90 g/L,上腹部轻度压痛,肝脾肋下未触及。其止血措施最好选择

- A.维生素 K₁ 静滴
- B.奥美拉唑静注
- C.6-氨基己酸静滴
- D.三腔二囊管压迫
- E.垂体后叶素静滴

91.男婴,2个月。孕43周分娩,出生体重4 000 g,生后48小时排胎便,喂养困难并常呕吐、便秘。查体:反应迟钝,皮肤中度黄染,心音低钝,腹胀,脐疝。最可能的诊断是

- A.婴儿肝炎综合征
- B.先天性巨结肠
- C.先天性甲状腺功能减低症

D.21-三体综合征

E.胃食管反流病

92.患者,男,4岁。头大颈短,皮肤苍黄粗糙,毛发稀少,经常便秘,3岁才会走路,说话语言不清。查体:身体矮小、眼距宽,鼻梁低,心率70次/分,心音低钝,双肺(-),腹较膨胀,肝脾不大。对明确诊断最有帮助的检查是

- A.血钙、磷、碱性磷酸酶
- B.血总蛋白、白蛋白、胆红素
- C.染色体核型分析
- D.查血 T₄、TSH
- E.血氨基酸分析

93.患儿,女,2岁。智能落后。查体:皮肤粗糙,眼距宽,鼻梁宽平,唇厚,舌宽厚,常伸出口外,毛发枯干、无光泽。最可能的诊断是

- A.软骨发育不良
- B.唐氏综合征(21-三体综合征)
- C.先天性甲状腺功能减退症
- D.佝偻病
- E.苯丙酮尿症

94.患儿,4岁。表情呆滞,智商低下,怕冷,食欲差,头发干、黄、稀,颜面臃肿,呈睡容,鼻根扁平,眼距宽,舌体宽厚常伸出口外,腹胀,便秘,四肢短。为协助诊断应首选

- A.尿三氯化铁试验
- B.染色体核型分析
- C.血 T₃、T₄、TSH 测定
- D.血钙、磷检测
- E.TRH 兴奋试验

95.患儿,女,4岁。面容特殊,眼距宽,鼻梁平,舌厚肥大,面部臃肿,皮肤粗糙,头发干稀,智力低下,身高80 cm,腕部 X 线检查显示一枚骨化中心。最可能的诊断是

- A.唐氏综合征
- B.先天性甲状腺功能减退症
- C.黏多糖病
- D.苯丙酮尿症
- E.软骨发育不良

96.男性,6个月大。哭闹时,右侧腹股沟隆起肿块,平静时肿块可自行消失。最佳处理

方法是

- A. 绷带压住腹股沟深环, 观察
- B. 尽早施行疝囊高位结扎术
- C. 施行加强前壁的疝修补术
- D. 施行加强后壁的疝修补术
- E. 施行无张力疝修补术

97. 女, 62 岁。右侧股疝嵌顿 10 小时。查体: 腹胀明显, 右下腹局限性压痛(+), 肌紧张, 肠鸣音亢进。右侧腹股沟韧带下方隆起肿块, 有压痛。手术时发现小肠坏死, 行坏死小肠切除后, 下一步正确的手术措施是

- A. 单纯疝囊高位结扎术
- B. McVay 法疝修补术
- C. Bassini 法疝修补术
- D. Halsted 法疝修补术
- E. Ferguson 法疝修补术

98. 女, 44 岁。突发右下腹疼痛伴呕吐、停止排气排便 6 小时。查体: P 110 次/分, BP 120/80 mmHg, 右侧腹股沟韧带下方卵圆窝处可及半球形包块, 压痛明显, 不能还纳。下一步处理正确的是

- A. 立即扩容补液
- B. 手法还纳包块
- C. 立即手术治疗
- D. 密切观察病情变化
- E. 应用吗啡, 缓解疼痛

99. 男, 74 岁。左腹股沟可复性包块 10 年, 不能回纳 8 小时, 以左腹股沟斜疝嵌顿急诊手术, 术中见部分嵌顿小肠肠管色暗, 无蠕动, 行部分肠切除。此时不宜行疝修补术的理由是

- A. 术前准备不充分
- B. 术后易出现腹胀
- C. 患者年龄大, 伤口愈合能力低
- D. 术后易继发手术野感染
- E. 术后易发生上呼吸道感染

100. 男性, 80 岁。右腹股沟斜疝 6 小时来诊, 既往有可复性腹股沟肿物史 30 年。检查: 右侧腹股沟至阴囊 10 cm×6 cm 嵌顿疝, 皮肤无红肿。首选的治疗方法是

- A. 试行手法复位

- B. 手术复位并行疝囊高位结扎
- C. 手术复位并行加强腹股沟管疝修补术
- D. 手术复位并行无张力疝修补术
- E. 手法复位并行加强腹股沟管疝修补术

101. 男性, 29 岁。右侧腹股沟区发现可复性肿块 4 年。6 小时前患者发现肿块突然增大、剧烈疼痛。查体: 右侧腹股沟区有 6 cm×5 cm 椭圆形肿块, 触痛明显, 腹部无压痛、反跳痛、腹肌紧张。首选的有效治疗是

- A. 禁食、补液
- B. 手法复位
- C. 应用镇痛或镇静剂
- D. 急诊手术
- E. 应用抗生素

102. 男性, 45 岁。右侧腹股沟斜疝嵌顿 8 小时入院。急诊手术中发现嵌顿入疝囊的回肠有约 6 cm 坏死, 行坏死回肠切除、肠吻合术。对伤口进行彻底清洗后, 无明显炎症表现。疝的处理应首选

- A. 单纯疝囊高位结扎术
- B. Ferguson 法疝修补术
- C. Bassini 法疝修补术
- D. Halsted 法疝修补术
- E. 无张力疝修补术

103. 男性, 60 岁。右阴囊可复性肿物 14 年, 不能还纳 1 天, 伴呕吐, 停止排气、排便。查体: 心率 108 次/分, 血压 150/105 mmHg, 右阴囊肿大, 压痛明显。腹膨隆, 肠鸣音亢进, 白细胞 $14 \times 10^9/L$, 中性 85%。对该患者的最佳处理是

- A. 立即剖腹探查
- B. 急诊室留观
- C. 止痛, 抗炎
- D. 胃肠减压, 择期行修补术
- E. 急做腹股沟疝探查, 并作肠切除准备

104. 若一年轻的嵌顿疝患者术中探查发现肿物为嵌顿的小肠且肠管已发黑坏死, 正确的处理措施为

- A. 剖腹探查, 行肠切除, 肠吻合术
- B. 坏死肠段外置术
- C. 坏死肠段切除, 肠吻合术, 疝囊高位结

扎术

D.肠切除、肠吻合术、Bassini 修补术

E.切开疝环,回纳肠管后行 Bassini 修补术

105.女,52岁,肥胖。右腹股沟韧带下方卵圆窝处可见3 cm×3 cm半球状突起,局部有胀痛感。平卧时突起可变小、变软,但有时不完全消失。查体:卵圆窝处咳嗽冲击感不明显。最常用的手术方式是

A.McVay 法

B.Halsted 法

C.Bassini 法

D.Ferguson 法

E.Shouldice 法

106.男,18岁。练双杠时撞击上腹部,突发腹痛4小时。疼痛加重,伴背部疼痛、恶心、呕吐,呕吐物中有胃液和胆汁。既往有胆囊炎病史。腹部X线平片检查:横结肠肝曲胀气,腹膜后有气体征象。粪隐血(-)。最可能的诊断是

A.右肾破裂

B.肝破裂

C.胆囊破裂

D.十二指肠破裂

E.结肠破裂

107.男性,25岁。腹部被倒墙压伤,中腹部剧痛伴呕吐3小时。血压120/86 mmHg,体温38℃,腹胀、肌紧张、压痛、反跳痛阳性,肠鸣音消失。最可能的诊断是

A.腹壁挫伤

B.腹膜后血肿

C.肝破裂

D.小肠破裂

E.右肾挫伤

108.男,26岁。腹部撞伤6小时。腹痛先位于脐周,后蔓延至全腹。查体:BP 100/85 mmHg,神志清楚,全腹压痛、反跳痛(+),肌紧张,移动性浊音(+)。血常规:WBC $11 \times 10^9/L$,Hb 140 g/L。腹部平片示膈下游离气体。首先考虑的诊断是

A.脾破裂

B.肠破裂

C.肝破裂

D.胰腺损伤

E.肾损伤

109.男,35岁。左下腹外伤后24小时。入院时有弥漫性腹膜炎,行剖腹探查术。术中见腹腔内有黄色脓液及粪便,降结肠下段有一0.5 cm穿孔,有粪便溢出。最合适的术式是

A.单纯结肠穿孔修补术

B.穿孔处修补,横结肠造口

C.左半结肠切除术

D.单纯腹腔引流术

E.降结肠穿孔处切除,端端吻合术

110.男,23岁。高处坠落,肛门部刺伤1小时。血液自肛门排出,直肠指检发现直肠前壁长约2 cm纵向裂伤。能保证直肠伤口愈合的关键措施是

A.乙状结肠造瘘

B.损伤肠段切除一期吻合

C.经肛门伤口清创缝合

D.直肠伤口置管引流

E.留置肛管

111.男,32岁。反复发作无痛性肉眼血尿4年,多于上呼吸道感染后出现,间歇期尿RBC 3~5/HP,无水肿及高血压,无肾脏病家族史。其血尿最可能的原因是

A.肾小球肾炎

B.尿路结石

C.前列腺炎

D.泌尿系结核

E.尿路感染

112.男,38岁。间断活动后尿色加深1周。既往反复痛风发作2年。查体:BP 120/80 mmHg。尿常规:RBC 40~50/HP,WBC 3~5/HP,尿蛋白(-)。首选的进一步检查是

A.尿红细胞形态

B.肾脏增强CT

C.尿脱落细胞检查

D.清洁中段尿培养

E.肾穿刺活检

113.男,16岁。参加学校运动会5 000米

长跑后出现泡沫尿,乏力。实验室检查:尿蛋白(+)。休息1天后复查尿常规正常。该蛋白尿最可能是

- A.肾小管性蛋白尿
- B.组织性蛋白尿
- C.溢出性蛋白尿
- D.功能性蛋白尿
- E.分泌性蛋白尿

114.女,68岁。高血压病史20年,发现尿蛋白3年,尿比重1.010,红细胞0~1/HP,尿蛋白0.45g/d,尿蛋白分析 β_2 -MG, α_1 -MG升高。该患者蛋白尿属于

- A.组织性
- B.溢出性
- C.肾小管性
- D.功能性
- E.肾小球性

115.男,63岁。2型糖尿病14年,血压升高5年,尿蛋白定量2.6g/d,血肌酐132 μ mol/L。其蛋白尿性质应为

- A.肾小球性
- B.功能性
- C.肾小管性
- D.溢出性
- E.分泌性

116.在原发性肾病综合征中,关于微小病变型肾病的特点,叙述不正确的是

- A.光镜下肾小球基本正常,可见近曲小管上皮细胞脂肪变性
- B.免疫荧光检查阴性
- C.电镜下系膜区可见电子致密物
- D.镜下血尿发生率低,一般不出现肉眼血尿
- E.对激素治疗敏感

117.不属于原发性肾病综合征常见的病理类型是

- A.微小病变型肾病
- B.系膜增生性肾炎
- C.毛细血管内增生性肾炎
- D.膜性肾病
- E.局灶性节段性肾小球硬化

118.在我国中老年人中引起原发性肾病综合征最常见的是

- A.微小病变性肾炎
- B.系膜增生性肾炎
- C.系膜毛细血管性肾炎
- D.膜性肾病
- E.局灶性节段性肾小球硬化

119.女,15岁。双下肢及颜面水肿2周。查尿蛋白5.2g/d,尿RBC0~2/HP,血白蛋白28g/L,SCr90 μ mol/L,抗核抗体阴性。应首选的治疗措施是

- A.泼尼松足量足疗程
- B.泼尼松联合环磷酰胺
- C.静脉点滴白蛋白
- D.口服ACEI类药物
- E.低分子肝素抗凝

120.患者,女性,68岁。双下肢及颜面水肿1周,尿蛋白8.8g/24h,肾活检病理诊断为膜性肾病,对其主要治疗应是

- A.泼尼松足量足疗程治疗
- B.泼尼松联合环磷酰胺治疗
- C.硫唑嘌呤治疗
- D.静脉输注白蛋白
- E.口服血管紧张素转换酶抑制剂

121.患者,男性,20岁。原发性肾病综合征患者,首次治疗,每日用泼尼松龙60mg,3周后尿蛋白仍为(+),此时应

- A.改为地塞米松
- B.将泼尼松龙加量80mg/d
- C.改用环磷酰胺
- D.用原量继续观察
- E.减少泼尼松龙量到40mg/d,加用免疫抑制剂

122.患者,男性,15岁。高度水肿,尿蛋白(+++),管型少许,血清蛋白15g/L,血胆固醇10mmol/L,应用泼尼松4周,尿量增加,水肿消退,尿蛋白(+++)。此时应用哪项措施

- A.泼尼松原剂量继续治疗
- B.泼尼松开始减量
- C.加用清蛋白,泼尼松开始减量
- D.加用ACTH,泼尼松减量

E.加用吲哚美辛,泼尼松减量

123.男,50岁。肾病综合征患者,肾活检病理示膜性肾病。治疗过程中突然出现右侧腰痛,伴肉眼血尿,B超示右肾体积较前增大。首先考虑的并发症是

- A.急性肾盂肾炎
- B.肾结石
- C.肾静脉血栓
- D.泌尿系结核
- E.泌尿系肿瘤

124.男性,50岁。因肾病综合征入院做肾活检。病理显示膜性肾病。治疗过程中突然出现双侧肾区疼痛,尿量减少,低热,蛋白尿显著增多伴肉眼血尿,下肢水肿加重,肾功能较前稍有减退。B超示双肾大小较前有所增大。此时最可能的原因是

- A.伴发肾石症
- B.原有膜性肾病加重
- C.伴发泌尿系肿瘤
- D.肾静脉血栓形成
- E.泌尿系结核

125.女,36岁。已诊断为肾病综合征,近2日右下肢痛、凉,右足背动脉搏动触摸不清,趾指皮肤发绀。应首先考虑的合并症是

- A.下尿路感染
- B.右下肢静脉血栓
- C.心源性休克
- D.急性肾衰
- E.右下肢动脉栓塞

126.患者,男性,22岁。水肿,进行性少尿1周。查体:BP 155/100 mmHg,双下肢水肿。尿RBC 20~40/HP,蛋白(++)。SCr 679 μmol/L,抗GBM抗体阳性。肾活检病理示新月体性肾小球肾炎。其最重要的发病机制是

- A.循环免疫复合物沉积引起的体液免疫反应
- B.原位免疫复合物形成引起的体液免疫反应
- C.高血压、蛋白质、高血脂等非免疫因素
- D.细胞免疫
- E.遗传因素

(127~130题共用题干)

5岁患儿。气促、发绀4年余,患者出生青紫,有蹲踞现象,1周前左侧肢体瘫痪,胸骨左缘2、3、4肋间收缩期杂音。

127.最可能的诊断是

- A.室间隔缺损
- B.法洛四联症
- C.动脉导管未闭
- D.房间隔缺损
- E.肺动脉狭窄

128.喜欢蹲踞的原因是

- A.右向左分流减少
- B.右向左分流减少,静脉回心血量减少,缓解了缺氧症状
- C.肺动脉压减轻
- D.肺动脉压增高
- E.静脉回心血量减少

129.左侧肢体瘫痪的原因是

- A.合并脑膜炎
- B.肺动脉压力下降引起
- C.肺动脉高压引起
- D.合并脑血栓
- E.肺炎心衰

130.为预防缺氧首选

- A.普萘洛尔
- B.硝普钠
- C.卡维地洛
- D.洋地黄
- E.卡托普利

(131~132题共用题干)

男,64岁。胸骨后烧灼样疼痛2周,伴暖气,偶有吞咽不畅。口服奥美拉唑治疗2周后疼痛缓解。

131.应首先考虑的诊断是

- A.消化性溃疡
- B.食管癌
- C.心绞痛
- D.贲门失弛缓症
- E.胃食管反流病

132.目前首选的检查是

- A.心电图

- B.冠脉动脉造影
- C.胃镜
- D.24小时食管pH监测
- E.超声心动图

(133~136题共用题干)

患儿女,10个月。腹泻3天,加重2天。暗绿色水样便每日10余次,量多,腥臭,伴高热、呕吐、尿少1天。查体:精神萎靡,呈嗜睡状,前囟、眼窝凹陷,皮肤弹性差,心音较低钝,双肺(-),腹较胀,肠鸣音正常,肝脾不大。粪检有大量脓细胞,血钠135 mmol/L,血钾3.5 mmol/L。

133.该患儿腹泻脱水的程度与性质应是

- A.中度高渗性
- B.中度等渗性
- C.中度低渗性
- D.重度等渗性
- E.重度低渗性

134.施行液体疗法,第一天补液的总量应是每千克体重

- A.30~60 mL
- B.70~110 mL
- C.120~150 mL
- D.160~180 mL
- E.190~220 mL

135.所采用液体的成分应是

- A.1/5张含钠液
- B.1/3张含钠液
- C.1/2张含钠液
- D.2/3张含钠液
- E.等张含钠液

(136~138题共用题干)

女,38岁。肝硬化腹水患者。1周来低热,腹部隐痛,血白细胞 $11 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.80。

136.查体应注意的体征是

- A.蜘蛛痣及肝掌
- B.腹壁静脉曲张
- C.脾大
- D.腹部压痛及反跳痛
- E.腹部移动性浊音

137.首先考虑诊断是肝硬化合并

- A.肝肾综合征
- B.原发性肝癌
- C.门静脉血栓形成
- D.自发性腹膜炎
- E.急性胆囊炎

138.治疗措施中最重要的是

- A.限制水、钠摄入
- B.大剂量广谱抗生素
- C.应用利尿药
- D.放腹水
- E.输白蛋白

B1型题

(139~140题共用备选答案)

- A.上皮细胞管型
- B.白细胞管型
- C.颗粒管型
- D.红细胞管型
- E.脂肪管型

139.对急性肾盂肾炎诊断有意义的尿常规检查是

140.对急性肾小球肾炎诊断有意义的尿常规检查是

(141~142题共用备选答案)

- A.Dukes A1期
- B.Dukes A2期
- C.Dukes B期
- D.Dukes C期
- E.Dukes D期

141.结肠癌病灶穿透肠壁,无淋巴结转移的是

142.结肠癌病灶侵犯肌层,但未穿透浆膜层的是

(144~143题共用备选答案)

- A.腹壁反射消失
- B.腱反射亢进
- C.Grey-Turner征阳性
- D.扑翼样震颤阳性
- E.Babinski征阳性

143.对急性重症胰腺炎诊断帮助最大的是

144.对肝性脑病诊断帮助最大的是

(145~146 题共用备选答案)

- A.急性糜烂出血性胃炎
- B.慢性浅表性胃窦胃炎
- C.嗜酸性粒细胞性胃炎
- D.慢性浅表性胃体胃炎
- E.慢性萎缩性胃炎

145.与胃癌发生相关的疾病是

146.应用非甾体抗炎药可导致的疾病是
(147~148 题共用备选答案)

- A.Cushing 溃疡
- B.胃溃疡
- C.Curling 溃疡
- D.食管腐蚀性溃疡

E.十二指肠溃疡

147.最易发生癌变的溃疡是

148.烧伤患者发生的溃疡是
(149~150 题共用备选答案)

- A.倾倒综合征
- B.输出袢梗阻
- C.低血糖综合征
- D.碱性反流性胃炎
- E.慢性不完全性输入袢梗阻

149.胃大部切除术后患者,进食后 20 分钟,出现心悸、乏力、出汗、头晕

150.胃大部切除术后 3 个月,出现上腹部及胸骨后烧灼样疼痛,进食加重,呕吐胆汁样液

第四单元

1.男,45 岁。阵发性右腹绞痛 1 天,伴恶心呕吐,无发热,腹痛发作时向右下腹放射,伴尿频、尿痛等症状,查体:腹软,右下腹有压痛,无反跳痛,膀胱区不胀,血 WBC 正常,尿常规 WBC 0~1 个/HP、RBC 7~10/HP。最可能的诊断是

- A.阑尾炎
- B.肾肿瘤
- C.肾结石
- D.肾结核
- E.输尿管结石

2.患者,男性,32 岁。反复腰部胀痛 1 年余。B 超见右肾盂结石,大小 1.5 cm×1.0 cm,左肾积水,左输尿管上段结石,大小 1.0 cm×0.8 cm。尿常规:RBC 5~10 个/HP, WBC 16~20 个/HP。肾功能正常。要了解该患者肾功能首选的检查方法是

- A.IVU
- B.复查 B 超
- C.KUB
- D.MRI
- E.CT 平扫

3.女,20 岁。近一年来时有右下腹疼痛伴膀胱刺激症状。体检:腹软、右下腹深压痛,

右腰部轻叩痛。尿常规红细胞(++),白细胞(+),肾图检查:右侧呈梗阻型曲线,应考虑为

- A.慢性膀胱炎
- B.急性阑尾炎
- C.慢性附件炎
- D.急性肾盂肾炎
- E.右输尿管下段结石

4.患者,男性,35 岁。右肾疼痛,红细胞镜下满视野,白细胞 2~3 个/HP,尿路平片可见右下段输尿管走行区高密度阴影 0.6 cm,IVU 可见右输尿管下段结石,其上输尿管轻度扩张,右肾轻度积水。输尿管结石绞痛发作时应给予的治疗是

- A.大量饮水,促使结石排出
- B.体外冲击波碎石
- C.立即手术取石
- D.输尿管导管套石
- E.用药物解除绞痛症状

5.男,35 岁。反复腰部绞痛伴血尿,KUB 见右肾结石,长径 1.8 cm。IVU 见右肾轻度积水,输尿管显影正常,首选的治疗方法是

- A.经皮肾镜碎石取石
- B.输尿管镜碎石取石
- C.体外冲击波碎石

D. 药物排石

E. 抗炎治疗

6. 男, 45 岁。便血、面色苍白 3 个月。血常规: Hb 60 g/L, MCHC 27%, WBC $8.0 \times 10^9/L$, PLT $138 \times 10^9/L$, 网织红细胞 0.025。最可能出现的特有临床表现是

A. 酱油色尿

B. 皮肤瘀斑

C. 匙状甲

D. 肝、脾肿大

E. 巩膜黄染

7. 男性, 73 岁。渐进性乏力伴面色苍白 3 个月。查体为贫血貌, 有反甲, 巩膜无黄染, 浅表淋巴结无肿大, 心率 102 次/分, 肝脾肋下未触及。血常规 Hb 76 g/L, RBC $2.82 \times 10^{12}/L$, MCV 78 fl, WBC $5.0 \times 10^9/L$, 血小板 $220 \times 10^9/L$, 首先考虑

A. 海洋性贫血

B. 再生障碍性贫血

C. 缺铁性贫血

D. 巨幼细胞性贫血

E. 溶血性贫血

8. 女, 25 岁。头晕、乏力 1 月。既往体健, 近 1 年来月经量明显增多。实验室检查: Hb 95 g/L, RBC $3.5 \times 10^{12}/L$, 红细胞大小不等, 中心淡染区扩大, WBC $4.5 \times 10^9/L$, PLT $310 \times 10^9/L$, 粪隐血(-)。最根本的治疗措施是

A. 给予糖皮质激素

B. 给予雄性激素

C. 给予铁剂

D. 治疗妇科疾病

E. 给予维生素 B₁₂ 及叶酸

9. 女性, 30 岁。月经量多已 2 年, 近 3 个月来感乏力、头晕、心悸。查血红蛋白 65 g/L, 白细胞 $6.0 \times 10^9/L$, 血小板 $140 \times 10^9/L$ 。骨髓象: 粒红比为 1:1, 红细胞增生活跃, 中晚幼红细胞 45%, 体积小, 胞质偏蓝。治疗首选

A. 肌注维生素 B₁₂

B. 脾切除

C. 输血

D. 口服铁剂

E. 口服叶酸

10. 男性, 30 岁。发热伴牙龈出血 3 周。查体: 贫血貌, 脾肋下 3 cm, 胸骨压痛(+); 血红蛋白 70 g/L, 白细胞 $14.0 \times 10^9/L$, 血小板 $35 \times 10^9/L$, 骨髓增生明显活跃, 原始细胞占 62%。为进一步诊断, 应首选的检查是

A. 细胞化学染色

B. 染色体核型分析

C. 血清铁测定

D. 血细菌培养

E. 抗血小板抗体检测

11. 女, 18 岁。发热、鼻出血 3 天。查体: 全身浅表淋巴结肿大, 最大者 2.5 cm×2 cm 大小, 胸骨压痛(+), 肝脾肋下均可触及边缘。骨髓细胞学检查: 骨髓原始细胞占 0.65, 过氧化物酶(-), 非特异性酯酶染色(-)。最可能的诊断是

A. 急性单核细胞白血病

B. 急性粒-单核细胞白血病

C. 急性早幼粒细胞白血病

D. 急性淋巴细胞白血病

E. 急性红白血病

12. 男性, 40 岁。发热伴鼻出血一周。检查牙龈肿胀, 肝脾轻度肿大; 血红蛋白 40 g/L, WBC $6.0 \times 10^9/L$, 血小板 $15 \times 10^9/L$, 骨髓象原始细胞占 60%, 过氧化物酶染色阳性, 非特异性酯酶阳性, 阳性反应可被氟化钠抑制, 应诊断为

A. 急性粒细胞性白血病

B. 急性早幼粒细胞白血病

C. 急性淋巴细胞性白血病

D. 急性红白血病

E. 急性单核细胞性白血病

13. 男, 19 岁。发热、鼻出血 4 天。查体: 全身浅表淋巴结肿大, 最大者 2.5 cm×2 cm 大小, 胸骨压痛(+), 肝脾肋下均可触及边缘。骨髓细胞学检查: 骨髓原始细胞占 0.65, 髓过氧化物酶(-), 非特异性酯酶染色(-)。最可能的诊断是

A. 急性早幼粒细胞白血病

B. 急性粒-单核细胞白血病

- C.急性单核细胞白血病
- D.急性淋巴细胞白血病
- E.急性红白血病

14.女,35岁。3周来乏力、发热伴牙龈肿胀出血。化验:Hb 65 g/L, WBC $3.0 \times 10^9/L$, 分类见原幼细胞 30%, PLT $35 \times 10^9/L$ 。骨髓检查原始细胞 80%, POX 染色部分呈弱阳性, 非特异性酯酶染色阳性, NaF 可抑制。该例急性白血病最可能的 FAB 分型是

- A. M_5 型
- B. M_4 型
- C. M_3 型
- D. M_2 型
- E. M_1 型

15.男性,15岁。发热、皮肤紫癜2个月,皮肤散在紫癜,淋巴结、肝脾肿大,白细胞 $4.5 \times 10^9/L$, 分类可见原始细胞,非特异性酯酶染色弱阳性,不能被 NaF 抑制,过氧化物酶染色强阳性。最可能的诊断是

- A.急性单核细胞白血病
- B.急性粒细胞白血病
- C.急性淋巴细胞白血病
- D.类白血病反应
- E.淋巴瘤

16.女,28岁。21岁时因心慌、怕热、多汗、消瘦就诊,确诊 Graves 病,甲巯咪唑规则治疗2年。25岁时甲亢复发,再次甲巯咪唑治疗,2个月后甲状腺功能正常。继续治疗1年半停药。最近2个月甲亢的症状、体征再现,查血 T_3 、 T_4 及 TSH 确认为甲亢第2次复发。患者结婚5年,尚未生育,希望治疗甲亢后怀孕。现治疗拟选用

- A.大剂量碘剂
- B.再次甲巯咪唑治疗,疗程延长至3~4年
- C.用甲巯咪唑,甲功正常后加用 ^{131}I 治疗
- D.用甲巯咪唑,甲功正常后行甲状腺大部切除手术
- E.直接行甲状腺大部切除术

17.女,15岁。烦躁、怕热、多汗,体重减轻2个月。查体:BP 120/60 mmHg, 体型偏

瘦,皮肤潮湿,手有震颤,轻微突眼,甲状腺弥漫 I 度肿大,质地软,无触痛,可闻及轻度血管杂音,心率 108 次/分,经甲状腺功能检查确诊 Graves 病,首选的治疗是

- A.普萘洛尔
- B.碘剂
- C.丙硫氧嘧啶
- D.核素 ^{131}I
- E.甲状腺大部切除

18.男,15岁。心悸,多汗,手颤3个月。无明显突眼,甲状腺 I 度弥漫性肿大。血 FT_3 、 FT_4 增高, TSH 降低。肝、肾功能正常,血 WBC $6.5 \times 10^9/L$ 。诊断为甲亢。既往无甲亢病史。治疗选择

- A.核素 ^{131}I 治疗
- B.甲状腺部分切除术
- C.抗甲状腺药物治疗后核素 ^{131}I 治疗
- D.抗甲状腺药物治疗后手术治疗
- E.抗甲状腺药物治疗

19.女,31岁。既往无甲亢病史。妊娠2个月时出现怕热、心悸、多汗。查体:甲状腺 I 度肿大, FT_3 、 FT_4 升高, TSH 降低, TRAb 阳性。该患者最合适的治疗是

- A. ^{131}I 治疗
- B.外科手术
- C.应用碘化钠溶液
- D.应用硫氧嘧啶
- E.应用甲巯咪唑

20.男,22岁。心悸、怕热、多汗3个月,考虑 Graves 病。白细胞 $4.2 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 $2.4 \times 10^9/L$ 。给予甲巯咪唑和美托洛尔治疗2周后,复查白细胞 $1.0 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 $0.4 \times 10^9/L$ 。中性粒细胞缺乏最可能的原因是

- A.粒细胞分布异常
- B.抗甲状腺药物副作用
- C.甲亢病情加重
- D. β 受体阻滞剂副作用
- E.叶酸或维生素 B_{12} 缺乏

21.女性,39岁。Graves 病甲状腺次全切除术后12年。近3个月心悸、怕热、多汗、手颤抖,体重下降6 kg。血 TSH、 FT_3 、 FT_4 检查证

实甲亢复发,服甲巯咪唑 2 周后因严重药疹而停药。下一步治疗应

- A. 甲巯咪唑加抗过敏药物
- B. 改用丙硫氧嘧啶
- C. 用核素¹³¹I 治疗
- D. 再次手术治疗
- E. 改用 β 受体阻滞剂

22. 女, 35 岁。心悸、怕热、多汗 3 个多月, 体重下降 4 kg。查体: 无突眼, 双手细颤, 甲状腺大, 可闻血管杂音, 心率 106 次/分, 结合实验室检查确诊为 Graves 病甲亢。白细胞 $3.0 \times 10^9/L$, 肝功能 ALT 46 U/L, AST 36 U/L。患者能否用核素¹³¹I 治疗的关键检查是

- A. 肝功能
- B. 血白细胞计数
- C. 抗甲状腺抗体水平
- D. 甲状腺¹³¹I 摄取率
- E. 甲状腺核素扫描

23. 女性, 34 岁。因原发性甲亢行甲状腺双侧次全切除术。有关术中操作, 正确的是

- A. 结扎切断甲状腺上动脉要远离甲状腺上极
- B. 结扎切断甲状腺下动脉要靠近甲状腺背面
- C. 切除腺体的 70%~80%
- D. 止血后不必放引流
- E. 须保留腺体的背面部分

24. 女性, 40 岁。行甲状腺次全切除手术后出现声音嘶哑, 喉镜检查显示左侧声带麻痹。分析手术中可能损伤的结构是

- A. 舌下神经
- B. 喉上神经
- C. 舌咽神经
- D. 左侧喉返神经
- E. 右侧喉返神经

25. 女性, 40 岁。因右侧甲状腺单发肿物, 颈部淋巴结无肿大, 施行甲状腺肿物摘除术, 病理报告为甲状腺乳头状腺癌, 术后 5 天拆线。拆线后还应对患者做如下哪种处理

- A. 口服碘剂
- B. 口服甲状腺片

C. 再次手术清除患侧淋巴结

D. 再次手术将患侧腺体连同峡部全切除, 对侧腺体大部切除

E. 颈部放射治疗

26. 25 岁, 男性。胰岛素依赖型糖尿病患者, 2 天前中断胰岛素后出现昏迷, 血糖 420 mg/dL (23 mmol/L)。经抢救并静脉滴注碳酸氢钠后血糖下降, 神志好转, 酸中毒减轻, 但不久又进入昏迷, 其最可能的原因是

- A. 并发脑水肿
- B. 并发低血糖
- C. 并发脑血管意外
- D. 并发乳酸酸中毒
- E. 并发肾功能衰竭

27. 男, 69 岁。近 3 周来多饮, 多尿, 食欲减退, 精神差, 软弱无力。今晨被发现神志不清而就诊。血压 $80/60 \text{ mmHg}$, 血糖 38.5 mmol/L , 尿糖(++++), 尿酮体(±)。最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 脑血栓形成
- C. 高渗性非酮症性糖尿病昏迷
- D. 糖尿病酮症酸中毒昏迷
- E. 乳酸性酸中毒昏迷

28. 女, 42 岁。多饮、多食 10 年, 空腹血糖经常大于 10.8 mmol/L 。近两个月来眼睑及下肢轻度水肿, 血压 $160/100 \text{ mmHg}$, 尿蛋白(+ +)。最可能的诊断为

- A. 糖尿病肾病
- B. 高血压病
- C. 糖尿病合并肾盂肾炎
- D. 肾小球肾炎
- E. 糖尿病酮症酸中毒

29. 男, 56 岁。糖尿病患者, 用胰岛素治疗, 晚 10 时突起心慌、多汗、软弱, 继而神志不清。查体: 脉搏 120 次/分, 尿糖(-), 尿酮(-), 血尿素氮 10.0 mmol/L 。最可能为

- A. 低血糖昏迷
- B. 高渗性昏迷
- C. 酮症酸中毒昏迷
- D. 脑血管意外
- E. 尿毒症昏迷

30.男,59岁。2型糖尿病12年。口服降血糖药物治疗,空腹血糖5.6 mmol/L,餐后2小时血糖14.6 mmol/L,糖化血红蛋白7.6%。3年前眼底检查可见微血管瘤和出血,近2月来视力明显减退,眼底检查可见新生血管和玻璃体积血,目前糖尿病视网膜病变已进展为

- A.Ⅱ期
- B.Ⅲ期
- C.Ⅳ期
- D.Ⅴ期
- E.Ⅵ期

31.男,45岁。患糖尿病10余年,尿蛋白阴性,近1个月感下腹部胀,排尿不畅伴尿失禁。B超显示“膀胱扩大,尿潴留”。其原因应考虑

- A.糖尿病肾病
- B.糖尿病合并泌尿系感染
- C.糖尿病合并慢性前列腺炎
- D.糖尿病自主神经病变
- E.糖尿病合并泌尿系结石

32.女性,23岁。诊断为1型糖尿病5年。近几日来,感食欲减退、烦渴、多饮、多尿明显,时有呕吐,皮肤弹性差。实验室检查:空腹血糖24.7 mmol/L,尿糖阳性,酮体强阳性,血碳酸氢根14 mmol/L,以下最合理治疗组合方案是

- A.饮食控制
- B.饮食控制+口服降糖药
- C.饮食控制+中效胰岛素
- D.长效胰岛素+口服降糖药
- E.小剂量普通胰岛素加入生理盐水中,平均0.1 U/(kg·h),持续静点

33.男,50岁。肥胖,2型糖尿病5年,口服二甲双胍250 mg,3次/日。5个月前因外伤发生左足溃疡至今未愈,空腹血糖7.2 mmol/L,三餐后血糖分别为9.2 mmol/L、8.7 mmol/L、8.6 mmol/L。控制糖尿病的最佳治疗方案应选择

- A.增加二甲双胍剂量
- B.加用胰岛素制剂
- C.加用磺脲类口服降糖药
- D.加用 α -葡糖糖苷酶抑制剂
- E.加用噻唑烷二酮类药

- D.加用 α -葡糖糖苷酶抑制剂
- E.加用噻唑烷二酮类药

34.男,55岁。初诊2型糖尿病3个月,每日进主食量约450 g,身高172 cm,体重90 kg,BMI 30.5。实验室检查:空腹血糖7.50 mmol/L,餐后2小时血糖12.6 mmol/L,糖化血红蛋白7.4%,目前首选的治疗药物是

- A.格列本脲
- B.比格列酮
- C.二甲双胍
- D.阿卡波糖
- E.那格列奈

35.女,57岁。2型糖尿病史14年。二甲双胍0.25 g及格列齐特80 mg,每日3次,糖尿病控制良好,近2个月感乏力,体重下降6 kg,肠镜检查发现乙状结肠癌拟行手术治疗。围手术期糖尿病处理

- A.停口服降糖药、减少饮食物量
- B.改用长效胰岛素
- C.胰岛素及其增敏剂联合治疗
- D.改用 α -葡萄糖糖苷酶抑制剂
- E.改用短效胰岛素

36.男,35岁。高处坠落导致胸背部疼痛,下肢感觉障碍,5小时逐渐恢复。最可能的诊断是

- A.脊髓休克
- B.脊髓震荡
- C.脊髓损伤
- D.脊髓截断
- E.脊髓水肿

37.急性严重的锥体束损害的断联休克表现为

- A.痉挛性瘫,腱反射消失
- B.痉挛性瘫,腱反射亢进
- C.弛缓性瘫,腱反射亢进
- D.弛缓性瘫,腱反射消失
- E.弛缓性瘫,腱反射正常

38.Horner征表现不正确的是

- A.瞳孔缩小
- B.眼睑膜充血及面部无汗
- C.眼裂狭小

- D.眼球内陷
E.瞳孔对光反射消失
- 39.位于脊髓后索内侧传导下部躯干及下肢深感觉的是
- A.脊髓丘脑束
B.皮质脊髓束
C.楔束
D.薄束
E.内侧丘系
- 40.真性和假性球麻痹症状的鉴别点是
- A.吞咽困难
B.发音障碍
C.伸舌不能
D.双侧肢体活动障碍
E.咽反射的存在或减弱消失
- 41.男,40岁。渐起走路不稳2年,有共济失调障碍,步幅加宽,左右摇摆。最可能受损的部位是
- A.小脑半球
B.小脑蚓部
C.丘脑
D.延髓
E.大脑半球
- 42.患者,男性,61岁。右面部发作性剧痛2年,疼痛自上唇始,延至外眦下方,每次持续数秒钟,讲话、进食和洗脸可诱发,无神经系统体征。最可能的诊断是
- A.偏头痛
B.鼻窦炎
C.三叉神经痛
D.蝶腭神经痛
E.非典型面痛
- 43.女性,59岁。高血压史6年,日前感觉右耳后疼痛,翌日晨洗脸、漱口时发现右口角流口水,右眼闭合不全,口角偏左,右额纹消失。最可能的诊断是
- A.右耳大神经痛
B.左侧面神经麻痹
C.右侧面神经麻痹
D.多颅神经炎
E.脑卒中
- 44.患者,女性,50岁。头部棍击伤,无昏迷史及意识障碍,无颅骨骨折,1个月后出现颅内压增高症状,最可能的诊断为
- A.慢性硬膜外血肿
B.多发颅内血肿
C.慢性硬膜下血肿
D.急性颅内血肿
E.脑震荡后遗症
- 45.患者,女性,30岁。头部受伤后昏迷半小时,清醒后左侧肢体力弱,腰穿发现血性脑脊液,以后逐渐好转,最可能为
- A.脑内血肿
B.脑挫伤
C.急性硬膜外血肿
D.脑震荡
E.急性硬膜下血肿
- 46.患者,男性,40岁。车祸后出现短暂昏迷,2小时后剧烈头痛,频繁呕吐。急诊查体:神志清楚,双侧瞳孔大小多变,对光反射迟钝,肢体活动正常。行头颅CT检查途中,发生呼吸骤停,最可能的原因是
- A.脑挫裂伤
B.急性颅后窝血肿并发枕骨大孔疝
C.急性颅内血肿并发小脑幕切迹疝
D.脑干损伤
E.脑震荡
- 47.有一名右顶枕部着地摔伤患者,伤后2小时,左侧瞳孔散大,血肿部位是
- A.右顶枕部
B.右额颞部
C.左顶枕部
D.左额颞部
E.后颅凹
- 48.患者,男性,50岁。2小时前木棒击伤左颞部,伤后头痛、呕吐,1小时前意识不清,查体:中度昏迷,左瞳散大,右侧肢体病理征(+),诊断考虑为
- A.颅骨凹陷骨折伴脑疝
B.硬膜下血肿伴脑疝
C.硬膜外血肿伴脑疝
D.脑损伤伴脑疝

- E. 原发脑干损伤
49. 有一患者, 颅底骨折, 合并脑脊液鼻漏, 其错误的治疗方法是
- 肾上腺素纱布填塞鼻腔
 - 抗生素治疗
 - 安静卧床
 - 防止便秘及上呼吸道感染
 - 禁止腰穿
50. 患者, 男性, 27 岁。头部受伤后立即昏迷, 5 分钟后清醒, 3 小时后再度昏迷, X 线发现颅骨线状骨折, 且骨折线越过脑膜中动脉沟, 提示为
- 脑挫伤
 - 急性硬膜外血肿
 - 急性硬膜下血肿
 - 外伤性脑内血肿
 - 脑水肿
51. 遗忘综合征的三大特征是
- 近记忆障碍、虚构、定向障碍
 - 谵妄、近记忆障碍、虚构
 - 谵妄、虚构、定向障碍
 - 幻觉、虚构、定向障碍
 - 近记忆障碍、幻觉、定向障碍
52. 一种虚幻的知觉体验是
- 知觉改变
 - 非真实感
 - 幻觉
 - 感知综合障碍
 - 错觉
53. 每当电话铃响起的同时就听到辱骂自己的声音, 该症状是
- 心因性幻听
 - 元素性幻听
 - 反射性幻听
 - 假性幻听
 - 功能性幻听
54. 思维形式障碍不包括
- 思维散漫
 - 赘述症
 - 持续语言
 - 思维中断
 - 思维化声
55. 患者体验到思维活跃, 脑内概念不断涌现, 一个意念接着一个意念。该症状为
- 联想散漫
 - 思维插入
 - 思维奔逸
 - 强制性思维
 - 强迫性思维
56. 男, 30 岁。1 年前罹患肺结核, 近半年来妻子要与其离婚, 患者认为是因为有人从中挑拨离间, 发现楼下有很多出租车在监视自己, 并且还跟踪自己的父母, 以达到监视他的目的。不愿吃父母做的饭, 担心有毒。此患者最可能的诊断是
- 反应性精神病
 - 精神分裂症
 - 躯体疾病所致精神障碍
 - 偏执型精神病
 - 抑郁症伴有妄想
57. 男, 16 岁。近 3 年来逐渐变得少语少动, 不与人交往, 孤僻离群, 对亲友冷淡, 不讲个人卫生, 有时发呆。此患者最可能的诊断是
- 青春型精神分裂症
 - 品行障碍
 - 单纯型精神分裂症
 - 偏执型精神病
 - 人格障碍
58. 女, 28 岁。半年前失恋, 近 2 个多月来情绪低落, 不敢出门, 不愿吃饭, 几次割腕自杀, 性格变得孤僻多疑, 怀疑周围人都在议论她失恋的事, 认为父母亲不是亲生父母, 听到楼下有人在议论她, 让她做这做那的声音。经常反复洗手刷牙, 认为失恋原因是自己身体不洁的缘故。最可能的诊断是
- 精神分裂症
 - 抑郁症(抑郁发作)
 - 应激相关障碍
 - 强迫症
 - 恐惧症
59. 患者, 男, 16 岁。近两年来无明显原因

出现与人交往减少,经常独自待于一处,有时会不明原因发笑,对家人漠不关心,生活越来越懒散,以前感兴趣的事情现在也不做了。最可能的诊断是

- A. 重度抑郁症迟滞型
- B. 精神分裂症紧张型
- C. 精神分裂症单纯型
- D. 中毒精神发育迟滞
- E. 精神分裂症衰退型

60. 23岁女性患者,腕关节、膝关节痛伴发热1个月,近3天来出现活动后气促,门诊X线检查提示少量胸腔积液,实验室检查提示:血红蛋白、白细胞及血小板计数降低,24小时尿蛋白计数 >0.5 g,多种抗生素治疗无效,应考虑

- A. 结核感染
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 再生障碍性贫血
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 恶性肿瘤

61. 患者,男性,47岁。HBsAg阳性20年,乏力、食欲缺乏、尿黄7天。查体:巩膜黄染,肝肋下2 cm,质软。实验室检查:ALT 460 U/L, TBIL 84 mmol/L, HBV-DNA 1.2×10^6 拷贝/mL, 抗 HAV-IgM(-), 抗 HEV(-), 抗 HCV(-)。最重要的治疗药物是

- A. 核苷(酸)类似物
- B. 护肝药物
- C. 退黄药物
- D. 干扰素
- E. 利巴韦林

62. 患者,女性,40岁。体检发现 HBsAg(-), 抗-HBs(+), ALT 20 U/L。最可能的情况是

- A. 感染过 HBV, 已开始恢复
- B. 感染过 HBV, 已产生免疫力
- C. 体内有病毒复制
- D. 有传染性
- E. 病毒携带者但无传染性

63. 患者,女性,20岁。1周来发热、乏力、食欲缺乏、恶心、厌油。1天来眼发黄,但体温已正常。

ALT 1 600 U/L, TBIL 12 mmol/L, DBIL 65 mmol/L, AFP <25 mg/L, 血 WBC 4.2×10^9 /L。最可能的诊断为

- A. 急性黄疸型肝炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 慢性胆囊炎、胆石症
- D. 钩端螺旋体病
- E. 肝癌

64. 患者,男性,25岁。发热3周,于8月20日来诊,体温大于 39 °C,病初皮肤出现少数皮疹,头痛、腰痛、眼眶痛。患者可能的病症是

- A. 肾综合征出血热
- B. 流行性乙型脑炎热
- C. 麻疹
- D. 风疹
- E. 肾病综合征

65. 患者,男性,39岁。不规则发热半年余,反反复抗菌无效,明显消瘦,侨居国外多年。临床考虑是否同艾滋病有关,下列哪项检查更有价值

- A. 痰培养
- B. 胸部 CT
- C. 血清抗-HIV
- D. HIV 分离
- E. CD4/CD8 比值, CD4 计数

66. 用青霉素治疗下列疾病的过程中,首剂肌肉注射后可出现赫氏反应的是

- A. 流脑
- B. 猩红热
- C. 钩体病
- D. 白喉
- E. 疟疾

67. 患者,男性,28岁。因江水泛滥,饮用江水,突然出现剧烈腹泻,随后呕吐,由水样物转为“米泔水”样物,最可能的诊断是

- A. 金葡菌胃肠炎
- B. 急性细菌性痢疾
- C. 大肠杆菌性肠炎
- D. 病毒性肠炎
- E. 霍乱

68. 患者,女性,20岁。腹泻、呕吐伴轻度

腹痛1天,6月下旬来诊,共腹泻6次,开始为黄稀便,继之水样便。呕吐1次,为胃内容物。无发热。粪便动力试验(+),碱性蛋白胨水培养有细菌生长。最可能的诊断是

- A.细菌性痢疾
- B.沙门菌食物中毒
- C.霍乱
- D.空肠弯曲菌肠炎
- E.变形杆菌肠炎

69.患者,男性,45岁。7月22日来诊。发热4天,伴全身痛、乏力、头痛。近1个月当地暴雨不断。查体:眼结膜充血,颈部、腋下淋巴结肿大,小腿拒按压(+)。最可能的诊断是

- A.流行性感胃
- B.钩端螺旋体病
- C.疟疾
- D.败血症
- E.肾综合征出血热

70.患者,女性,35岁。反复出现癫痫大发作2年余,经CT检查诊断为脑囊虫病。应首先考虑的临床类型是

- A.脑实质型
- B.脑室型
- C.软脑膜型
- D.脊髓型
- E.混合型

71.男,35岁。疑为骨盆骨折,来院急诊,首要的检查应是

- A.X线片
- B.肛门指诊
- C.核素骨扫描
- D.MRI
- E.骨盆分离和骨盆挤压试验

72.患者,女性,31岁。左小腿被撞伤,创口出血,骨外露23小时。X线示左胫腓骨下段粉碎性骨折,最易出现的并发症是

- A.坠积性肺炎
- B.神经血管损伤
- C.骨筋膜室综合征
- D.感染
- E.急性骨萎缩

73.患儿,女,5岁。右肘摔伤急诊就医,小夹板外固定后,前臂高度肿胀,手部青白发凉、麻木无力,经拍X线,诊断为右肱骨髁上骨折,若不及时处理,其最常见的后果是

- A.骨坏死
- B.缺血性骨坏死
- C.骨化性肌炎
- D.关节僵硬
- E.缺血性肌挛缩

74.中年男性,房屋倒塌致左小腿砸伤10小时,曾在外院求治,诊断为左小腿胫、腓骨双骨折,行手法复位,小夹板外固定。回家后感左小腿及左足剧痛,遂来院就诊。检查见左小腿中段高度肿胀,坚硬,足部皮温较对侧低,感觉明显减退,足趾主动活动差,被动牵伸足趾可引起剧痛,左足背动脉触不到。其可能的并发症是

- A.胫前动脉损伤
- B.腓总神经损伤
- C.脂肪栓塞
- D.感染
- E.骨筋膜室综合征

75.男孩,左肘摔伤急诊就医,小夹板外固定后,前臂肿胀,手部青白发凉,麻木无力,经拍X线片,诊断为左肱骨髁上骨折伸直型,若不及时处理,其最可能的后果是

- A.感染
- B.缺血性骨坏死
- C.骨化性肌炎
- D.关节僵硬
- E.缺血性肌挛缩

76.患者,男性,71岁。在地上滑倒,造成股骨近端骨折。下列骨折类型预后最差的是

- A.头下型
- B.经颈型
- C.基底型
- D.粗隆间
- E.粗隆下

77.患者,男性,78岁。跌倒左髌受伤2小时,局部疼痛不适,活动受限,患肢缩短,轴向叩击痛(+).X线显示左股骨颈基底部骨皮

质连续性中断,断端嵌插,Pauwels 角 25° 。一般状态差,既往高血压、肺源性心脏病、糖尿病病史 30 余年,心功能 IV 级。最佳的治疗措施是

- A. 闭合复位内固定
- B. 切开复位内固定
- C. 下肢中立位皮牵引 6~8 周
- D. 转子间截骨矫正力线
- E. 人工关节置换术

78. 患者,男性,63 岁。摔伤致左髌关节疼痛不适、功能障碍,X 线示左股骨颈头下骨皮质连续性中断,Pauwels 角 60° 。该股骨颈骨折为

- A. 不完全骨折
- B. 关节外骨折
- C. 外展骨折
- D. 稳定性骨折
- E. 内收骨折

79. 患者,男性,28 岁。左下肢骨折术后 1 天,气短伴咯血 2 小时,最常见的诊断是

- A. 肺部感染
- B. ARDS
- C. 气胸
- D. 胸膜炎
- E. 肺血栓栓塞症

80. 男,40 岁。因车祸右小腿受伤,经拍 X 线片,诊断为右胫骨中下 $1/3$ 交界处斜形骨折,其易发生

- A. 骨筋膜室综合征
- B. 脂肪栓塞
- C. 延迟愈合或不愈合
- D. 血管损伤
- E. 损伤性骨化

81. 患者,女性,66 岁。左手拇指晨起僵硬伴疼痛不适半年,近 3 周出现该处的肿胀及活动受限,被动活动患指可出现伴疼痛不适的弹响。临床诊断最常见的是

- A. 类风湿关节炎
- B. 关节内游离体
- C. 骨结核性关节炎
- D. 风湿性关节炎

E. 狭窄性腱鞘炎

82. 女,38 岁。晨起左中指发僵、疼痛,缓慢活动后可消失,屈伸中指时有弹响。最可能的诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 狭窄性腱鞘炎
- C. 腱鞘囊肿
- D. 滑囊炎
- E. 创伤性关节炎

83. 男,25 岁。因皮肤病曾有长期服用激素史,近 3 年双髌关节疼痛、活动受限。初步诊断是

- A. 双髌类风湿关节炎
- B. 双髌创伤性滑膜炎
- C. 双髌退变性关节炎
- D. 双侧股骨头缺血性坏死
- E. 骨结核

84. 患者,男,16 岁。洗浴时无意中触及右膝下内侧硬性突起,无疼痛,膝关节运动正常。最可能的诊断是

- A. 软骨瘤
- B. 骨软骨瘤
- C. 骨巨细胞瘤
- D. 骨囊肿
- E. 骨化性肌炎

85. 男,19 岁。右股骨远端外侧无明显诱因发现骨性包块半年,今日包块增大较快并出现局部疼痛,表面无明显红肿、皮温不高。X 线显示骨性突起与骨干相连,远端可见不规则钙化。正确的治疗是

- A. 继续观察
- B. 非甾体抗炎药
- C. 放射治疗
- D. 手术切除
- E. 刮出植骨

86. 患者,女性,51 岁。胃大部切除术后 3 天出现阵发性腹痛、腹胀,无肛门排气,生命体征平稳,主要考虑为

- A. 吻合口炎
- B. 腹腔内血肿形成
- C. 肠系膜血管缺血性疾病

- D.肠扭转
E.手术后肠蠕动功能失调
- 87.患者,男性,73岁。行胃癌根治术后7天,咳嗽后腹正中伤口内有多量淡红色液体流出。最可能出现的情况是
- A.切口下异物
B.切口皮下积液
C.切口裂开
D.切口感染
E.切口内血肿
- 88.男性,45岁。外伤致骨盆骨折、会阴部撕裂伤,术后尿潴留,烦躁不安,最佳处理方法是
- A.肌注安定 10 mg
B.下腹部热敷
C.口服止痛药
D.静注卡巴胆碱
E.留置导尿管
- 89.甲沟炎、甲下积脓宜采用的手术方法是
- A.两侧甲沟纵向切口
B.甲根部横切口
C.拔甲术
D.一侧纵切口
E.切除甲根部
- 90.气性坏疽最关键的治疗措施是
- A.大剂量青霉素
B.高压氧疗法
C.输血、输液
D.紧急手术处理
E.补充足够的营养
- 91.患者,男性,31岁。背部肿块,红、肿、疼痛3天,寒战、发热 39℃,查体:背部有肿物 3 cm×5 cm,波动感明显。当病灶做局部引流和全身应用抗生素后,仍有寒战、高热,最好
- A.联合应用抗生素,并加大剂量
B.尽快明确细菌种类和药敏试验
C.寻找有无其他感染病灶
D.使用抗真菌药物治疗
E.加用肾上腺皮质激素
- 92.女,65岁。颈后部皮肤红肿7天。初

起时为小片皮肤硬肿,约 3 cm×2 cm,有多个脓点,随后皮肤肿胀范围增大,出现浸润性水肿,局部疼痛加重,表面皮肤呈青紫褐色,范围约 6 cm×5 cm,T 38.9℃,来院就诊,拟手术治疗,不正确的处理方法是

- A.清除化脓或失活的组织
B.切口线应超过病变边缘
C.不可一期缝合切口
D.切口内可填塞纱条
E.沿皮纹行一横行切口
- 93.男性,30岁。左下肢局部皮肤红、肿、热、痛、中央部缺血坏死流出脓液稀薄,粉红色,其致病菌是
- A.金黄色葡萄球菌
B.β溶血性链球菌
C.大肠杆菌
D.绿脓杆菌
E.变形杆菌
- 94.患者,男性。右手中指受伤3日,到医院就诊,查中指肿胀,发热,有波动感。最恰当的处理是
- A.热盐水浸泡患指
B.抗菌药物静脉注射
C.肌注哌替啶 25 mg
D.中指侧面纵形切口引流
E.患指理疗
- 95.患者,男性,45岁。左面部肿10天,多次挤压,今突发寒战高热,伴头晕,无抽搐。查体:T 40℃,R 26次/分,BP 100/70 mmHg,左面部肿,口唇无偏斜,胸壁及肢体皮下可见出血斑。血 WBC 20×10⁹/L,核左移。该患者目前的诊断是
- A.左腮腺脓肿
B.菌血症
C.感染性休克
D.颅内感染
E.脓毒症
- 96.男,18岁。右足和右小腿被开水烫伤,有水疱伴剧痛。创面基底部肿胀发红,该患者烧伤面积和深度的诊断为
- A.5%,浅Ⅱ°

- B.5%,深Ⅱ°
- C.10%,浅Ⅱ°
- D.10%,深Ⅱ°
- E.15%,浅Ⅱ°

97.女,32岁。大面积烧伤入院治疗14天后,突发寒战高热,脓痰,痰呈蓝绿色,一般情况恶化。考虑患者感染的是

- A.大肠埃希菌
- B.克雷伯菌
- C.铜绿假单胞菌
- D.链球菌
- E.金黄色葡萄球菌

98.患者,女性,43岁。烧伤总面积35%,其中Ⅲ°烧伤面积10%。该患者属于烧伤的类型是

- A.轻度烧伤
- B.中度烧伤
- C.重度烧伤
- D.特重烧伤
- E.小面积烧伤

99.男,22岁。双足和左小腿被开水烫伤,有水疱伴剧痛。创面基底部肿胀发红,该患者烧伤面积和深度的诊断为

- A.5%浅Ⅱ度
- B.5%深Ⅱ度
- C.13.5%浅Ⅱ度
- D.10%深Ⅱ度
- E.15%浅Ⅱ度

100.男,52岁。头颈部、双上肢浅Ⅱ度烧伤。伤后第3天出现黑便,量约700 mL。查体:P 107次/分,BP 85/60 mmHg。最可能的原因是

- A.胆道出血
- B.消化性溃疡出血
- C.慢性胃炎出血
- D.食管溃疡
- E.应激性溃疡出血

101.关于卵巢形态学特征,说法正确的是

- A.卵巢白膜是平滑肌组织
- B.成年妇女卵巢重约15 g
- C.卵巢表面无腹膜

- D.皮质内含血管、神经、淋巴管
- E.髓质内含许多始基卵泡

102.欲行全子宫加双附件切除,不需要切断的韧带是

- A.主韧带
- B.卵巢固有韧带
- C.卵巢悬韧带
- D.阔韧带
- E.圆韧带

103.输卵管妊娠最常见的着床部位是在输卵管的

- A.壶腹部与峡部连接部
- B.壶腹部
- C.峡部
- D.伞部
- E.间质部

104.全子宫切除术时无需切断的韧带是

- A.宫骶韧带
- B.骨盆漏斗韧带
- C.卵巢固有韧带
- D.子宫圆韧带
- E.子宫主韧带

105.关于子宫峡部解剖学特点,错误的是

- A.非孕期长约1 cm
- B.子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分
- C.上端为组织学内口
- D.下端与子宫颈内腔相连
- E.妊娠末期可达7~10 cm

106.妊娠早期羊水的主要来源是

- A.母血清经胎膜进入羊膜腔的透析液
- B.胎儿皮肤
- C.胎儿尿液
- D.胎儿肺
- E.胎膜

107.正常妊娠38周时的羊水量约为

- A.600 mL
- B.800 mL
- C.1000 mL
- D.1200 mL
- E.1500 mL

108.在孕妇腹壁上听诊,与胎儿心率一致

的是

- A.腹主动脉音
- B.脐带杂音
- C.胎动音
- D.子宫杂音
- E.以上都不对

109.胎儿在子宫内急性缺氧初期表现为胎动

- A.减弱
- B.增强
- C.频繁
- D.次数减少
- E.次数稍增多

110.正常妊娠于32周末时宫底高度应为

- A.脐上3横指
- B.脐与剑突之间
- C.耻骨联合上刚能触及
- D.脐耻之间
- E.剑突下2横指

111.初产妇,25岁。规律宫缩10小时,连续观察2小时,宫口由6cm开大至7cm,胎头+1,胎心140次/分。恰当的处置应为

- A.严密观察产程进展
- B.肌注哌替啶
- C.静脉滴注缩宫素
- D.立即行人工破膜
- E.立即行剖宫产术

112.初产妇,足月妊娠。宫口开全1小时35分尚未分娩,阴道检查:头先露,宫口开全,胎头位于坐骨棘水平下3cm,枕左横位(LOT)。胎膜已破,羊水清,胎心率140次/分,估计胎儿重3100g。本例正确处理应是

- A.行剖宫产术
- B.缩宫素静脉滴注
- C.行产钳助产术
- D.徒手将胎头枕部转向前方,然后阴道分娩
- E.等待阴道自然分娩

113.孕妇进入第二产程,胎头+4,胎心105次/分。此时的处理应该为

- A.立即行剖宫术
- B.等待自然分娩

C.行产钳术助娩

- D.静脉滴注缩宫素加强宫缩
- E.静注地西洋(安定)加速产程进展

114.初产妇,26岁。停经38周,规律宫缩9小时,胎儿娩出后10分钟,胎盘未娩出,以下处理方法不正确的是

- A.下压宫底协助胎盘娩出
- B.检查宫体是否变硬
- C.观察脐带有无自行延长
- D.阴道有无流血
- E.轻压耻骨联合上方

115.27岁,已婚妇女,停经8周,下腹阵发性剧痛1小时伴阴道较多量流血。检查宫口开大2cm。本例最恰当的处置是

- A.给予止血药物
- B.肌内注射黄体酮
- C.肌内注射麦角新碱
- D.静脉滴注缩宫素
- E.吸宫术

116.26岁未产妇,停经48日后出现阴道少量流血伴右下腹隐痛。今晨起床时突然右下腹剧痛来院。检查:血压90/60mmHg,面色苍白,下腹稍膨隆,右下腹压痛明显,肌紧张不明显,叩诊移动性浊音(±)。妇科检查:子宫稍大稍软,右附件区触及有压痛包块。恰当诊断应是

- A.输卵管妊娠流产
- B.输卵管峡部妊娠破裂
- C.急性阑尾炎
- D.急性输卵管炎
- E.右侧卵巢肿瘤蒂扭转

117.已婚妇女,26岁。停经55天,剧烈腹痛3天,阴道不规则流血1天。今晨从阴道排出三角形膜样物质。检查:贫血貌,下腹部压痛、反跳痛明显。正确治疗应选择

- A.静脉滴注缩宫素
- B.肌注麦角新碱
- C.吸宫术终止妊娠
- D.应用止血药
- E.行腹腔镜手术

118.初孕妇,28岁。妊娠37⁺4周,剧烈头

痛并呕吐3次。查体:BP 170/110 mmHg,尿蛋白(++),双下肢轻度水肿。无宫缩,枕右前位胎心率138次/分,估计胎儿体重2800g。该患者应立即采取的处理措施是

- A. 静脉滴注缩宫素
- B. 人工破膜后静滴缩宫素
- C. 静滴硫酸镁及快速静滴甘露醇
- D. 立即行剖宫术
- E. 肌内注射哌替啶

119. 初孕妇,25岁。妊娠37周,剧烈头痛并呕吐,并自觉胎动少一天,血压160/110 mmHg,尿蛋白(++),胎心130次/分,子宫颈管未消失,OCT呈频繁晚期减速(迟发性减速),血细胞比容0.41。最合适的处理是

- A. 静滴硫酸镁及与胍屈嗪控制病情
- B. 硫酸镁加降压加扩容疗法控制病情
- C. 积极治疗,48小时未能控制病情则行剖宫产
- D. 破膜加静脉滴注缩宫素引产
- E. 积极药物治疗的同时立即剖宫产

120. 初孕妇,29岁,妊娠37周。头痛1周,今晨喷射性呕吐1次,1小时前突然抽搐并随即昏迷入院。查体:BP 180/120 mmHg。尿蛋白(+++)。该患者最可能的诊断是

- A. 子痫
- B. 脑出血
- C. 分离(转换)性障碍
- D. 癫痫
- E. 脑血栓形成

121. 初产妇,27岁。妊娠37周。晚10时突然出现无痛性阴道较多量流血入院。查体:BP 110/78 mmHg,子宫软,枕左前位,胎心164次/分。目前恰当的处理是

- A. 剖宫产
- B. 器械助娩
- C. 等待自然分娩
- D. 缩宫素引产
- E. 人工破膜引产

122. 28岁经产妇,妊娠39周,今晨5时突然出现阴道多量流血来院。检查子宫无压痛区,胎头在宫底部,胎心140次/分,血压100/70

mmHg。阴道检查宫口开大2cm,先露部为胎臀,可触及胎胞。本例出血最可能的原因是

- A. 前置胎盘
- B. 胎盘早剥
- C. 子宫破裂
- D. 宫颈裂伤
- E. 脐带帆状附着前置血管破裂

123. 经产妇,28岁,合并风湿性心脏病,现妊娠38周,心功能I级,规律宫缩7小时来院,枕左前位,胎心152次/分,估计胎儿3300g,宫口开大4cm,胎头=0,本例正确的处理措施是

- A. 适当的镇静剂,阴道助产
- B. 避免用力屏气加腹压,胎头吸引或产钳助产
- C. 静滴缩宫素,尽可能缩短第一产程
- D. 试产期间若是出现心衰症状,应立即剖宫产
- E. 不行阴道试产,行剖宫产术结束分娩

124. 初孕妇,既往风湿性心脏病、二尖瓣狭窄病史8年。平时不用药,登三楼无明显不适。孕5个月起活动时常有轻度心慌、气促。现孕38周,因心悸、咳嗽、夜间不能平卧、心功能Ⅲ级而急诊入院。在制订治疗计划时,最恰当的方案是

- A. 纠正心功能,等待自然临产
- B. 积极控制心力衰竭,同时行剖宫产术
- C. 积极控制心力衰竭,同时行引产术
- D. 积极控制心力衰竭后终止妊娠
- E. 适量应用抗生素后继续妊娠

125. 初孕妇,30岁。妊娠40周,规律宫缩4小时入院。因产程不佳,给予缩宫素静脉滴注,加强宫缩,2小时后下腹疼痛难忍。孕妇烦躁不安,呼吸急促,心率110次/分,胎心率100次/分,子宫下段有明显压痛,导尿见血尿。本例最可能的诊断是

- A. 先兆子宫破裂
- B. 子宫破裂
- C. 强直性宫缩
- D. 羊水栓塞
- E. 胎盘早期剥离

126. 患者,女性26岁。妊娠37周,G₁P₀,

因羊膜破裂入院待产。既往身体健康,无传染病及遗传性疾病史。分娩过程顺利,产一男婴 3.5 kg。分娩后突然出现呼吸困难、发绀、抽搐、休克死亡。最可能发生的是

- A. 血栓形成
- B. 空气栓塞
- C. 脂肪栓塞
- D. 心肌梗死
- E. 羊水栓塞

127. 女, 54 岁。白带增多, 均匀稀薄, 有臭味, 阴道黏膜无明显充血, 阴道 PH 为 5, 线索细胞阳性。最可能的诊断是

- A. 急性淋病
- B. 细菌性阴道病
- C. 滴虫阴道炎
- D. 外阴阴道念珠菌病
- E. 老年性阴道炎

128. 女, 48 岁。外阴瘙痒伴灼热感 3 天。妇科检查见外阴红肿、小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色凝乳状物覆盖。该患者首先考虑为

- A. 前庭大腺炎
- B. 淋菌性阴道炎
- C. 外阴阴道假丝酵母菌病
- D. 滴虫阴道炎
- E. 细菌性阴道病

129. 女, 55 岁。糖尿病史 7 年, 外阴瘙痒、灼痛 1 个月余, 白带无异味。妇科检查: 阴道黏膜充血, 白带多, 呈凝乳块状。本例最可能的诊断是

- A. 细菌性阴道病
- B. 老年性阴道炎
- C. 外阴硬化性苔藓
- D. 非特异性外阴炎
- E. 外阴阴道念珠菌病

130. 中年女性, 外阴瘙痒 1 周。查阴道黏膜覆以膜状物, 擦除后露出红肿黏膜面。正确的治疗是

- A. 阴道内放置尼尔雌醇片
- B. 阴道内放置达克宁栓
- C. 阴道内放置甲硝唑片
- D. 局部用克林霉素软膏

E. 外阴部用 0.5% 醋酸液洗涤

131. 女, 45 岁。不规则阴道流血 2 个月。性交后出血, 宫颈锥切标本显微镜下可见低分化鳞状细胞癌, 间质浸润深度 2 mm, 宽度 6 mm。正确的分期为

- A. I A1 期
- B. I A2 期
- C. I B1 期
- D. I B2 期
- E. II B 期

132. 女, 45 岁。性交后出血半年。妇科检查: 宫颈 I 度糜烂状。宫颈细胞学检查结果为低度鳞状上皮内病变 (LSIL)。为明确诊断, 下一步应首选的处理是

- A. 宫颈冷刀锥切
- B. 宫颈电热圈切除术
- C. 阴道镜下活检
- D. 宫颈管搔刮
- E. HPV-DNA 检测

133. 女, 48 岁。接触性出血 1 年, 白带多, 有臭味。妇科检查: 宫颈糜烂状, 阴道外观正常, 子宫正常大小, 双侧附件区无明显增厚。为明确诊断, 首选的辅助检查是

- A. 宫颈涂片检查
- B. 宫颈和宫颈管活检
- C. 阴道镜检
- D. 宫颈锥切术
- E. 宫颈荧光检查

134. 女, 45 岁。同房后阴道流血 3 个月, G₅P₁。妇科检查: 宫颈重度糜烂状, 下唇息肉样赘生物, 直径 2 cm。三合诊示宫颈旁组织无异常。取宫颈赘生物送病理, 提示宫颈鳞癌。首选的治疗方法是

- A. 子宫颈切除+盆腔淋巴结切除术
- B. 筋膜外子宫切除术
- C. 根治性放疗
- D. 广泛性子宫颈切除+盆腔淋巴结切除
- E. 宫颈锥形切除术

135. 女, 60 岁。绝经 5 年, 反复阴道流血 3 次, 量中等, 平时白带少许。B 超示: 子宫相对增大, 宫腔内可见实质不均回声区, 形态不

规则,宫腔线消失。首先考虑的诊断是

- A.输卵管癌
- B.子宫内膜癌
- C.子宫颈癌
- D.子宫内膜炎
- E.老年性阴道炎

136.患者,女,50岁。阴道不规则出血3个月,出血量不多。妇科检查可见子宫增大,稍软。B超示子宫增大,宫腔内实质不均匀回声区,形态不规则,宫腔线消失。下列叙述错误的是

- A.最有可能的诊断是宫颈癌
- B.最有可能的诊断是子宫内膜癌
- C.分段刮宫是最可靠的诊断方法
- D.原发性输卵管癌可能性小
- E.临床上与绝经过渡期功血难以鉴别,应先行分段刮宫,确诊后再对症处理

137.对于小儿生长发育的一般规律,错误的是

- A.由上到下
- B.由远到近
- C.由粗到细
- D.由低级到高级
- E.由简单到复杂

138.小儿死亡率最高的时期是

- A.新生儿期
- B.婴儿期
- C.幼儿期
- D.学龄前期
- E.学龄期

139.关于围生期,国内普遍采用的定义是

- A.胎龄38周至生后1个月
- B.胎龄28周至生后7天
- C.胎龄30周至生后2周
- D.胎龄36周至生后4周
- E.胎龄27周至出生时

140.小儿乳牙开始萌出的时间最迟不超过生后

- A.8个月
- B.10个月
- C.12个月

D.14个月

E.16个月

141.5岁小儿按公式计算身高、体重及头围约是

- A.118 cm,22 kg,54 cm
- B.114 cm,21 kg,53 cm
- C.111 cm,20 kg,52 cm
- D.108 cm,19 kg,51 cm
- E.105 cm,18 kg,50 cm

(142~144题共用题干)

男,30岁。咽痛、咳嗽、发热,2周后发现尿色红,眼睑水肿,尿量1000 mL/24h。体检:全身皮肤未见皮疹,血压150/100 mmHg。化验:尿蛋白(++),红细胞50~60/HP,血蛋白32 g/L,血肌酐123 $\mu\text{mol/L}$ 。

142.上述临床表现最可能的诊断是

- A.急性链球菌感染后肾炎
- B.急性肾盂肾炎
- C.过敏性紫癜
- D.系统性红斑狼疮
- E.急性肾小管坏死

143.该患者的治疗,错误的是

- A.控制血压
- B.消肿
- C.低盐饮食
- D.抗生素
- E.补充白蛋白

144.按上述治疗2个月后,病情无好转,血肌酐300 $\mu\text{mol/L}$,对诊断最有价值的进一步检查是

- A.清洁中段尿培养
- B.肾穿刺活检
- C.肾脏ECT
- D.肾脏B型超声
- E.静脉肾盂造影

(145~146题共用题干)

4个月婴儿,体重6 kg,母亲因故不能哺乳,改用牛乳喂养。

145.按能量需要,该婴儿每日需牛奶量(含8%的糖)是

- A.200~320 mL

- B.400~520 mL
- C.600~720 mL
- D.800~920 mL
- E.1000~1120 mL

146.按添加辅助食品的原则,该婴儿可开始添加

- A.米糊
- B.蛋黄
- C.肉末
- D.碎菜
- E.肝泥

(147~148 题共用备选答案)

- A.万古霉素
- B.青霉素

- C.甲硝唑
- D.氨苄西林
- E.阿米卡星

147.新生儿厌氧菌败血症治疗首选

148.新生儿金黄色葡萄球菌败血症治疗

首选

(149~150 题共用备选答案)

- A.乙型肝炎疫苗
- B.流感疫苗
- C.麻疹疫苗
- D.脊髓灰质炎疫苗
- E.百白破疫苗

149.新生儿期接种的疫苗应是

150.生后2个月时应接种的疫苗是

金英杰医学教育

模拟试卷参考答案

第一单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	C	C	B	A	A	A	A	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	E	D	E	E	D	D	D	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	C	B	E	C	C	B	C	E	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	E	A	D	B	D	A	A	C	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	B	E	A	C	D	A	C	D	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	E	C	C	D	A	A	E	E	A
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	E	D	E	A	E	C	D	C	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	A	C	E	C	A	A	A	E	E
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	B	E	D	A	D	E	C	C	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
B	D	A	B	B	C	A	C	E	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	C	D	A	B	E	E	E	C	A
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	D	E	A	D	C	A	D	E	C

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
C	D	E	E	B	D	D	E	B	E
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
C	C	B	C	D	D	E	A	A	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
D	B	E	E	E	E	C	A	B	D

第二单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	E	C	E	D	B	D	B	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	E	A	C	C	A	A	E	A	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	C	B	D	C	D	D	C	C	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	E	A	E	D	D	A	B	E	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	A	E	E	B	C	B	C	C	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	E	B	E	C	C	E	D	A	D
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
E	E	A	A	B	B	E	A	B	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	E	A	C	B	C	B	A	E	A
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	C	C	C	E	C	E	C	C	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	B	E	A	B	B	E	B	E	A

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	D	C	B	E	D	E	C	E	C
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	E	C	B	C	A	E	B	B	B
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
E	D	E	B	E	C	C	B	D	E
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
C	C	B	E	E	B	A	D	C	D
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	C	B	B	D	E	D	A	D	B

第三单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	E	C	E	B	E	D	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	D	E	A	C	E	C	B	B	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	D	A	D	B	B	A	D	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	E	B	D	C	A	D	A	B	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	A	D	D	D	C	B	E	B	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	B	E	D	D	A	D	E	E	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
E	E	E	D	B	A	E	D	E	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	E	B	C	B	C	A	C	B	D

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	A	E	A	B	D	C	B	C	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	D	C	C	B	A	A	C	D	A
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	A	E	C	A	D	D	B	B	A
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	A	D	C	A	C	C	D	A	B
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	A	C	D	E	B	B	B	D	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	C	B	C	C	D	D	B	B	D
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	B	C	D	E	A	B	C	A	D

第四单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	A	E	E	C	C	C	D	D	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	E	D	A	B	D	C	E	D	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	D	E	D	D	A	C	A	A	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	E	B	C	E	B	D	E	D	E
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	C	C	C	B	B	D	C	A	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
A	C	E	C	C	B	C	A	C	D

临床执业医师资格考试历年真题精编“5+2+1”(下册)

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	B	A	A	E	C	E	C	B	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
E	D	E	E	E	A	C	E	E	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	B	D	B	D	E	C	E	C	D
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	E	B	D	E	C	C	C	C	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	B	B	B	C	A	C	B	C	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	D	C	A	E	B	E	C	E	A
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	A	D	D	A	E	B	C	E	B
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
A	C	B	D	B	B	B	A	B	C
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
E	A	E	B	C	A	C	A	A	D