

# 模拟试卷

## 第一单元

- 胆碱酯酶复能药的药理作用中不包括
  - 提高全血胆碱酯酶活性
  - 恢复被抑制的胆碱酯酶活性
  - 恢复已经老化的胆碱酯酶活性
  - 与磷酸化胆碱酯酶中的磷形成结合物
  - 减轻烟碱样症状
- 有机磷急性中毒表现为
  - 腺体分泌减少、胃肠平滑肌兴奋
  - 支气管平滑肌松弛、唾液腺分泌增加
  - 膀胱逼尿肌松弛、呼吸肌麻痹
  - 神经节先兴奋后抑制、心血管作用复杂
  - 脑内乙酰胆碱水平下降、瞳孔扩大
- 强心苷治疗心力衰竭的最基本作用是
  - 加强心肌收缩性
  - 降低室壁张力,降低心肌耗氧量
  - 加快心房与心室肌传导
  - 降低心率
  - 缩小扩大的心室容积
- 下列哪种药物能防止和逆转慢性心功能不全的心室肥厚并能降低病死率
  - 地高辛
  - 米力农
  - 氢氯噻嗪
  - 硝普钠
  - 卡托普利
- 高血压时的肾脏病理变化表现为
  - 颗粒型固缩肾
  - 肾脏单发性贫血性梗死
  - 肾动脉动脉瘤形成
  - 肾的多发性大瘢痕形成
  - 肾脏淤血
- 单纯二尖瓣狭窄患者可有
  - 左房扩大,右房缩小
  - 右室缩小,左房扩大
  - 右房扩大,左房缩小
  - 左室缩小或正常,左房扩大
  - 以上都不是
- 心肌梗死最常发生的部位多为
  - 左心室侧壁
  - 左心室后壁
  - 右心室前壁
  - 左心室前壁
  - 室间隔后 1/3
- 长期淤血导致肝硬化的基本病理变化
  - 肝细胞坏死
  - 肝细胞缺氧改变
  - 大量肝细胞嗜酸性变性
  - 大量肝细胞脂肪变性
  - 大量肝小叶改建形成假小叶
- 病毒性肝炎中见明显碎片状坏死和桥接坏死的是
  - 慢性持续性肝炎
  - 亚急性重型肝炎
  - 急性黄疸型肝炎
  - 慢性活动性肝炎
  - 细菌性肝炎
- 关于血管紧张素 II 生理作用的描述,错误的是
  - 收缩容量血管
  - 收缩全身阻力血管
  - 促进肾上腺皮质释放醛固酮
  - 促进下丘脑释放血管升压素
  - 促进交感神经末梢释放去甲肾上腺素
- 胃大部分切除患者出现贫血的原因是
  - 黏液减少
  - HCl 减少
  - HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>减少
  - 内因子减少

- E.胃蛋白酶活性降低
- 12.刺激小肠黏膜释放胆囊收缩素作用最强的物质是
- A.盐酸  
B.糖类  
C.胆酸钠  
D.脂肪  
E.蛋白质分解产物
- 13.下列关于酶结构与功能的叙述,正确的是
- A.酶只在体内发挥作用  
B.酶的催化作用与温度无关  
C.酶能改变反应的平衡点  
D.酶能大大降低反应的活化能  
E.酶的催化作用不受调控
- 14.位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成和糖原分解各条代谢途径交汇点上的化合物是
- A.1-磷酸葡萄糖  
B.6-磷酸葡萄糖  
C.1,6-二磷酸果糖  
D.3-磷酸甘油酸  
E.6-磷酸果糖
- 15.属于必需脂肪酸的是
- A.亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸  
B.油酸、亚麻酸、花生四烯酸  
C.亚油酸、软脂酸、花生四烯酸  
D.亚麻酸、硬脂酸、亚油酸  
E.亚麻酸、亚油酸、软脂酸
- 16.大鼠出生后饲以去脂饮食,结果将引起下列哪种脂质缺乏
- A.磷脂酰胆碱  
B.甘油三酯  
C.鞘磷脂  
D.胆固醇  
E.前列腺素
- 17.可转变为黑色素的物质是
- A.天冬酰胺  
B.谷氨酸  
C.酪氨酸  
D.谷氨酰胺  
E.精氨酸
- 18.不参加尿素循环的氨基酸是
- A.赖氨酸  
B.精氨酸  
C.鸟氨酸  
D.天冬氨酸  
E.精氨酸代琥珀酸
- 19.肌肉中的游离氨通过下列哪种途径运到肝脏
- A.腺嘌呤核苷酸-次黄嘌呤核苷酸循环  
B.丙氨酸-葡萄糖循环  
C.鸟嘌呤核苷酸-黄嘌呤核苷酸循环  
D.谷氨酸-谷氨酰胺循环  
E.柠檬酸-丙酮酸循环
- 20.实施三级预防时,重点在第一级预防,同时兼顾二、三级预防的疾病是
- A.急性阑尾炎  
B.流行性感  
C.食物中毒  
D.冠心病  
E.阑尾炎
- 21.某医生选择适当资料计算相应指标,进行  $t$  检验。进行  $t$  检验的资料应满足的条件是
- A.负偏态资料  
B.正偏态资料  
C.偏态资料  
D.正态或近似正态资料  
E.以上都不是
- 22.均数与标准差之间的关系是
- A.标准差越小,均数代表性越大  
B.标准差越小,均数代表性越小  
C.均数越大,标准差越小  
D.均数越大,标准差越大  
E.标准差越大,均数代表性越大
- 23.胰岛素对治疗糖尿病有效,但不能治愈糖尿病,此时会出现下列哪种情况
- A.糖尿病患病率减少  
B.糖尿病发病率减少

- C. 糖尿病患病率增加  
 D. 糖尿病发病率增加  
 E. 糖尿病发病率和患病率均降低
24. 评价疾病危险度(严重程度)的指标是  
 A. 患病率  
 B. 感染率  
 C. 病死率  
 D. 发病率  
 E. 续发率
25. 下列哪项不是表示疾病流行强度的指标  
 A. 暴发  
 B. 大流行  
 C. 短期波动  
 D. 散发  
 E. 流行
26. 下列关于流行病学中的疾病之间分布是指  
 A. 性别分布、民族分布、地区分布  
 B. 人群分布、时间分布、地区分布  
 C. 历史分布、地区分布、职业分布  
 D. 年龄分布、季节分布、地区分布  
 E. 以上都不是
27. 河豚毒素最主要的毒作用是  
 A. 引起颅神经损害  
 B. 引起中毒性休克  
 C. 引起随意肌进行麻痹  
 D. 引起肾功能急性衰竭  
 E. 以上都不是
28. 我国发病率最高的食物中毒是  
 A. 化学性食物中毒  
 B. 有毒动物中毒  
 C. 有毒植物中毒  
 D. 细菌性食物中毒  
 E. 真菌毒素食物中毒
29. 亚硝酸盐食物中毒的机制是  
 A. 与胺作用形成亚硝酸胺  
 B. 使亚铁血红蛋白氧化为高铁血红蛋白  
 C. 转化为硝酸盐  
 D. 抵制乙酰胆碱酯酶  
 E. 溶血
30. 引起副溶血弧菌食物中毒的主要食物是  
 A. 罐头食品  
 B. 剩米饭、凉糕  
 C. 奶及奶制品  
 D. 家庭自制豆制品  
 E. 海产品及盐腌制类食品
31. 在炎热的夏季,下列何种化学物经日光照射,可发生光化学烟雾  
 A. 二氧化碳和氯化氢  
 B. 二硫化碳和硫化氢  
 C. 氮氧化物和烃类  
 D. 氰氧化物和一氧化碳  
 E. 二氧化碳和二氧化硫
32. 某一家4口,晨起先后出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻,大便呈黄绿色水样便,有恶臭,4人伴有体温升高,其中3人为38℃左右,1人为40.1℃。据了解,发病的前晚,晚餐进食米饭、肉炖蛋、炒青菜、肉丝榨菜蛋汤,可能引起食物中毒的细菌是  
 A. 沙门菌  
 B. 变形杆菌  
 C. 肉毒梭状芽孢杆菌  
 D. 副溶血性弧菌  
 E. 葡萄球菌
33. 男,35岁。温度计厂工人。主诉:易激动,易怒(示情感障碍),2年前有唇、手指等细小震颤,现发展到全身震颤,并出现书写震颤。有口腔炎反复发作。该患者的可能诊断为  
 A. 汞中毒  
 B. 铅中毒  
 C. 苯中毒  
 D. 镉中毒  
 E. 砷中毒
34. 南方某村,居民以玉米为主食,某年秋天突然有10余人出现发热、呕吐、厌食、黄疸,随后出现腹水、浮肿,因抢救及时未出现死亡病例,经医生诊断排除传染性肝炎,分析原因与居民主食玉米有关,该情况最可能是

- A.污水灌田引起玉米中镉超标  
B.玉米晾晒过程被多环芳烃污染  
C.玉米有农药残留  
D.玉米被黄曲霉毒素污染  
E.玉米中混进了有毒植物种子
- 35.某石棉厂工人,工作30年。近期频繁出现心慌、气短等症状,经X线检查发现该工人肺部有团块状阴影。确诊为硅肺。该病属于
- A.职业性伤害  
B.职业性工伤  
C.职业病  
D.职业性损伤  
E.工作有关疾病
- 36.国家规定与艾滋病检测相关的制度是
- A.义务检测  
B.强制检测  
C.有关检测  
D.自愿检测  
E.定期检测
- 37.下列疾病属于《传染病防治法》规定的乙类传染病的是
- A.鼠疫  
B.霍乱  
C.艾滋病  
D.黑热病  
E.流行性感冒
- 38.A县王某系艾滋病患者,在B市传染病医院隔离治疗期间,擅自逃出医院回到A县,脱离隔离治疗。为防止艾滋病传播,可以协助传染病医院追回王某采取强制隔离治疗措施的是下列哪个部门
- A.卫生行政部门  
B.疾病预防控制中心  
C.公安部门  
D.司法部门  
E.民政部门
- 39.医疗卫生机构和有关单位发现有突发卫生事件情形的,向所在地卫生行政主管部门报告的时限要求是在发现
- A.6小时后  
B.4小时后  
C.3小时后  
D.2小时后  
E.2小时内
- 40.个体自我意识发展的开始时期是在
- A.胎儿期  
B.婴儿期  
C.幼儿期  
D.学龄期  
E.青春意识
- 41.在印度丛林有两个被狼抚养的孩子,他们与狼共同生活7年,被人们发现之后,将其带回人类,10年后,他们还是不会人类的语言,只能一些简单的表达,但是他们还是能够听懂狼的语言,这事件说明
- A.人类的自制力存在关键期  
B.儿童时期对人的发展很重要  
C.人的语言与智力发展存在关键期  
D.人格发展存在关键期  
E.人接受一种语言后很难改变
- 42.心理评估的常用方法不包括
- A.会谈法  
B.测验法  
C.调查法  
D.观察法  
E.实验法
- 43.某女生在一次动物试验中,因抓大白鼠方法不对被咬,引起焦虑和恐惧发作,而后表现为见鼠就尖叫、害怕、心跳剧烈。患者主动求医,心理治疗方法是
- A.自由联想法  
B.厌恶疗法  
C.奖励疗法  
D.系统脱敏法  
E.生物反馈疗法
- 44.关于生物-心理-社会医学模式,下述提法中错误的是
- A.人们关于健康和疾病的基本观点  
B.医学道德进步的重要标志

C.医学临床活动和医学研究的指导思想  
D.医学实践的反映和理论概括  
E.对医德修养和医德教育的最全面认识  
45.在医疗实践活动中分配医疗收益与负担时,类似的个案适用相同的准则,不同个案适用不同的准则。这所体现的医学伦理基本原则是

- A.尊重原则
- B.不伤害原则
- C.公正原则
- D.有利原则
- E.公益原则

46.在下列选项中,不属于医学伦理学的基本原则是

- A.不伤害原则
- B.人道原则
- C.有利原则
- D.尊重原则
- E.公正原则

47.某医院急诊医生接诊了一位遭遇车祸后昏迷的患者,立即给予心肺复苏、气管插管等抢救措施。此时的医患关系所属的类型是

- A.共同参与型
- B.主动-被动型
- C.指导合作型
- D.合作-监督型
- E.主动权威型

48.不属于患者道德权利的是

A.根据病情获得休息和免除一定社会义务  
B.医疗保障权  
C.医疗服务的选择权  
D.疾病的认知权  
E.对医疗机构及其医务人员进行监督

49.女,70岁。咳嗽、咳痰20年,气短3年,加重5天。查体:桶状胸,呼气相延长。动脉血气分析示:pH 7.35,PaO<sub>2</sub>55 mmHg,PaCO<sub>2</sub>54 mmHg。该患者出现呼吸困难的机制不包括

- A.阻塞性通气功能障碍

- B.弥散功能障碍
- C.无效腔增加
- D.限制性通气功能障碍
- E.通气/血流比例失衡

50.男,70岁。因咳嗽、咳痰30年,气短5年,近期加重前来体检,胸部X线片示双肺透光度增加。其胸部查体最可能出现的体征是

- A.语颤增强
- B.呼吸音增强
- C.叩诊实音
- D.叩诊过清音
- E.三凹征

51.男,65岁。间断咳嗽、咳痰5年。吸烟35年,1~2包/日。胸部X线片示双肺透亮度略增加。为明确诊断,宜首选的检查是

- A.动脉血气分析
- B.胸部高分辨CT
- C.肺通气扫描
- D.肺功能
- E.支气管镜

52.女性,58岁。反复咳嗽、咳痰、喘息32年,加重3天。查体:桶状胸,双肺满布哮鸣音,血气分析 PaO<sub>2</sub>58 mmHg,PaCO<sub>2</sub>55 mmHg。此时该患者呼吸功能检查结果最可能的是

- A.VC 正常、FEV<sub>1</sub>%正常、RV/TLC<40%
- B.VC 降低、FEV<sub>1</sub>%正常、RV/TLC<40%
- C.VC 降低、FEV<sub>1</sub>%增加、RV/TLC>40%
- D.VC 正常、FEV<sub>1</sub>%降低、RV/TLC<40%
- E.VC 降低、FEV<sub>1</sub>%降低、RV/TLC>40%

53.男,54岁。因“进行性呼吸困难1年”就诊,既往体健。查体:口唇轻度发绀,双肺呼吸音清晰,未闻及干湿啰音。心界无扩大,P<sub>2</sub>亢进、分裂,三尖瓣区可闻及2/6级收缩期杂音。左下肢轻度凹陷性水肿,并可见浅静脉曲张。该患者最可能的诊断是

- A.慢性肺源性心脏病
- B.冠心病
- C.扩张型心肌病
- D.先天性心脏病
- E.风湿性心脏瓣膜病

54.男,67岁,吸烟者。家属发现患者呼之不应半小时送医院。COPD病史30余年。查体:BP 150/50 mmHg,浅昏迷状,球结膜水肿,双肺可闻及干湿啰音, $A_2 < P_2$ ,下肢水肿。为明确诊断首选的检查是

- A.动脉血气分析
- B.胸部X线片
- C.心脏超声波
- D.动态心电图
- E.肺功能

55.用于鉴别COPD和支气管哮喘的试验是

- A.过敏原试验
- B.支气管激发试验
- C.低氧激发试验
- D.运动试验
- E.支气管舒张试验

56.女,35岁。间断咳嗽、咳脓痰伴咯血10余年,再发2天入院。咯血总量约600 mL,经抗感染、静脉点滴垂体后叶素治疗后咯血停止。行胸部X线检查示多发囊状及柱状影,部分囊内可见液平,余肺未见异常。该患者进一步采取的最佳治疗措施是

- A.支气管动脉栓塞
- B.规律使用流感疫苗
- C.感染时联合使用抗生素
- D.手术切除病变肺叶
- E.抗生素预防感染

57.男,78岁。因脑梗死住院1个月,近2周出现高热咳嗽,咳血痰。查体:体温 $39.2^{\circ}\text{C}$ ,意识模糊,呼吸急促,口唇发绀,双散在湿啰音,血WBC  $20.2 \times 10^9/\text{L}$ ,胸片:右肺大片状阴影,其中可见多个气囊腔。该患者最可能得的是

- A.金黄色葡萄球菌肺炎
- B.肺炎链球菌肺炎
- C.肺炎支原体肺炎
- D.干酪性肺炎
- E.铜绿假单胞菌肺炎

58.患者,女性,17岁。高热,咳铁锈色

痰,右下肺部呼吸音弱,以下哪项不正确

- A.卧床休息支持治疗
- B.首选青霉素
- C.青霉素过敏的选用红霉素
- D.用药后复查胸片,阴影消散后停抗生素
- E.抗生素疗程5~7天

59.女性,18岁。肺炎球菌肺炎患者,意识模糊,血气 $\text{PaO}_2$  38 mmHg,  $\text{PaCO}_2$  30 mmHg。中心管道氧疗时应采用

- A.内给氧
- B.高浓度给氧
- C.持续低流量给氧
- D.鼻导管低浓度给氧
- E.鼻塞低浓度间歇给氧

60.患者,男,28岁,吸烟患者。因低热、咳嗽2个月,痰中带血1周来院门诊。查体:T  $37.5^{\circ}\text{C}$ ,双侧颈后可触及多个可活动之淋巴结,右上肺可闻及支气管肺泡音,胸片示右上肺云雾状阴影。最可能的诊断是

- A.原发型肺结核
- B.血行播散型肺结核
- C.浸润型肺结核
- D.支气管肺癌
- E.慢性纤维空洞型肺结核

61.患者,男,25岁,学生。近2周来因“备考”较劳累后感觉乏力,今日突发寒战、发热,咯血而就诊。查体:T  $39^{\circ}\text{C}$ ,右上肺可闻及少许湿啰音。WBC  $10.8 \times 10^9/\text{L}$ ,N 0.85,胸片见右上肺大片浓淡不均、密度增高阴影。最可能的诊断是

- A.右上肺炎球菌肺炎
- B.右上肺干酪性肺炎
- C.右上肺支原体肺炎
- D.右上肺过敏性肺炎
- E.右上肺癌

62.关于晚期肺癌压迫、侵犯邻近器官、组织或远处转移时,下列现象不正确的是

- A.侵犯膈神经,引起同侧膈肌麻痹
- B.侵犯喉返神经,引起声带麻痹、声音嘶哑

- C. 骨关节病综合征  
D. 侵犯胸膜,引起胸膜腔积液  
E. 侵入纵隔,压迫食管,引起吞咽困难
63. 目前慢性心力衰竭的最常见病因是  
A. 心房颤动  
B. 冠心病  
C. 风湿性心脏瓣膜病  
D. 扩张型心肌病  
E. 甲状腺功能亢进致心肌损害
64. 慢性心力衰竭症状急性加重的最常见诱因是  
A. 情绪激动  
B. 肺血栓栓塞  
C. 药物治疗不当  
D. 体力活动  
E. 感染
65. 临床上能增加左心室后负荷的是  
A. 二尖瓣反流  
B. 高血压  
C. 房间隔缺损  
D. 主动脉瓣反流  
E. 室间隔缺损
66. 女,64岁。突发气急4小时,伴咳嗽、咳粉红色泡沫样痰,不能平卧。高血压病史10余年。查体:BP 190/110 mmHg。心率110次/分,律齐,双肺可闻干性啰音及细湿啰音。治疗措施不正确的是  
A. 静脉推注呋塞米  
B. 静脉推注美托洛尔  
C. 静脉滴注硝普钠  
D. 静脉推注吗啡  
E. 高流量吸氧
67. 男,56岁。间断活动时喘憋1年余,近期加重,重体力活动即感喘憋,有夜间憋醒。既往高血压病8年余,糖尿病4年余。查体:BP 150/100 mmHg,双肺呼吸音清,心率76次/分,律齐。患者经药物治疗症状好转,为改善预后需要长期使用的药物是  
A. 洋地黄类药物  
B. 肾上腺素能受体激动剂  
C. 磷酸二酯酶抑制剂  
D. 利尿剂  
E. 血管紧张素转换酶抑制剂
68. 男,55岁。因持续胸痛10小时收入院。查体:BP 120/80 mmHg,高枕卧位。双肺可闻及较多细湿啰音,啰音范围大于1/2肺野。心电图示导联ST段抬高0.2~0.4 mV。该患者的心功能分级是  
A. Killip 分级Ⅱ级  
B. NYHA 分级Ⅲ级  
C. NYHA 分级Ⅳ级  
D. Killip 分级Ⅳ级  
E. Killip 分级Ⅲ级
69. 男性,73岁。因持续性胸痛8小时入院,查体双肺底有少量湿啰音,诊断为急性心肌梗死。该患者心功能分级为  
A. NYHA 分级Ⅰ级  
B. NYHA 分级Ⅳ级  
C. NYHA 分级Ⅱ级  
D. Killip 分级Ⅱ级  
E. Killip 分级Ⅲ级
70. 合并急性左心衰竭的阵发性室上性心动过速,最佳治疗是  
A. 静脉注射维拉帕米  
B. Valsalva 动作  
C. 直流电复律  
D. 置入起搏器  
E. 射频消融
71. 使快速房颤的心室率减慢,应首选  
A. 利多卡因  
B. 苯妥英钠  
C. 普鲁卡因胺  
D. 洋地黄  
E. 奎尼丁
72. 男,87岁。高血压病史10余年,长期服用钙通道阻滞剂,1个月前因血压控制不满意加用美托洛尔25 mg bid,近1周出现乏力、倦怠、间断黑矇。查体:BP 110/70 mmHg,心率50次/分,心律不齐,各瓣膜区未闻及杂音。心电图示“PR间期逐渐延长直至QRS波群脱

落”最恰当的处理是

- A. 植入永久起搏器
- B. 将美托洛尔调整为 12.5 mg bid
- C. 将美托洛尔调整为 25 mg qd
- D. 停用美托洛尔
- E. 将美托洛尔更换为地尔硫草:30 mg tid

73.男,68岁。持续心房纤颤6年,一直服用地高辛治疗。近1周感心悸,头晕。查体:心率41次/分,律齐。最可能的诊断是

- A. 窦性心动过缓
- B. 心房扑动6:1下传
- C. 病态窦房结综合征
- D. 房性逸搏心律
- E. 心房纤颤合并完全性房室传导阻滞

74.女,68岁。1年前于坐位早餐时无明显诱因突感心悸,随之意识丧失跌倒,数分钟后意识恢复。无大汗、肢体抽搐、口吐白沫和大小便失禁。1年来反复发作上述症状3次。发作与体位和运动无关。查体:BP 130/70 mmHg,心率48次/分。心电图示二度Ⅱ型房室传导阻滞。该患者意识丧失最可能的原因是

- A. 低血糖
- B. 迷走神经张力增高
- C. 癫痫发作
- D. 直立性低血压
- E. 心律失常

75.女,64岁。持续胸痛4小时,突然出现头晕。查体 BP 95/65 mmHg,心率32次/分,心律齐。心电图:Ⅱ、Ⅲ、aVF导联ST段弓背向上抬高0.3 mV。V<sub>1</sub>~V<sub>5</sub>导联ST段压低0.2 mV,QRS波群时限0.14秒。该患者最可能出现的心律失常是

- A. 二度窦房传导阻滞
- B. 完全性右束支传导阻滞
- C. 三度房室传导阻滞
- D. 心房扑动
- E. 窦性心动过缓

76.男,60岁。突发意识丧失,心电监护示心电波形、振幅与频率均极不规则,无法辨认QRS波群、ST段与T波。该患者应首选

- A. 阿托品 0.1 mg 静脉注射
- B. 胺碘酮 150 mg 静脉注射
- C. 360 J 直流电除颤
- D. 美托洛尔 5 mg 静脉注射
- E. 利多卡因 1~1.5 mg/kg 静脉注射

77.男,47岁。突然神志丧失,呼吸不规则,即刻进行心脏按压。判断其是否有效的主要方法是

- A. 测血压
- B. 呼喊患者看其是否清醒
- C. 摸桡动脉搏动
- D. 摸股动脉搏动
- E. 观察末梢循环状况

78.男,45岁。1年前发现血压170/110 mmHg,长期口服氨氯地平药物治疗。2个月前诊断为糖尿病,口服降糖药治疗,目前血压、血糖均在正常范围。该患者高血压诊断正确的是

- A. 高血压3级,高危
- B. 高血压1级
- C. 高血压3级,很高危
- D. 高血压2级,很高危
- E. 高血压2级,高危

79.男,32岁。发现血压增高3年。近1年血压持续为170~200/130~140 mmHg,近1周头痛、视力模糊。眼底检查发现视盘水肿,最可能的诊断为

- A. 急性视盘病变
- B. 脑出血
- C. 恶性高血压
- D. 脑梗死
- E. 高血压脑病

80.患者,男性,65岁。患高血压病多年,1年来血压经常为170~180/110~120 mmHg。X线胸片示左室增大,肺淤血。眼底为高血压三级改变,尿常规正常,诊断为

- A. 高血压病一级
- B. 高血压病二级
- C. 高血压病三级
- D. 急性高血压



E. 高血压危象

81. 男性, 40 岁。陈旧性心肌梗死 3 年, 高血压病史 4 年。体检: BP 150/95 mmHg, 心率 90 次/分, 降压治疗宜首选

- A.  $\alpha$  受体阻滞剂
- B.  $\beta$  受体阻滞剂
- C. 利尿剂
- D. 二氢吡啶类钙离子通道阻滞剂
- E. 神经节阻断剂

82. 男, 67 岁。患高血压 18 年, 2 年前患急性前壁心肌梗死, 门诊测血压 170/100 mmHg, 心率 96 次/分, 该患者的最佳药物选择是

- A. 美托洛尔
- B. 维拉帕米
- C. 卡托普利
- D. 吲达帕胺
- E. 哌唑嗪

83. 有关急性心肌梗死心肌损伤标记物的描述, 不正确的是

- A. 肌红蛋白起病后 2 小时内升高, 12 小时内达到高峰, 24~48 小时恢复正常
- B. 肌钙蛋白起病后 6 小时内升高, 5~6 天恢复正常
- C. CK-MB 起病后 4 小时内增高, 16~24 小时达高峰, 3~4 天恢复正常
- D. AST 在起病 6~10 小时开始升高, 3~6 天恢复正常
- E. LDH 在起病 6~10 小时后升高, 1~2 周内恢复正常

84. 急性前壁心肌梗死后 24 小时内出现急性肺水肿时应该慎用

- A. 毛花苷丙
- B. 呋塞米
- C. 硝酸甘油
- D. 硝普钠
- E. 氨茶碱

85. 男, 68 岁。持续胸痛 2 小时, 既往体健。查体: BP 110/65 mmHg, 双肺呼吸音清, 心率 94 次/分, 心音低钝,  $A_2 > P_2$ 。心电图  $V_1 \sim V_6$  导联 ST 段弓背向上抬高 0.3~0.5 mV。

实验室检查: 血清肌钙蛋白 I 水平正常。该患者最可能的诊断是

- A. 急性心肌梗死
- B. 肺血栓栓塞
- C. 不稳定型心绞痛
- D. 急性心包炎
- E. 急性心肌炎

86. 男, 48 岁。发作性胸痛 1 个月, 每次发作含硝酸甘油后缓解, 考虑冠心病心绞痛。最常用的检查方法是

- A. 心脏 X 线摄片
- B. 心电图运动负荷试验
- C. 放射性核素检查
- D. 动态心电图
- E. 超声心动图

87. 男, 55 岁, 近 6 个月来反复发生活动时胸骨后闷痛, 每于快步行走或负重时发生, 每月约发作 1 次, 每次持续 3~5 分钟, 休息后可自行缓解, 该患者的心绞痛类型是

- A. 初发劳力型心绞痛
- B. 变异型心绞痛
- C. 混合型心绞痛
- D. 恶化劳力型心绞痛
- E. 稳定劳力型心绞痛

88. 患者, 男性, 27 岁。劳累时心悸、胸骨后疼痛 1 年。查体: 可闻及主动脉瓣区收缩期粗糙的喷射性杂音, 主动脉瓣区第二心音减弱。X 线检查示: 左室扩大和升主动脉扩张, 可能的诊断是

- A. 冠心病心绞痛
- B. 非梗阻性肥厚型心肌病
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 高血压性心脏病

89. 患者, 男性, 64 岁。头晕、心悸 4~5 年, 心尖搏动向左下移位, 呈抬举性搏动, 于胸骨左缘第 3~4 肋间闻及叹气样舒张期杂音, 为递减型, 向心尖传导, 在心尖区闻及隆隆样舒张早期杂音, 股动脉可闻及射枪音, 首先应想到的诊断为

- A.二尖瓣狭窄
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.二尖瓣关闭不全
- D.主动脉瓣狭窄
- E.室间隔缺损

90.女,65岁。冠脉介入手术时突感呼吸困难,欲坐起。查体:BP 100/70 mmHg,心率102次/分,律齐,心尖部新出现收缩期吹风样杂音。该患者杂音的最可能原因是

- A.左室流出道狭窄
- B.风湿性心脏瓣膜病
- C.主动脉瓣脱垂
- D.急性心包炎
- E.急性二尖瓣关闭不全

91.与幽门螺杆菌感染密切相关的疾病是

- A.十二指肠溃疡
- B.急性胃肠炎
- C.急性胰腺炎
- D.溃疡性结肠炎
- E.慢性胆囊炎

92.下列哪一项属于胃十二指肠黏膜防卫因子

- A.胃酸/胃蛋白酶
- B.前列腺素
- C.胆盐
- D.胰酶
- E.药物(NSAIDs)

93.女,42岁。胃灼热半年,无吞咽困难。胃镜检查提示慢性浅表性胃炎。为进一步明确诊断,应进行的检查是

- A.24小时食管pH监测
- B.食管脱落细胞学检查
- C.胸部CT
- D.食管X线钡剂造影
- E.动态心电图

94.男,65岁。反复反酸、胃灼热、上腹胀4年,加重1个月。胃镜检查:食管下段见3条纵行黏膜破损,相互融合。目前最主要的治疗药物是

- A.硫糖铝

- B.西咪替丁
- C.铝碳酸镁
- D.奥美拉唑
- E.枸橼酸铋钾

95.男,54岁。呕血、黑便2天,嗜睡、行为改变1天。实验室检查:ALT 35 U/L,AST 72 U/L,Alb 27.3 g/L。腹部B超示脾大。最可能的诊断是

- A.胃癌
- B.肝硬化失代偿期合并肝性脑病
- C.急性胃黏膜病变
- D.消化性溃疡
- E.食管贲门黏膜撕裂综合征

96.男,52岁。乏力、腹胀1年,加重伴腹痛2天。慢性乙型肝炎病史12年。查体:T 38.8℃,前胸可见数个蜘蛛痣,腹部饱满,全腹弥漫压痛及反跳痛,移动性浊音阳性。最可能的诊断是

- A.肝癌破裂
- B.结核性腹膜炎
- C.自发性腹膜炎
- D.上消化道穿孔
- E.腹膜转移癌

97.男,38岁。患肝硬化3年。1周来畏寒发热,体温38℃左右,全腹痛,腹部明显膨隆,尿量500 mL/24h。以下体征中,对目前病情判断最有意义的是

- A.全腹压痛及反跳痛
- B.蜘蛛痣及肝掌
- C.腹部移动性浊音阳性
- D.脾肿大
- E.腹壁静脉曲张呈海蛇头样

98.女,52岁。肝炎肝硬化10年,近3个月腹围明显增大,1周来少尿。无腹痛、发热。查体:腹部无压痛,移动性浊音(+).实验室检查:血肌酐130 μmol/L,AFP正常,最可能的并发症是

- A.肝癌
- B.自发性腹膜炎
- C.肝肾综合征

D.门静脉血栓形成

E.继发性腹膜炎

99.女,59岁。无痛性进行性皮肤巩膜黄染3个月。查体:T 36.4℃,P 60次/分,BP 120/90 mmHg。皮肤巩膜黄染,右上腹可触及肿大的肝脏和胆囊。Murphy征(-)。首先进行的腹部影像学检查是

A.MRI

B.B超

C.X线

D.核素扫描

E.CT

100.男,62岁。皮肤黄染进行性加重1个月,伴上腹胀,隐痛,食欲差,乏力。10天前感皮肤瘙痒,大便呈白陶土样。查体:消瘦,巩膜黄染,腹部稍胀,无明显压痛,未触及包块,胆囊无肿大。血AFP 5 μg/L。最可能的诊断是

A.肝门部胆管癌

B.胆囊癌

C.胆总管下段癌

D.肝癌

E.胰头癌

101.女,36岁。反复腹泻2年,间有脓血便,粪培养阴性,多种抗生素治疗无效,为明确诊断,首选的检查是

A.腹部平片

B.X线胃肠钡餐检查

C.钡剂灌肠造影

D.结肠镜检查

E.腹部CT

102.患者,女性,32岁。确诊溃疡性结肠炎6年。腹痛、腹泻加重伴高热、腹胀3天,2天来大量便血,腹胀明显。查体:全腹压痛、反跳痛明显,腹部听诊3分钟未闻及肠鸣音。首选的检查是

A.腹部CT

B.立位腹部X线平片

C.腹部B超

D.结肠镜

E.结肠X线气钡双重造影

103.女,55岁。间断腹泻5年,黏液脓血便3~4次/天,伴左下腹部疼痛,口服甲硝唑及利复星治疗无明显好转。查体:左下腹部压痛(+)。最可能的诊断是

A.克罗恩病

B.慢性细菌性痢疾

C.溃疡性结肠炎

D.结肠癌

E.缺血性肠病

104.患者,男性,42岁。半年来反复出现脓血便伴里急后重,抗感染治疗无效,结肠镜检查可见直肠黏膜弥漫性充血、水肿,血管纹理不清,黏膜粗糙质脆,病变间无正常黏膜。最可能的诊断是

A.结肠癌

B.溃疡性结肠炎

C.细菌性痢疾

D.克罗恩病

E.肠结核

105.患者,男性,32岁。反复脓血便伴里急后重1年,抗生素治疗无效。下消化道X线钡剂造影检查发现直肠、乙状结肠多发龛影,黏膜紊乱及颗粒样改变。最可能的诊断是

A.克罗恩病

B.溃疡性结肠炎

C.肠结核

D.细菌性痢疾

E.结肠癌

106.患者,男性,30岁。反复黏液脓血便3年,加重2个月,抗生素治疗无效。肠镜显示较多糜烂及浅表小溃疡。最可能的诊断是

A.溃疡性结肠炎

B.克罗恩病

C.细菌性痢疾

D.阿米巴痢疾

E.肠结核

107.男,29岁。急性化脓性阑尾炎7天,非手术治疗,突发高热,寒战,右季肋区疼痛。查体:T 38.5℃,皮肤巩膜轻度黄染,右季肋区叩痛。实验室检查:ALT、AST、总胆红素均轻

度升高。腹部超声提示肝脏可见数个液性暗区。最可能的诊断是

- A. 细菌性肝脓肿
- B. 肝包虫病
- C. 阿米巴肝脓肿
- D. 胆管囊肿继发感染
- E. 肝转移癌

108. 女, 25 岁。妊娠 5 个月, 因转移性右下腹痛 2 小时就诊。经检查诊断为急性阑尾炎。其治疗措施错误的是

- A. 行阑尾切除术
- B. 围手术期加用黄体酮
- C. 手术切口应偏低
- D. 尽量不用腹腔引流
- E. 可应用广谱抗生素

109. 男, 36 岁。急性坏疽性阑尾炎手术后 5 天, 出现尿频、尿急、大便次数增多、里急后重、发热。其最可能的并发症是

- A. 急性肾盂肾炎
- B. 盆腔脓肿
- C. 肛周脓肿
- D. 阑尾残株炎
- E. 急性膀胱炎

110. 患者, 男性, 35 岁。因急性阑尾炎穿孔, 行阑尾切除手术后 5 天, 仍有腹胀、腹痛, T 38.5℃, 大便 4~6 次/天, 有下坠感。首选的检查是

- A. 查看切口
- B. 腹部 B 超
- C. 粪便常规检查
- D. 直肠指检
- E. 血常规检查

111. 男, 55 岁。因低位直肠癌行 Dixon 术, 术后吻合口位于齿状线上 1 cm。患者术后最可能出现的情况是

- A. 性功能障碍
- B. 排尿功能障碍
- C. 排便功能完全正常
- D. 排便前有便意, 但不能控制排便
- E. 排便前无明显便意, 排便控制不理想

112. 男, 29 岁。排便时肛门剧痛 1 周。有鲜血滴入便池, 排便后肛门疼痛加重。造成便后肛门疼痛加重的机制是

- A. 肛门括约肌痉挛
- B. 截石位的 12 点处神经敏感
- C. 粪便干燥, 排使用力过度
- D. 继发肛窦炎
- E. 肛管皮肤全层裂开并形成慢性溃疡

113. 女性, 30 岁。便秘 2 年, 近半月来排便时肛门疼痛, 粪便表面及便纸上附有鲜血, 其诊断最可能是

- A. 内痔
- B. 外痔
- C. 直肠癌
- D. 肛瘘
- E. 肛裂

114. 女, 30 岁。肛门周围胀痛, 伴畏寒、发热 3 天。检查: 肛门周围皮肤发红, 压痛明显。最可能的诊断是

- A. 肛门旁皮下脓肿
- B. 肛窦炎
- C. 混合痔
- D. 内痔
- E. 肛瘘

115. 男, 54 岁。肛门胀痛 6 天。为持续性痛, 逐渐加重, 排便和行走时出现剧痛, 有里急后重感和排便困难, 伴发热, 全身不适。查体: T 39.6℃, 肛门左侧红肿, 有明显压痛。肛诊: 直肠左侧饱满, 压痛(+), 有波动感。实验室检查: WBC  $21 \times 10^9/L$ , N 0.92。决定立即行切开引流术, 最主要的依据是

- A. 行走时出现剧痛
- B. 局部饱满有波动感
- C. 白细胞增高
- D. 高热, 全身症状
- E. 有排便困难

116. 男, 57 岁。进食后呕吐大量鲜血 6 小时, 既往乙肝病 30 余年。为迅速明确出血病因, 首选的检查是

- A. 腹部 CT

- B.选择性腹腔动脉造影
- C.上消化道 X 线钡餐造影
- D.胃镜
- E.腹部 B 超

117.男,36岁。间断上腹痛 10 余年,饥饿及夜间加重。1 天前饮酒后腹痛加剧,1 小时前排柏油样便 300 mL,伴头晕。为明确诊断,首选的检查是

- A.腹部 B 超
- B.上消化道钡剂造影
- C.胃镜
- D.结肠镜
- E.粪常规+隐血

118.男,35岁。呕血并黑便 3 小时。既往有十二指肠溃疡病史 5 年。目前不宜选择的检查是

- A.腹部 B 超
- B.上消化道 X 线钡剂造影
- C.胃镜
- D.肝功能检查
- E.凝血功能

119.男,22岁。饥饿性上腹痛伴反酸 1 月余。2 小时前呕吐咖啡色液体 1 次,量约 200 mL。近期体重无明显变化,否认慢性肝病史。查体:贫血貌,腹软,上腹部压痛,无反跳痛,肝脾肋下未触及。最合适的药物是

- A.氨甲环酸
- B.法莫替丁
- C.奥美拉唑
- D.凝血酶
- E.垂体后叶素

120.男,65岁。上腹部无规则隐痛 2 个月,因饮酒后呕咖啡样物 250 mL,柏油样便 300 mL 来诊,无肝病史。查体:血压 90/60 mmHg,脉搏 100 次/分,血红蛋白 90 g/L,上腹部轻度压痛,肝脾肋下未触及。其止血措施最好选择

- A.维生素 K<sub>1</sub> 静滴
- B.奥美拉唑静注
- C.6-氨基己酸静滴
- D.三腔二囊管压迫

E.垂体后叶素静滴

121.腹股沟斜疝患者疝还纳后,使肿物不再出现的压迫部位是

- A.海氏三角
- B.腹股沟韧带中点
- C.阴囊根部
- D.斜疝外环
- E.腹股沟韧带中点上方 2 cm

122.先天性腹股沟斜疝发生的最主要原因是

- A.腹外斜肌发育不全
- B.腹横筋膜发育不全
- C.腹膜鞘突不闭锁
- D.腹横肌发育不全
- E.腹内斜肌发育不全

123.自 Hesselbach 三角向外突出的疝称为

- A.股疝
- B.腹股沟直疝
- C.腹股沟斜疝
- D.脐疝
- E.白线疝

124.关于腹股沟疝的描述正确的是

- A.斜疝疝块外形多呈半球形
- B.斜疝疝囊颈在腹壁下动脉外侧
- C.直疝精索在疝囊后方
- D.直疝多见于儿童
- E.直疝由直疝三角突出,可进入阴囊

125.直疝三角的三边是

- A.腹壁下动脉、联合腱和腹股沟韧带
- B.联合腱、腹直肌外缘和耻骨梳韧带
- C.联合腱、腹股沟韧带和腹直肌外缘
- D.腹壁下动脉、腹直肌外缘和腹股沟韧带
- E.腹壁下动脉、腹直肌外缘和耻骨梳韧带

126.男性,6 个月大。哭闹时,右侧腹股沟隆起肿块,平静时肿块可自行消失。最佳处理方法是

- A.绷带压住腹股沟深环,观察
- B.尽早施行疝囊高位结扎术
- C.施行加强前壁的疝修补术

D.施行加强后壁的疝修补术

E.施行无张力疝修补术

127.女,62岁。右侧股疝嵌顿10小时。查体:腹胀明显,右下腹局限性压痛(+),肌紧张,肠鸣音亢进。右侧腹股沟韧带下方隆起肿块,有压痛。手术时发现小肠坏死,行坏死小肠切除后,下一步正确的手术措施是

A.单纯疝囊高位结扎术

B.Mc Vay 法疝修补术

C.Bassini 法疝修补术

D.Halsted 法疝修补术

E.Ferguson 法疝修补术

128.女,44岁。突发右下腹疼痛伴呕吐、停止排气排便6小时。查体:P 110次/分, BP 120/80 mmHg,右侧腹股沟韧带下方卵圆窝处可及半球形包块,压痛明显,不能还纳。下一步处理正确的是

A.立即扩容补液

B.手法还纳包块

C.立即手术治疗

D.密切观察病情变化

E.应用吗啡,缓解疼痛

129.男,74岁。左腹股沟可复性包块10年,不能回纳8小时,以左腹股沟斜疝嵌顿急诊手术,术中见部分嵌顿小肠肠管色暗,无蠕动,行部分肠切除。此时不宜行疝修补术的理由是

A.术前准备不充分

B.术后易出现腹胀

C.患者年龄大,伤口愈合能力低

D.术后易继发手术野感染

E.术后易发生上呼吸道感染

130.男性,80岁。右腹股沟斜疝6小时来诊,既往有可复性腹股沟肿物史30年。检查:右侧腹股沟至阴囊10 cm×6 cm嵌顿疝,皮肤无红肿。首选的治疗方法是

A.试行手法复位

B.手术复位并行疝囊高位结扎

C.手术复位并行加强腹股沟管疝修补术

D.手术复位并行无张力疝修补术

E.手法复位并行加强腹股沟管疝修补术

131.男,33岁。右上腹外伤2小时。查体:P 120次/分,R 28次/分, BP 90/60 mmHg,全腹有压痛、反跳痛,以右上腹为著,移动性浊音(+).最有意义的辅助检查是

A.腹部B超

B.立位腹部X线平片

C.腹部CT

D.诊断性腹腔穿刺

E.腹部MRI

132.男性,20岁。创伤10分钟来院,神志清楚,面色苍白,右股外侧可见3 cm长创口,无出血,肢体无反常活动,血压90/60 mmHg,脉搏122次/分,呼吸28次/分,患者自觉腹胀,排气1次。不正确的急诊处置是

A.生命体征监护

B.右腹X线摄片检查

C.腹部超声检查

D.建立静脉输液通道

E.立位胸腹部透视检查

133.男,32岁。1小时前从3米高处坠落,左侧腰部受伤,肉眼血尿。查体:BP 60/40 mmHg,腹软,无压痛。最可能的诊断是

A.肾裂伤

B.肾挫伤

C.输尿管损伤

D.膀胱损伤

E.肾盂撕裂伤

134.男性,33岁,腹部砸伤5小时。查体:四肢湿冷,腹肌紧张,全腹压痛、反跳痛。有移动性浊音。肠鸣音消失,该患者目前应进行的处理不包括

A.诊断性腹腔穿刺

B.密切监测基本生命体征

C.补充血容量,抗休克治疗

D.给予止痛和镇静剂

E.抗感染治疗

135.男,42岁。腹部撞伤3小时,持续性腹痛,未排尿。查体:T 37.5℃,P 110次/分, BP 90/60 mmHg,腹式呼吸受限,腹稍胀,全腹

肌紧张,压痛(+),腹部移动性浊音(+),肠鸣音消失。实验室检查:Hb 100 g/L,WBC  $12 \times 10^9/L$ 。最佳治疗方案是

- A.胃肠减压观察
- B.广谱抗生素治疗观察
- C.急症剖腹探查
- D.导尿,留置尿管观察
- E.抗休克治疗观察

136.女,50岁。车祸致腹部损伤3小时。伤后腹痛、腹胀。在急诊室非手术治疗观察期间,最重要的措施是

- A.实验室检查的动态监测
- B.腹部B超的动态检查
- C.腹部X线检查
- D.全面了解损伤经过
- E.观察腹部体征的变化

(137~139题共用题干)

男,52岁。2年来每于剧烈活动时发作剑突下疼痛,向咽部放射,持续数分钟可自行缓解。2周来发作频繁且有夜间睡眠中发作。2小时前出现剑突下剧烈疼痛,向胸部放射,伴憋闷、大汗,症状持续不缓解,急诊平车入院。既往有高血压病史10年,糖尿病病史5年,有吸烟史。查体:T 36.2℃ BP 160/80 mmHg。急性病容,口唇无发绀,双肺呼吸音清,心率103次/分,律不齐,期前收缩15次/分, $A_2 > P_2$ ,腹软,无压痛。

137.接诊时首先需考虑的诊断是

- A.急性胰腺炎
- B.急性心肌梗死
- C.消化性溃疡
- D.急性胆囊炎
- E.急性肺栓塞

138.最可能引起该患者死亡的原因是

- A.上消化道出血
- B.弥漫性血管内凝血
- C.急性腹膜炎
- D.恶性心律失常
- E.感染中毒性休克

139.接诊时该患者需首先完善的检查是

- A. 血气分析
- B. 急诊胃镜
- C. 血和尿淀粉酶测定
- D. 心电图
- E. 急诊腹部B超

(140~141题共用题干)

男,46岁。体检发现血压升高6个月。查体:血压150/100 mmHg,心率86次/分,律齐。实验室检查:血肌酐 $96 \mu\text{mol/L}$ ,血尿酸 $500 \mu\text{mol/L}$ 。

140.该患者控制血压的目标值是血压低于

- A.130/80 mmHg
- B.120/70 mmHg
- C.140/90 mmHg
- D.130/90 mmHg
- E.140/80 mmHg

141.该患者不宜选用的降压药是

- A.血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂
- B.噻嗪类利尿剂
- C.钙通道阻滞剂
- D.血管紧张素转换酶抑制剂
- E.β受体拮抗剂

(142~144题共用题干)

男性,35岁。3个月来低热、盗汗、消瘦,1个月来劳累后气短。查体:T 37.6℃,右下肺触觉语颤减弱,叩诊呈浊音,呼吸音消失。心尖搏动向左移位,心音正常,心率98次/分,律整,无杂音,超声示右侧胸腔中等量积液。

142.对患者进行初步诊断,首先考虑为

- A.结核性胸腔积液
- B.病毒性胸腔积液
- C.化脓性胸腔积液
- D.肿瘤性胸腔积液
- E.支原体性胸腔积液

143.入院后应采取的最主要诊断措施是

- A.胸腔穿刺抽液检查
- B.血培养
- C.PPD试验
- D.胸部CT检查

E.胸腔镜检查

144.该患者还可能出现的体征是

- A.右侧肺底下移
- B.气管向左移位
- C.右上肺可闻管状呼吸音
- D.双侧胸廓肋间隙变窄
- E.肝界上移

(145~146题共用备选答案)

- A.PaO<sub>2</sub>70 mmHg, PaCO<sub>2</sub> 45 mmHg
- B.PaO<sub>2</sub> 70 mmHg, PaCO<sub>2</sub> 40 mmHg
- C.PaO<sub>2</sub> 55 mmHg, PaCO<sub>2</sub> 50 mmHg
- D.PaO<sub>2</sub>50 mmHg, PaCO<sub>2</sub> 40 mmHg
- E.PaO<sub>2</sub>65 mmHg, PaCO<sub>2</sub> 40 mmHg

145.符合 I 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

146.符合 II 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

(147~148题共用备选答案)

A.噻嗪类利尿剂

B.α受体阻滞剂

C.血管紧张素转换酶抑制剂

D.二氢吡啶类钙通道阻滞剂

E.β受体阻滞剂

147.合并低钾血症的高血压患者降压不宜使用的药物是

148.合并糖尿病的高血压患者,血清肌酐正常,降压治疗宜首选的药物是

(149~150题共用备选答案)

A.Janeway 损害

B.瘀点

C.脾大

D.Roth 斑

E.Osler 结节

149.主要见于急性感染性心内膜炎的体征是

150.亚急性感染性心内膜炎时发生于视网膜的病变是

## 第二单元

1.关于血尿描述正确的是

- A.尿沉渣高倍镜下视野红细胞>5个
- B.尿沉渣低倍镜下视野红细胞>5个
- C.尿沉渣高倍镜下视野红细胞>3个
- D.尿沉渣低倍镜下视野红细胞>3个
- E.1 000 mL 尿液含有 10 mL 血方可表现为肉眼血尿

2.区别血尿与血红蛋白尿的主要方法是

- A.做尿胆原测验
- B.观察血尿颜色
- C.做尿潜血试验
- D.做尿三杯试验
- E.做尿沉渣镜检

3.原发性肾小球疾病的病理分型不包括

- A.轻微肾小球病变
- B.局灶性节段性病变
- C.肾病综合征
- D.膜性肾病

E.增生性肾炎

4.引起急性肾小球肾炎最常见的病原体为

- A.结核分枝杆菌
- B.金黄色葡萄球菌
- C.柯萨奇病毒
- D.寄生虫
- E.溶血性链球菌

5.慢性肾炎治疗主要目的不包括

- A.防止肾功能进行性恶化
- B.延缓肾功能进行性恶化
- C.改善或缓解临床症状
- D.防治心脑血管并发症
- E.消除尿蛋白及尿红细胞

6.尿培养的球菌菌落计数不低于多少才有诊断意义

- A.100/mL
- B.300/mL



- C. 500/mL  
D. 1 000/mL  
E. 2 000/mL
7. 药物治疗泌尿系统感染的最终目的是
- A. 使症状好转  
B. 使症状消失  
C. 尿培养菌落计数被抑制在 500/mL  
D. 尿培养菌落计数被抑制在 50/mL  
E. 达到尿液无菌, 尿培养阴性
8. 下列哪项是慢性肾盂肾炎的易感因素
- A. 胸膜炎  
B. 胃炎  
C. 甲状腺功能亢进  
D. 糖尿病  
E. 药物性皮炎
9. 静脉肾盂造影, 有诊断价值的疾病是
- A. 急性肾小球肾炎  
B. 急性肾盂肾炎  
C. 慢性肾小球肾炎  
D. 慢性肾盂肾炎  
E. 肾病综合征
10. 男, 35 岁。反复腰部绞痛伴血尿, KUB 见右肾结石, 长径: 1.8 cm。IVU 见右肾轻度积水, 输尿管显影正常, 首选的治疗方法是
- A. 经皮肾镜碎石取石  
B. 输尿管镜碎石取石  
C. 体外冲击波碎石  
D. 药物排石  
E. 抗炎治疗
11. 男, 30 岁。B 超发现右肾盂结石, 大小 2.0 cm×1.5 cm, 合并轻度肾积水。首选的治疗方法是
- A. 体外冲击波碎石  
B. 经皮肾镜碎石  
C. 多饮水+药物治疗  
D. 肾盂切开取石  
E. 服用中药排石
12. 男, 45 岁。便血、面色苍白 3 个月。血常规: Hb 60 g/L, MCHC 27%, WBC  $8.0 \times 10^9/L$ , Plt  $138 \times 10^9/L$ , 网织红细胞 0.025。最可能出

现的特有临床表现是

- A. 酱油色尿  
B. 皮肤瘀斑  
C. 匙状甲  
D. 肝、脾肿大  
E. 巩膜黄染
13. 男性, 73 岁。渐进性乏力伴面色苍白 3 个月。查体为贫血貌, 有反甲, 巩膜无黄染, 浅表淋巴结无肿大, 心率 102 次/分, 肝脾肋下未触及。血常规 Hb 76 g/L, RBC  $2.82 \times 10^{12}/L$ , MCV 78 fl, WBC  $5.0 \times 10^9/L$ , 血小板  $220 \times 10^9/L$ , 首先考虑
- A. 海洋性贫血  
B. 再生障碍性贫血  
C. 缺铁性贫血  
D. 巨幼细胞性贫血  
E. 溶血性贫血
14. 女, 25 岁。头晕、乏力 1 月。既往体健, 近 1 年来月经量明显增多。实验室检查: Hb 95 g/L, RBC  $3.5 \times 10^{12}/L$ , 红细胞大小不等, 中心淡染区扩大, WBC  $4.5 \times 10^9/L$ , Plt  $310 \times 10^9/L$ , 粪隐血(-)。最根本的治疗措施是
- A. 给予糖皮质激素  
B. 给予雄性激素  
C. 给予铁剂  
D. 治疗妇科疾病  
E. 给予维生素 B<sub>12</sub> 及叶酸
15. 男性, 30 岁。发热伴牙龈出血 3 周。查体: 贫血貌, 脾肋下 3 cm, 胸骨压痛(+); 血红蛋白 70 g/L, 白细胞  $14.0 \times 10^9/L$ , 血小板  $35 \times 10^9/L$ , 骨髓增生明显活跃, 原始细胞占 62%。为进一步诊断, 应首选的检查是
- A. 细胞化学染色  
B. 染色体核型分析  
C. 血清铁测定  
D. 血细菌培养  
E. 抗血小板抗体检测
16. 女, 18 岁。发热、鼻出血 3 天。查体: 全身浅表淋巴结肿大, 最大者 2.5 cm×2 cm 大小, 胸骨压痛(+), 肝脾肋下均可触及边缘。

骨髓细胞学检查:骨髓原始细胞占 0.65,过氧化物酶(-),非特异性酯酶染色(-)。最可能的诊断是

- A.急性单核细胞白血病
- B.急性粒-单核细胞白血病
- C.急性早幼粒细胞白血病
- D.急性淋巴细胞白血病
- E.急性红白血病

17.男性,40岁,发热伴鼻出血一周。检查牙龈肿胀,肝脾轻度肿大;血红蛋白 40 g/L, WBC  $6.0 \times 10^9/L$ ,血小板  $15 \times 10^9/L$ ,骨髓象原始细胞占 60%,过氧化物酶染色阳性,非特异性酯酶阳性,阳性反应可被氟化钠抑制,应诊断为

- A.急性粒细胞性白血病
- B.急性早幼粒细胞白血病
- C.急性淋巴细胞性白血病
- D.急性红白血病
- E.急性单核细胞性白血病

18.男,19岁。发热、鼻出血 4 天。查体:全身浅表淋巴肿大,最大者 2.5 cm×2 cm 大小,胸骨压痛(+),肝脾肋下均可触及边缘。骨髓细胞学检查:骨髓原始细胞占 0.65,过氧化物酶(-),非特异性酯酶染色(-)。最可能的诊断是

- A.急性早幼粒细胞白血病
- B.急性粒-单核细胞白血病
- C.急性单核细胞白血病
- D.急性淋巴细胞白血病
- E.急性红白血病

19.女,24岁。因重型再生障碍性贫血入院,准备 10 天后接受异基因造血干细胞移植。因大量鼻出血和牙龈出血拟行输血,需要预订的血液成分

- A.单采血小板
- B.辐照冷沉淀
- C.辐照单采血小板
- D.辐照新鲜冷冻血浆
- E.新鲜冷冻血浆

20.女,56岁。患肝炎已 20 余年,因无力、

食欲缺乏、腹胀 2 周,诊断为乙肝后肝硬化(失代偿期)入院。肝功能试验显著异常,其中白蛋白减低,球蛋白升高,白蛋白球蛋白比率倒置。为治疗低白蛋白血症,首选的血液制品是

- A.全血
- B.新鲜冰冻血浆
- C.普通冰冻血浆
- D.冷沉淀
- E.白蛋白

21.女,23岁。足月妊娠,因前置胎盘发生 DIC,阴道大出血入院。查体:T 35°C,P 134 次/分,R 26 次/分,BP 90/40 mmHg。实验室检查:Hb 50 g/L,Plt  $20 \times 10^9/L$ ,血纤维蛋白原 1.4 g/L。不正确的输血处理措施是输注

- A.普通冰冻血浆
- B.浓缩血小板
- C.新鲜冰冻血浆
- D.冷沉淀
- E.悬浮红细胞

22.抗甲状腺药物的主要作用是

- A.抑制甲状腺组织对碘的吸收
- B.减少  $T_4$  转化为  $T_3$
- C.抑制甲状腺激素合成
- D.抑制甲状腺自身免疫反应
- E.促进甲状腺激素分解代谢

23.甲状腺功能亢进的患者,停用甲硫咪唑的指征

- A.白细胞  $< 3 \times 10^9/L$
- B.突眼加重、流泪
- C.胃肠道症状、肝大
- D.全身酸痛、出汗
- E.心悸、头昏、抽搐

24.复方碘溶液治疗用于

- A.甲状腺功能亢进症术前准备
- B.甲状腺功能亢进症术后复发
- C.甲状腺癌
- D.甲状腺功能减退
- E.亚急性甲状腺炎

25.甲状腺功能亢进症 $^{131}I$ 治疗后,发生永

久性甲状腺功能减退症的原因是

- A. 甲状腺激素合成障碍
- B. 甲状腺组织细胞遭破坏
- C. 甲状腺腺体发育障碍
- D. 甲状腺激素代谢异常
- E. 组织对甲状腺激素抵抗

26. 甲状腺功能亢进症核素<sup>131</sup>I 治疗前的准备是

- A. 普萘洛尔
- B. 复方碘溶液
- C. 核素<sup>131</sup>I 吸收率试验
- D. 甲巯咪唑(他巴唑)
- E. 甲状腺 B 超

27. 甲状腺大部切除后 48 小时内, 需注意最危急的并发症为

- A. 喉上神经内侧支损伤
- B. 喉返神经单侧损伤
- C. 呼吸困难和窒息
- D. 甲状腺危象
- E. 手足抽搐

28. 女, 42 岁。多饮、多食 10 年, 空腹血糖经常大于 10.8 mmol/L。近两个月来眼睑及下肢轻度水肿, 血压 160/100 mmHg, 尿蛋白(+ +)。最可能的诊断为

- A. 糖尿病肾病
- B. 高血压病
- C. 糖尿病合并肾盂肾炎
- D. 肾小球肾炎
- E. 糖尿病酮症酸中毒

29. 男, 56 岁。糖尿病患者, 用胰岛素治疗, 晚 10 时突起心慌、多汗、软弱、继而神志不清。查体: 脉搏 120 次/分, 尿糖(-), 尿酮(-), 血尿素氮 10.0 mmol/L。最可能为

- A. 低血糖昏迷
- B. 高渗性昏迷
- C. 酮症酸中毒昏迷
- D. 脑血管意外
- E. 尿毒症昏迷

30. 男, 59 岁。2 型糖尿病 12 年。口服降血糖药物治疗, 空腹血糖 5.6 mmol/L, 餐后 2

小时血糖 14.6 mmol/L, 糖化血红蛋白 7.6%。3 年前眼底检查可见微血管瘤和出血, 近 2 月来视力明显减退, 眼底检查可见新生血管和玻璃体积血, 目前糖尿病视网膜病变已进展为

- A. II 期
- B. III 期
- C. IV 期
- D. V 期
- E. VI 期

31. 男, 45 岁。患糖尿病 10 余年, 尿蛋白阴性, 近 1 个月感下腹部胀, 排尿不畅伴尿失禁。B 超显示“膀胱扩大, 尿潴留”。其原因应考虑

- A. 糖尿病肾病
- B. 糖尿病合并泌尿系感染
- C. 糖尿病合并慢性前列腺炎
- D. 糖尿病自主神经病变
- E. 糖尿病合并泌尿系结石

32. 女性, 23 岁。诊断为 1 型糖尿病 5 年。近几日来, 感食欲减退、烦渴、多饮、多尿明显, 时有呕吐, 皮肤弹性差。实验室检查: 空腹血糖 24.7 mmol/L, 尿糖阳性, 酮体强阳性, 血碳酸氢根 14 mmol/L, 以下最合理治疗组合方案是

- A. 饮食控制
- B. 饮食控制+口服降糖药
- C. 饮食控制+中效胰岛素
- D. 长效胰岛素+口服降糖药
- E. 小剂量普通胰岛素加入生理盐水中, 平均 0.1 U/(kg·h), 持续静点

33. 男, 50 岁。肥胖, 2 型糖尿病 5 年, 口服二甲双胍 250 mg, 3 次/日。5 个月前因外伤发生左足溃疡至今未愈, 空腹血糖 7.2 mmol/L, 三餐后血糖分别为 9.2 mmol/L、8.7 mmol/L、8.6 mmol/L。控制糖尿病的最佳治疗方案应选择

- A. 增加二甲双胍剂量
- B. 加用胰岛素制剂
- C. 加用磺脲类口服降糖药
- D. 加用 α-葡萄糖糖苷酶抑制剂

- E. 加用噻唑烷二酮类药
34. 关于卵巢形态学特征, 说法正确的是
- A. 卵巢白膜是平滑肌组织  
B. 成年妇女卵巢重约 15 g  
C. 卵巢表面无腹膜  
D. 皮质内含血管、神经、淋巴管  
E. 髓质内含许多始基卵泡
35. 欲行全子宫加双附件切除, 不需要切断的韧带是
- A. 主韧带  
B. 卵巢固有韧带  
C. 卵巢悬韧带  
D. 阔韧带  
E. 圆韧带
36. 输卵管妊娠最常见的着床部位是在输卵管的
- A. 壶腹部与峡部连接部  
B. 壶腹部  
C. 峡部  
D. 伞部  
E. 间质部
37. 全子宫切除术时无需切断的韧带是
- A. 宫骶韧带  
B. 骨盆漏斗韧带  
C. 卵巢固有韧带  
D. 子宫圆韧带  
E. 子宫主韧带
38. 关于子宫峡部解剖学特点, 错误的是
- A. 非孕期长约 1 cm  
B. 子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分  
C. 上端为组织学内口  
D. 下端与子宫颈内腔相连  
E. 妊娠末期可达 7~10 cm
39. 关于子宫的解剖, 下列说法哪项是正确的
- A. 成年人子宫体与子宫颈的比例为 1:2  
B. 成年女性的子宫长 7~8 cm、宽 4~5 cm、厚 2~3 cm  
C. 子宫峡部的黏膜无周期性变化  
D. 子宫颈主要由平滑肌构成  
E. 成年妇女子宫颈管长 4~5 cm
40. 初孕妇, 26 岁。妊娠 38 周。查体: P 90 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg。叩诊心浊音界稍向左扩大, 心尖部闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音。踝部轻度水肿。最可能的诊断是
- A. 妊娠期高血压疾病性心脏病  
B. 风湿性心脏病合并妊娠  
C. 心脏病合并妊娠, 性质待查  
D. 正常妊娠改变  
E. 围生期心肌病
41. 以下哪项属于晚期妊娠
- A. 妊娠 25 周  
B. 妊娠 12 周  
C. 妊娠 27 周  
D. 妊娠 28 周  
E. 妊娠 26 周
42. 早期妊娠的确诊依据是
- A. 停经史  
B. 早孕反应  
C. 尿妊娠试验  
D. 黑加征  
E. B 型超声检查
43. 下面方法诊断妊娠最可靠的是
- A. 停经史、早孕反应、B 超见宫内光团  
B. 停经史、内诊子宫增大、B 超见宫内胎囊、胎芽、胎心、尿 hCG(+)  
C. 停经史、胎动感、腹部渐膨隆  
D. 停经史、早孕、内诊子宫增大、尿 hCG(+)  
E. 孕反应、内诊子宫增大、附件囊性小肿块、尿 hCG(+)
44. 胎儿能衔接入盆的关键径线是
- A. 坐骨棘间径  
B. 入口前后径  
C. 入口横径  
D. 坐骨结节间径  
E. 中骨盆前后径
45. 临产后正常宫缩起自

- A. 两侧宫角部
- B. 两侧子宫侧壁
- C. 宫颈部
- D. 子宫下段
- E. 宫底部

46. 临产的重要标志是

- A. 见红, 破膜, 规律宫缩
- B. 见红, 规律宫缩, 宫口扩张不明显
- C. 见红, 先露下降, 伴有尿频
- D. 规律宫缩, 破膜, 伴有见红
- E. 规律宫缩, 逐渐增强, 伴随进行性宫口扩张和先露下降

47. 已婚妇女, 26 岁。月经规律, 停经 30 天, 今晨出现一侧下腹痛伴肛门坠胀感, 血压 90/60 mmHg。该患者此时有诊断价值的体征是

- A. 子宫稍大变软
- B. 腹肌紧张
- C. 宫颈举痛, 后穹隆饱满
- D. 双合诊黑加征(+)
- E. 腹部移动性浊音(-)

48. 女, 28 岁。停经 40 天, 阴道少量出血伴右下腹隐痛 2 天。B 超宫腔未见明显妊娠囊, 首先考虑的是

- A. 月经
- B. 月经不调
- C. 闭经
- D. 先兆流产
- E. 异位妊娠

49. 女, 26 岁。停经 50 天, 左下腹胀痛不适 2 天, 肛门坠胀 1 天。平素月经规律。BP 90/60 mmHg。与诊断无关的体征是

- A. 子宫稍大变软
- B. 后穹隆饱满
- C. 宫颈软并着色
- D. 宫颈光滑
- E. 宫颈举痛

50. 26 岁未产妇, 停经 48 日后出现阴道少量流血伴右下腹隐痛。今晨起床时突然右下腹剧痛来院。检查: 血压 90/60 mmHg, 面色苍

白, 下腹稍膨隆, 右下腹压痛明显, 肌紧张不明显, 叩诊移动性浊音(±)。妇科检查: 子宫稍大稍软, 右附件区触及有压痛包块。恰当诊断应是

- A. 输卵管妊娠流产
- B. 输卵管峡部妊娠破裂
- C. 急性阑尾炎
- D. 急性输卵管炎
- E. 右侧卵巢肿瘤蒂扭转

51. 初孕妇, 28 岁。妊娠 37<sup>+</sup>4 周, 剧烈头痛并呕吐 3 次。查体: BP 170/110 mmHg, 尿蛋白(++), 双下肢轻度水肿。无宫缩, 枕右前位胎心率 138 次/分, 估计胎儿体重 2 800 g。该患者应立即采取的处理措施是

- A. 静脉滴注缩宫素
- B. 人工破膜后静滴缩宫素
- C. 静滴硫酸镁及快速静滴甘露醇
- D. 立即行剖宫术
- E. 肌肉注射哌替啶

52. 初孕妇, 25 岁。妊娠 37 周, 剧烈头痛并呕吐, 并自觉胎动少一天, 血压 160/110 mmHg, 尿蛋白(++), 胎心 130 次/分, 子宫颈管未消失, OCT 呈频繁晚期减速(迟发性减速), 血细胞比容 0.41。最合适的处理是

- A. 静滴硫酸镁及与胍屈嗪控制病情
- B. 硫酸镁加降压加扩容疗法控制病情
- C. 积极治疗, 48 小时未能控制病情则行剖宫产
- D. 破膜加静脉滴注缩宫素引产
- E. 积极药物治疗的同时立即剖宫产

53. 初孕妇, 29 岁, 妊娠 37 周。头痛 1 周, 今晨喷射性呕吐 1 次, 1 小时前突然抽搐并随即昏迷入院。查体: BP 180/120 mmHg。尿蛋白(+++)。该患者最可能的诊断是

- A. 子痫
- B. 脑出血
- C. 分离(转换)性障碍
- D. 癫痫
- E. 脑血栓形成

54. 26 岁风湿性心脏病患者, 现妊娠 45 天

出现心力衰竭,其处理原则应是

- A.立即行负压吸宫术终止妊娠
- B.控制心力衰竭后继续妊娠
- C.边控制心力衰竭边终止妊娠
- D.控制心力衰竭后行负压吸宫术
- E.控制心力衰竭后行钳刮术

55.24岁初孕妇,既往有风湿性心脏病病史,现妊娠40天,出现胸闷气短,轻微体力活动就感呼吸困难,最恰当的治疗措施应是

- A.控制心力衰竭后继续妊娠
- B.边控制心力衰竭边终止妊娠
- C.立即行负压吸宫术终止妊娠
- D.控制心力衰竭后行负压吸宫术
- E.控制心力衰竭后行钳刮术

56.经产妇,28岁。合并风湿性心脏病,现妊娠38周,心功能I级,规律宫缩7小时来院,枕左前位,胎心152次/分,估计胎儿3300g,宫口开大4cm,胎头=0,本例正确的处理措施是

- A.适当的镇静剂,阴道助产
- B.避免用力屏气加腹压,胎头吸引或产钳助产
- C.静滴缩宫素,尽可能缩短第一产程
- D.试产期间若是出现心衰症状,应立即剖宫产
- E.不行阴道试产,行剖宫产术结束分娩

57.初孕妇,既往风湿性心脏病、二尖瓣狭窄病史8年。平时不用药,登三楼无明显不适。孕5个月起活动时常有轻度心慌、气促。现孕38周,因心悸、咳嗽、夜间不能平卧、心功能III级而急诊入院。在制订治疗计划时,最恰当的方案是

- A.纠正心功能,等待自然临产
- B.积极控制心力衰竭,同时行剖宫产术
- C.积极控制心力衰竭,同时行引产术
- D.积极控制心力衰竭后终止妊娠
- E.适量应用抗生素后继续妊娠

58.初孕妇,25岁。妊娠40周,规律宫缩8小时,宫缩40~50秒/4~5分,检查胎心率140次/分,枕左前位,胎头双顶径10cm,先露0,宫口开大2cm,坐骨棘间径9cm。该患者

正确的处理是

- A.剖宫产
- B.肌肉注射哌替啶
- C.静脉滴注缩宫素
- D.继续观察产程进展
- E.静脉注射5%葡萄糖注射液

59.孕1产0,孕40周。枕左前位,临产16小时入院,胎心好,宫口开全,先露S-1,测坐骨结节间径7.0cm,出口后矢状径6cm。胎儿估计3100g,应选择

- A.静滴缩宫素加强宫缩
- B.胎吸术
- C.产钳术
- D.自然分娩
- E.剖宫产术

60.初产妇,26岁。妊娠39周,分娩过程中自觉下腹部持续疼痛,拒按,烦躁不安。产科检查:下腹部压痛,胎位触不清,胎心不规律,宫口停止扩张,胎先露部下降停止。诊断为“高张性宫缩乏力”,下列处理错误的是

A.处理原则是调节子宫收缩,恢复正常节律及其极性

- B.立即静脉注射缩宫素
- C.给予强镇静剂
- D.经上述处理未能得到纠正者,均应行剖宫产术
- E.若不协调宫缩已被控制,但宫缩仍弱,可静脉滴注缩宫素

61.初产妇,宫口开全1.5小时,胎头已达盆底,持续性左枕横位。处理应是

- A.等其自然回转
- B.催产素静脉滴注
- C.人工协助顺时针转90°
- D.人工协助逆时针转90°
- E.行会阴后一斜切开术

62.属于子宫破裂的临床表现,正确的是

- A.病理性缩复环不再升高
- B.产妇突感子宫收缩停止
- C.产妇疼痛难忍
- D.胎体触不清

E.阴道多量鲜血流出

63.产后出血是指阴道流血量在胎儿娩出后 24 小时内超过

- A.300 mL
- B.400 mL
- C.500 mL
- D.600 mL
- E.700 mL

64.女,54 岁。白带增多,均匀稀薄,有臭味,阴道黏膜无明显充血,阴道 pH 为 5,线索细胞阳性。最可能的诊断是

- A.急性淋病
- B.细菌性阴道病
- C.滴虫阴道炎
- D.外阴阴道念珠菌病
- E.老年性阴道炎

65.女,48 岁。外阴瘙痒伴灼热感 3 天。妇科检查见外阴红肿、小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色凝乳状物覆盖。该患者首先考虑为

- A.前庭大腺炎
- B.淋菌性阴道炎
- C.外阴阴道假丝酵母菌病
- D.滴虫阴道炎
- E.细菌性阴道病

66.女,55 岁。糖尿病史 7 年,外阴瘙痒、灼痛 1 个月余,白带无异味。妇科检查:阴道黏膜充血,白带多,呈凝乳块状。本例最可能的诊断是

- A.细菌性阴道病
- B.老年性阴道炎
- C.外阴硬化性苔藓
- D.非特异性外阴炎
- E.外阴阴道念珠菌病

67.11 岁小儿腕部骨化中心应有

- A.8 个
- B.9 个
- C.10 个
- D.11 个
- E.12 个

68.小儿神经发育正确的是

- A.生后 1 个月,出现拥抱反射
- B.生后 2 个月,出现握持反射
- C.3~4 个月以下,克尼格征可阳性
- D.1 岁以内腹壁反射容易引发
- E.2 岁以下,巴宾斯基征应为阴性

69.青春期生长发育的最大特点是

- A.神经发育成熟
- B.体格生长
- C.内分泌调节稳定
- D.生殖系统迅速发育,并渐趋成熟
- E.水和蛋白质的需要量最大

70.重度营养不良患儿调整饮食,每日开始供给的热量应是

- A.80~100 kcal/kg
- B.60~80 kcal/kg
- C.40~60 kcal/kg
- D.60~100 kcal/kg
- E.70~80 kcal/kg

71.最易并发维生素 A 缺乏症的是

- A.幼儿急疹
- B.麻疹
- C.川崎病
- D.风疹
- E.咽结合膜热

72.与牛奶相比较,母乳的优点是

- A.蛋白质总量多
- B.饱和脂肪酸较多
- C.乳糖量多
- D.含钙、磷高
- E.缓冲力大,对胃酸中和作用强

73.儿童蛋白质-能量营养不良的诱发因素中,最常见的疾病是

- A.长期发热
- B.急、慢性传染病
- C.恶性肿瘤
- D.肠道寄生虫病
- E.消化系统疾病或先天畸形

74.患儿,女。孕 38 周产,出生体重 2.3 kg,生后 8 天因拒食、反应差就诊。查体:体温不

升,皮肤、巩膜中度黄染,双下肢外侧皮肤硬肿。肝肋下3 cm,脾肋下1 cm。实验室检查:血WBC  $25 \times 10^9/L$ ,N 0.75,ALT 20 U/L。最可能的诊断是

- A.足月新生儿,新生儿肝炎
- B.极低出生体重儿,新生儿肝炎
- C.早产儿,新生儿败血症
- D.早产儿,新生儿败血症,新生儿肝炎
- E.足月新生儿,新生儿败血症

75.患儿,男,3天。不吃、不哭、反应差,肛温 $33^\circ\text{C}$ ,双下肢皮肤硬肿,暂不能进食,需经静脉给予热量补充,初始量每日为

- A.40 kcal/kg
- B.60 kcal/kg
- C.80 kcal/kg
- D.50 kcal/kg
- E.70 kcal/kg

76.患儿,女,出生30小时。出现嗜睡伴肌张力低下,初步诊断为缺氧缺血性脑病。为了解患儿丘脑、基底核有无病灶,应首选的检查是

- A.头颅CT
- B.脑电图
- C.颅脑透光试验
- D.B超
- E.头颅MRI

77.足月新生儿,生后2~3天,巩膜、皮肤明显黄染。查血清总胆红素 $10\text{ mg/dl}$ ,结合胆红素 $1\text{ mg/dl}$ ,精神、食欲一般,肝右肋下2 cm。可能的诊断是

- A.新生儿败血症
- B.新生儿溶血病
- C.新生儿胆汁淤积症
- D.新生儿生理性黄疸
- E.新生儿肝炎综合征

78.患儿,2岁。因体格智力发育落后来诊。体检:表情呆滞,两眼距宽,两眼外侧上斜,鼻梁低平,舌常伸出口外,通贯手。该患儿诊断考虑为

- A.苯丙酮尿症

- B.21-三体综合征
- C.18-三体综合征
- D.呆小病
- E.粘多糖病

79.某患儿诊断为易位型唐氏综合征,其母亲为D/G平衡易位,则二胎的风险率为

- A.10%
- B.20%
- C.1%
- D.100%
- E.50%

80.患儿,男,2岁。出生时正常,3个月后皮肤和头发色泽逐渐变浅。目前不会独站,不会说话,偶有抽搐,身上有怪臭味。有助于诊断的检查是

- A.脑电图
- B.血钙测定
- C.尿三氯化铁试验
- D.尿甲苯胺蓝试验
- E.血镁测定

81.患儿,男,5岁。高热7天,皮肤黏膜损害3天入院。体检:热病容,反应良好,结膜充血,唇和口腔黏膜发红、干裂。右颈淋巴结可触及1个约 $2\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ 大小的肿块。全身红色斑丘疹,手足微肿胀。心、肺无异常,肝、脾不大。血WBC  $18 \times 10^9/L$ ,血培养阴性。首先考虑的诊断是

- A.败血症
- B.幼年型特发性关节炎
- C.系统性红斑狼疮
- D.川崎病
- E.风湿热

82.6个月女婴。发热3天,T $39.2^\circ\text{C}$ 。查体:一般情况良好,咽充血,耳后淋巴结肿大,心肺无异常,肝脾未触及。患儿退热后,躯干部出现红色斑丘疹。可能的诊断是

- A.风疹
- B.麻疹
- C.水痘
- D.猩红热



## E. 幼儿急疹

83. 患儿,男,2岁。发热、流涕、咳嗽3天,今晨前额及耳后出现浅红色斑丘疹,球结膜充血,口腔黏膜粗糙,声音嘶哑,精神萎靡。两肺呼吸音粗。最可能的诊断是

- A. 川崎病
- B. 风疹
- C. 猩红热
- D. 幼儿急疹
- E. 麻疹

84. 患儿,男,5岁。高热1天,腹泻6~7次,为黏液脓血便,腹痛伴里急后重,反复惊厥,逐渐出现昏睡、神志不清,病前吃过未洗的黄瓜,诊断为细菌性痢疾。其临床类型属于

- A. 重型
- B. 轻型
- C. 普通型
- D. 中毒型
- E. 慢性型

85. 患儿,男,4岁。体温39℃,发热半天后即出疹,1天布满全身,密集而均匀的红色细小丘疹。面部潮红,不见皮疹,口唇周围发白,有咽痛,扁桃体充血、水肿。该患儿最可能的诊断是

- A. 幼儿急疹
- B. 猩红热
- C. 麻疹
- D. 风疹
- E. 水痘

86. 患儿,4岁。发热、头痛、皮疹12小时,频繁抽搐、昏迷2小时入院。查体:全身皮肤可见散在的瘀点、瘀斑,血压测不出,右侧瞳孔散大,对光反应消失。不应立即进行的检查是

- A. 瘀点涂片检菌
- B. 脑脊液检查
- C. 血常规检查
- D. 血气分析
- E. 血清离子检测

87. 小儿原发型肺结核出现类似百日咳样痉挛性咳嗽,是由于胸内淋巴结高度肿大,

压迫

- A. 气管
- B. 气管杈
- C. 支气管
- D. 细支气管
- E. 喉返神经

88. 下列哪项不是预防小儿结核病的措施

- A. 普及卡介苗接种
- B. 积极预防小儿急性传染病
- C. 与开放性肺结核患者密切接触者应预防性服药
- D. 隔离和积极治疗开放性结核患者
- E. 先天性胸腺发育不全患者更应接种卡介苗

预防性服药

D. 隔离和积极治疗开放性结核患者

E. 先天性胸腺发育不全患者更应接种卡介苗

卡介苗

89. 抗结核药中具有杀菌能力的为

- A. 异烟肼、利福平、乙胺丁醇
- B. 异烟肼、链霉素、乙胺丁醇
- C. 异烟肼、吡嗪酰胺、氨硫脲
- D. 异烟肼、利福平、链霉素
- E. 异烟肼、利福平、乙硫异烟胺

90. 患儿,女,25天。无明显原因反复惊厥发作3次。首选的止惊药物是

- A. 地西泮
- B. 苯巴比妥
- C. 苯妥英钠
- D. 异丙嗪
- E. 硫喷妥钠

91. 患儿,9个月。诊断为流感嗜血杆菌脑膜炎,经抗生素治疗一周后,病情好转,体温正常,近2天又出现发热、搐搦、前囟饱满、颅缝分离。应首先考虑的诊断是

- A. 脑膜炎复发
- B. 脑膜炎后遗症
- C. 脑脓肿
- D. 脑水肿
- E. 硬脑膜下积液

92. 患儿,1岁。已诊断为“化脓性脑膜炎”,曾用青霉素加氯霉素治疗一周,病情好转,体温正常,近3天来又出现发热、抽搐。查体:前囟紧张。脑脊液检查示:外观清亮,白细胞

$12 \times 10^9 / L$ , 蛋白  $450 \text{ mg} / L$ , 氯化物  $110 \text{ mmol} / L$ , 糖  $4.0 \text{ mmol} / L$ 。应首先考虑的诊断是

- A. 脑膜炎复发
- B. 硬脑膜下积液(脓)
- C. 脑水肿
- D. 脑脓肿
- E. 脑膜炎后遗症

93. 男, 40 岁。渐起走路不稳 2 年, 有共济失调障碍, 步幅加宽, 左右摇摆。最可能受损的部位是

- A. 小脑半球
- B. 小脑蚓部
- C. 丘脑
- D. 延髓
- E. 大脑半球

94. 患者, 男性, 61 岁。右面部发作性剧痛 2 年, 疼痛自上唇始, 延至外眦下方, 每次持续数秒钟, 讲话、进食和洗脸可诱发, 无神经系统体征。最可能的诊断是

- A. 偏头痛
- B. 鼻窦炎
- C. 三叉神经痛
- D. 蝶腭神经痛
- E. 非典型面痛

95. 女性, 59 岁。高血压史 6 年, 日前感觉右耳后疼痛, 翌日晨洗脸、漱口时发现右嘴角流口水, 右眼闭合不全, 口角偏左, 右额纹消失。最可能的诊断是

- A. 右耳大神经痛
- B. 左侧面神经麻痹
- C. 右侧面神经麻痹
- D. 多颅神经炎
- E. 脑卒中

96. 男, 25 岁。头部摔伤, 着力点位于右侧颞枕, 就医时出现“熊猫眼”征, 鼻孔流出血性液体。最可能的诊断是

- A. 脑震荡
- B. 双眼眼睑挫伤
- C. 双侧视神经损伤
- D. 双眼结膜出血

E. 颅底前窝骨折

97. 男, 20 岁。脑外伤后, 双眼睑皮下和球结膜下出血, 鼻腔流出血性脑脊液。临床诊断最大可能是

- A. 颅顶骨凹陷性骨折
- B. 颅底前窝骨折
- C. 颅底中窝骨折
- D. 颅底后窝骨折
- E. 颅盖骨骨折

98. 从 3 米处跌落, 昏迷 20 分钟后头痛、恶心、呕吐 3 小时又昏迷, 怀疑为

- A. 脑挫伤
- B. 硬脑膜外血肿
- C. 脑硬膜下血肿
- D. 蛛网膜下腔血肿
- E. 脑疝

99. 患者, 女性, 50 岁。头部棍击伤, 无昏迷史及意识障碍, 无颅骨骨折, 1 个月后可出现颅内压增高症状, 最可能的诊断为

- A. 慢性硬膜外血肿
- B. 多发颅内血肿
- C. 慢性硬膜下血肿
- D. 急性颅内血肿
- E. 脑震荡后遗症

100. 患者, 女性, 30 岁。头部受伤后昏迷半小时, 清醒后左侧肢体力弱, 腰穿发现血性脑脊液, 以后逐渐好转, 最可能为

- A. 脑内血肿
- B. 脑挫伤
- C. 急性硬膜外血肿
- D. 脑震荡
- E. 急性硬膜下血肿

101. 行胃大部切除的患者不会发生的功能变化是

- A. 维生素  $B_{12}$  的吸收减少
- B. 食物蛋白的消化减弱
- C. 胃蛋白酶原的分泌减少
- D. 胰液中  $\text{HCO}_3^-$  的分泌减少
- E. 铁的吸收减少

102. 女, 40 岁。双侧乳腺月经前明显胀

痛,月经后可自行缓解。乳腺超声提示双侧乳腺多发小结节,大小约 0.4 cm,无明显血流信号,双侧腋窝未见肿大淋巴结。最可能的诊断是

- A. 乳腺结核
- B. 乳腺囊性增生病
- C. 非哺乳期乳腺炎
- D. 乳腺癌
- E. 乳腺纤维腺瘤

103. 女,76 岁。1 小时前被家属发现意识不清急送入院。有慢性阻塞性肺疾病病史 20 年,近 1 周来嗜睡。查体:BP 150/90 mmHg,昏迷,球结膜水肿,口唇发绀,双下肺可闻及湿啰音。该患者最可能的诊断是

- A. 左心衰竭
- B. 肺性脑病
- C. 感染中毒性脑病
- D. 脑梗死
- E. 电解质紊乱

104. 男,48 岁。突发心悸,喘憋 1 小时,既往有扩张型心肌病,慢性心力衰竭病史。窦性心动过缓 5 年,心率 50~60 次/分。接诊时查体:T 36.3℃,P 94 次/分,BP 150/70 mmHg,心率 160 次/分,心律不齐,S<sub>1</sub>强弱不等,双肺可闻及湿性啰音。该患者喘憋的最可能的诱因是

- A. 肌炎
- B. 过敏
- C. 心房颤动
- D. 电解质紊乱
- E. 感染

105. 12 个月小儿重度脱水第一天补液总量为

- A. 900~1 200 mL
- B. 1 200~1 500 mL
- C. 1 500~1 800 mL
- D. 1 600~1 900 mL
- E. 1 300~1 600 mL

106. 胃底切除后将引起下列哪项吸收障碍

- A. 维生素 A
- B. 维生素 B<sub>12</sub>
- C. 维生素 C
- D. 维生素 B<sub>1</sub>
- E. 维生素 B<sub>6</sub>

107. 关于婴儿溢奶下列说法正确的是

- A. 与胃幽门括约肌松弛有关
- B. 与胃幽门括约肌紧张有关
- C. 与胃贲门括约肌紧张有关
- D. 是一种病理现象
- E. 以上说法均不正确

108. 男,70 岁。上腹痛 1 年,进食后加重,大便 10 次/天,可见脂肪滴,查体:中腹部压痛(+),腹部 B 超,胰腺多发钙化灶。应给予的药物是

- A. 解痉止痛药物
- B. 胰酶制剂
- C. 消炎利胆药物
- D. 钙离子阻滞剂
- E. 质子泵抑制剂

109. 男,30 岁。间断黏液脓血便 10 年,抗生素治疗效果不佳,肠镜示:乙状结肠及直肠黏膜广泛充血糜烂,病理检查可见隐窝脓肿。首选的治疗药物是

- A. 蒙脱石散
- B. 地衣芽孢杆菌制剂
- C. 小檗碱
- D. 5-氨基水杨酸
- E. 左氧氟沙星

110. 男,71 岁。咳嗽,咳痰 20 年,气短 2 天,高血压病史 20 年,查体:T 37.5℃,BP 150/90 mmHg,半坐位,口唇发绀,呼吸相延长,双肺可闻及干湿性啰音,心界向左下扩大,心率 120 次/分,律齐。为改善患者的临床症状,下列药物应首选的是

- A. 毛花苷丙
- B. 氨茶碱
- C. 肾上腺素
- D. 吗啡
- E. 呋塞米

111. 脑出血的内科治疗最重要的是
- A. 控制脑水肿
  - B. 给予止血剂
  - C. 降低血压
  - D. 抗生素治疗
  - E. 给氧
112. 短暂性脑缺血发作重要的预防性治疗药物是
- A. 钙拮抗剂
  - B. 脑血管扩张剂
  - C. 溶栓剂
  - D. 抗凝剂
  - E. 抗血小板聚集剂
113. 供给大脑半球前 3/5 部血液的血管是
- A. 大脑前动脉
  - B. 大脑中动脉
  - C. 颈内动脉系统
  - D. 椎基底动脉系统
  - E. 前交通动脉
114. 一侧颈内动脉闭塞, 可无临床症状, 是因为
- A. 同侧颈外动脉未闭塞
  - B. 对侧颈内动脉未闭塞
  - C. 正常脑底动脉环可迅速建立侧支循环
  - D. 双侧椎动脉未闭塞
  - E. 颅内血管变异
115. 不属于椎基底动脉系统 TIA 的症状有
- A. 短暂性全面性遗忘症
  - B. 闪光暗点
  - C. 交叉性瘫痪
  - D. 复视
  - E. 共济失调
116. 患者, 男性, 47 岁。HBsAg 阳性 20 年, 乏力、食欲缺乏、尿黄 7 天。查体: 巩膜黄染, 肝肋下 2 cm, 质软。实验室检查: ALT 460 U/L, TBIL 84 mmol/L, HBV-DNA  $1.2 \times 10^6$  拷贝/mL, 抗 HAV-IgM(-), 抗 HEV(-), 抗 HCV(-)。最重要的治疗药物是
- A. 核苷(酸)类似物
  - B. 护肝药物
  - C. 退黄药物
  - D. 干扰素
  - E. 利巴韦林
117. 患者, 女性, 40 岁。体检发现 HBsAg(-), 抗-HBs(+), ALT 20 U/L。最可能的情况是
- A. 感染过 HBV, 已开始恢复
  - B. 感染过 HBV, 已产生免疫力
  - C. 体内有病毒复制
  - D. 有传染性
  - E. 病毒携带者但无传染性
118. 患者, 女性, 20 岁。1 周来发热、乏力、食欲缺乏、恶心、厌油。1 天来眼发黄, 但体温已正常。ALT 1 600 U/L, TBIL 12 mmol/L, DBIL 65 mmol/L, AFP < 25 mg/L, 血 WBC  $4.2 \times 10^9$ /L。最可能的诊断为
- A. 急性黄疸型肝炎
  - B. 急性胆囊炎
  - C. 慢性胆囊炎、胆石症
  - D. 钩端螺旋体病
  - E. 肝癌
119. 患者, 男性, 35 岁, 浙江人。1 个月前因捕鱼着凉, 近日发热, T 38.5 °C, 腹泻稀便。查体: 无欲外观, 周身可见荨麻疹, 无黄疸, 肝肋下 1.0 cm, 脾肋下 2.0 cm。实验室检查: 血 WBC  $15 \times 10^9$ /L, 嗜酸性粒细胞 40%。其最可能的诊断是
- A. 伤寒
  - B. 副伤寒
  - C. 阿米巴肝脓肿
  - D. 急性血吸虫病
  - E. 粟粒性结核
120. 患者, 男性。12 月份发病, 表现为畏寒、寒战、高热、大汗而后缓解, 隔日发作 1 次已一周。血 WBC  $5.0 \times 10^9$ /L; N 0.68, L 0.32, Hb 100 g/L, 血培养(-)。患者同年 8 月份曾往海南旅游 15 天。最可能的原因是
- A. 伤寒
  - B. 疟疾

- C.急性血吸虫病
- D.败血症
- E.结核

121.患者,男性,25岁。腹痛、腹泻半个月。大便4~8次/天,便量多,为暗红色,有腥臭味,肉眼可见血液及黏液,患者无发热,左下腹隐痛。大便镜检:白细胞10~15个/HP,红细胞满视野。该患者最可能的诊断是

- A.细菌性痢疾
- B.肠伤寒合并肠出血
- C.阿米巴痢疾
- D.溃疡性结肠炎
- E.疟疾

122.骨折的专有体征是

- A.疼痛不适与压痛
- B.功能障碍
- C.肿胀与瘀斑
- D.骨擦音和骨擦感
- E.活动受限

123.青枝骨折最主要的体征是

- A.局部肿胀与瘀斑
- B.畸形
- C.骨擦感
- D.局部压痛和间接压痛
- E.反常活动

124.运动系统最基本的检查方法是

- A.X线
- B.CT
- C.MRI
- D.物理学检查
- E.PET

125.骨折引起脂肪栓塞的原因是

- A.患者肥胖
- B.脂肪肝
- C.骨筋膜室压力过高
- D.创伤的应激作用
- E.骨密度过高

126.骨折X线检查的重要意义下列哪项不对

- A.明确骨折的诊断
- B.了解骨折类型及移位情况
- C.了解骨折的发生机制

- D.了解骨折的复位情况及有无再移位
- E.了解骨折的愈合情况

127.男,19岁。右股骨远端外侧无明显诱因发现骨性包块半年,今日包块增大较快并出现局部疼痛,表面无明显红肿、皮温不高。X线显示骨性突起与骨干相连,远端可见不规则钙化。正确的治疗是

- A.继续观察
- B.非甾体抗炎药
- C.放射治疗
- D.手术切除
- E.刮出植骨

128.30岁男性,股骨下端疼痛,膝关节活动轻微受限。查体:股骨下端偏外侧局限性隆起,压痛。X线片:股骨外侧髁可见偏心性生长的骨吸收病灶,皮质向外膨隆变薄,无骨膜反应。诊断为

- A.骨纤维异样增殖症
- B.骨巨细胞瘤
- C.嗜酸性肉芽肿
- D.内生软骨瘤
- E.骨囊肿

129.学生,19岁。右股骨下端疼痛1个月,夜间尤甚。查体:右股骨下端偏内侧局限性隆起,皮温略高,皮肤浅静脉怒张,明显压痛,膝关节运动受限。X线片示股骨下端干骺端溶骨性骨破坏,边界不清,可见Godman三角。诊断为

- A.软骨肉瘤
- B.骨纤维肉瘤
- C.骨肉瘤
- D.骨巨细胞瘤
- E.尤文肉瘤

130.患者,男性,19岁。9个月前开始左上臂肿胀、疼痛不适,诊断为左肱骨上端骨肉瘤,优选的治疗措施是

- A.化学治疗
- B.化学治疗+放射治疗
- C.右肩关节离断术
- D.肿瘤刮除术
- E.术前化学治疗+根治性手术+术后放射治疗

131.患者,女性,54岁。诊断为胃癌, BP 159/99 mmHg,中度贫血,消瘦,术前无须准备的项目是

- A.纠正贫血
- B.改善营养状态
- C.检测肝功能
- D.血压降至正常
- E.血生化检查

132.女,67岁。2型糖尿病史20年。二甲双胍0.25g及格列齐特80mg,每日3次,糖尿病控制良好。近2个月感乏力,体重下降4~5kg。肠镜检查发现乙状结肠癌,拟行手术治疗。围术期糖尿病处理

- A.停用降糖药、减少饮食物
- B.改用长效胰岛素
- C.改用短效胰岛素
- D.胰岛素及胰岛素增敏剂联合治疗
- E.术后给予抗生素

133.男,18岁。因急性阑尾炎穿孔行阑尾切除术,术后3天切口红肿,有脓性分泌物,将缝线拆除后引出20mL脓液,10天后再次缝合而愈合,该患者切口愈合类型应记为

- A.Ⅱ/乙
- B.Ⅱ/丙
- C.Ⅲ/甲
- D.Ⅲ/乙
- E.Ⅲ/丙

134.择期胃手术1周后腹胀,肠鸣音减弱或无,反复呕吐,首先应采取的治疗措施是

- A.做胃镜检查,查明原因
- B.胃肠减压,支持治疗
- C.剖腹检查,解除梗阻
- D.输液、补钾
- E.抗生素

135.患者,男性,31岁。背部肿块,红、肿、疼痛3天,寒战、发热39℃,查体:背部有肿物3cm×5cm,波动感明显。当病灶做局部引流和全身应用抗生素后,仍有寒战、高热,最好

- A.联合应用抗生素,并加大剂量
- B.尽快明确细菌种类和药敏试验
- C.寻找有无其他感染病灶
- D.使用抗真菌药物治疗

E.加用肾上腺皮质激素

136.女,65岁。颈后部皮肤红肿7天。初起时为小片皮肤硬肿,约3cm×2cm,有多个脓点,随后皮肤肿胀范围增大,出现浸润性水肿,局部疼痛加重,表面皮肤呈青紫褐色,范围约6cm×5cm, T 38.9℃,来院就诊,拟手术治疗,不正确的处理方法是

- A.清除化脓或失活的组织
- B.切口线应超过病变边缘
- C.不可一期缝合切口
- D.切口内可填塞纱条
- E.沿皮纹行一横行切口

137.男性,30岁。左下肢局部皮肤红、肿、热、痛、中央部缺血坏死流出脓液稀薄,粉红色,其致病菌是

- A.金黄色葡萄球菌
- B.β溶血性链球菌
- C.大肠杆菌
- D.绿脓杆菌
- E.变形杆菌

138.男,18岁。右足和右小腿被开水烫伤,有水疱伴剧痛。创面基底部肿胀发红,该患者烧伤面积和深度的诊断为

- A.5%,浅Ⅱ°
- B.5%,深Ⅱ°
- C.10%,浅Ⅱ°
- D.10%,深Ⅱ°
- E.15%,浅Ⅱ°

139.患者,女性,43岁。烧伤总面积35%,其中Ⅲ°烧伤面积10%。该患者属于烧伤的类型是

- A.轻度烧伤
- B.中度烧伤
- C.重度烧伤
- D.特重烧伤
- E.小面积烧伤

(140~141题共用题干)

女,30岁。持续发热10天。查体:精神萎靡,反应淡漠,体温39.5℃,心率100次/分,肝肋下未触及,脾肋下2cm。实验室检查:血WBC  $1.4 \times 10^9/L$ ; N 60%, L 40%,肥达反应“O”抗体1:80(+),“H”抗体1:160(+),

ALT 180U/L,总胆红 22.2 mmol/L。

140.该病例最可能的诊断是

- A.急性黄疸型肝炎
- B.钩端螺旋体病
- C.伤寒
- D.斑疹伤寒
- E.疟疾

141.为确诊应首先检查的项目是

- A.血培养
- B.骨髓培养
- C.外斐反应
- D.肝炎病毒血清学检测
- E.血常规

(142~144 题共用题干)

男,30岁。咽痛、咳嗽、发热,2周后发现尿色红,眼睑水肿,尿量 1000 mL/24h。体检:全身皮肤未见皮疹,血压 150/100 mmHg。化验:尿蛋白(++),红细胞 50~60/HP,血白蛋白 32 g/L,血肌酐 123  $\mu\text{mol/L}$ 。

142.上述临床表现最可能的诊断是

- A.急性链球菌感染后肾炎
- B.急性肾盂肾炎
- C.过敏性紫癜
- D.系统性红斑狼疮
- E.急性肾小管坏死

143.该患者的治疗,错误的是

- A.控制血压
- B.消肿
- C.低盐饮食
- D.抗生素
- E.补充白蛋白

144.按上述治疗 2 个月后,病情无好转,血肌酐 300  $\mu\text{mol/L}$ ,对诊断最有价值的进一步检查是

- A.清洁中段尿培养
- B.肾穿刺活检
- C.肾脏 ECT
- D.肾脏 B 型超声

E.静脉肾盂造影

(145~146 题共用题干)

患者,27岁,已婚妇女。停经 75 日,阴道中等量流血 4 日伴发热。昨日阴道排出一块肉样组织,今晨突然大量阴道流血。查 BP 80/60 mmHg,T 38.2  $^{\circ}\text{C}$ ,P 116 次/分。子宫如近妊娠 2 个月大,有压痛,宫口通过一指松,阴道分泌物明显臭味。血 WBC  $20.5 \times 10^9/\text{L}$ ,Hb 68 g/L。

145.该患者最可能的主要诊断是

- A.急性盆腔炎
- B.不全流产合并感染
- C.流产
- D.宫外孕合并感染
- E.难免流产

146.除抗休克外,还需进行的紧急处理是

- A.大量输液、输血
- B.注射宫缩剂
- C.抗生素大剂量静滴
- D.钳夹出宫腔内妊娠物
- E.立即进行彻底清宫

(147~148 题共用备选答案)

- A.无痛性肉眼血尿
- B.终末血尿伴膀胱刺激症状
- C.排尿突然停止
- D.疼痛伴血尿
- E.血尿+蛋白尿

147.泌尿系肿瘤血尿是

148.泌尿系结石血尿是

(149~150 题共用备选答案)

- A. TRAb
- B. TT<sub>3</sub>、TT<sub>4</sub>
- C. FT<sub>3</sub>、FT<sub>4</sub>
- D. rT<sub>3</sub>

E.甲状腺摄<sup>131</sup>I 率

149.诊断甲亢的首选实验室检查是

150.甲亢内科治疗停药首选实验室检查是

# 模拟试卷参考答案

## 第一单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	A	E	A	D	D	E	D	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	E	D	B	A	E	C	A	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	A	C	C	C	B	A	D	B	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	A	A	D	C	D	C	C	E	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	E	D	E	C	B	B	B	D	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	E	A	A	E	A	A	D	B	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
B	C	B	E	B	B	E	E	D	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	D	E	E	C	C	A	C	C	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	A	B	A	A	B	E	C	B	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A	B	A	D	B	C	A	C	B	A
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	B	C	B	B	A	A	C	B	D
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	A	E	A	B	D	C	B	C	B



121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
E	C	B	B	D	A	A	C	D	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D	B	A	D	C	E	B	D	D	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	A	A	B	D	C	A	C	A	D

## 第二单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	E	C	E	E	D	E	D	D	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	C	D	A	D	E	D	C	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	A	A	B	C	C	A	A	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	E	B	C	B	B	B	C	B	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	E	B	B	A	E	C	E	D	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	E	A	D	A	C	D	A	E	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	B	C	B	C	E	C	C	D	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	C	E	E	D	D	D	B	A	C
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
D	E	E	D	B	B	B	E	D	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
E	B	B	C	C	E	B	B	C	B

101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	B	B	C	C	B	B	B	D	B
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	E	C	C	B	A	B	A	D	B
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
C	D	D	D	C	C	D	B	C	E
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D	C	E	B	C	E	B	C	C	C
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A	A	E	B	B	D	A	D	C	A

金英杰医学教育