

2 0 2 1 中 医 执 业 医 师 考 试

模拟密押卷

2021 年
中医执业医师
资格考试专用

(第一单元)

- 足太阴脾经与手少阴心经的交接位置是A. 胸中 B. 肺中 C. 心中 D. 目内眦E. 足大趾
- 五脏藏五神，肾藏A. 魄 B. 志 C. 魂 D. 神 E. 意
- 以下病机中是以阴阳失调来阐释实热或实寒的是A. 阴阳偏盛 B. 阴阳格拒 C. 阴阳偏衰 D. 阴阳互损 E. 阴阳离决
- 阴中求阳的治法适用于A. 阳盛 B. 阴阳两虚 C. 阴虚 D. 阳虚 E. 阴盛
- 木为火之所胜 A. 所不胜 B. 相克 C. 母 D. 子 E. 所胜
- 具有“五脏六腑之海”之称的是A. 督脉 B. 任脉 C. 冲脉 D. 带脉 E. 维脉
- 以下属于奇经八脉生理功能的是A. 加强了十二经脉中互为表里的两经之间的联系 B. 主束骨而利机关 C. 调节十二经脉的气血 D. 分主一身左右之阴阳 E. 加强了足三阴、足三阳经脉与心脏的联系
- 以下病机哪项是以阴阳失调来阐释真寒假热或真热假寒的A. 阴阳互损 B. 阴阳离决 C. 阴阳偏盛 D. 阴阳偏衰 E. 阴阳格拒
- 足手阴经的交接部位是A. 肩胛部 B. 头面部 C. 胸部 D. 背部 E. 四肢部
- 冲脉的基本功能是A. 调节阳经气血 B. 调节阴经气血 C. 调节十二经气血D. 维系全身经脉 E. 主司下肢运动
- 肾在志为A. 怒 B. 喜 C. 思 D. 悲 E. 恐
- “将军之官，谋虑出焉”指的脏腑是A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 肝 E. 肾
- 外感六淫中易伤阳气的是A. 风邪 B. 寒邪 C. 暑邪 D. 火邪 E. 燥邪

14. 五行指导脏腑用药，赤色、苦味入
- A. 心
 - B. 脾
 - C. 肺
 - D. 肝
 - E. 杏苏散
15. 元气生成的主要物质来源是
- A. 肾中精气
 - B. 水谷精气
 - C. 清气
 - D. 脏腑精气
 - E. 经气
16. 脾主升清的确切含义是
- A. 脾以升为健
 - B. 脾气散精，上归于肺
 - C. 脾的阳气主升
 - D. 输布津液防止水湿内生
 - E. 与胃的降浊相对而言
17. “阴阳离决，精气乃绝”，反映了
- A. 阴阳转化
 - B. 阴阳互藏
 - C. 阴阳消长
 - D. 阴阳互根
 - E. 阴阳对立
18. 起病隐缓，病程较长，反复发作，或缠绵难愈为湿邪哪方面致病特点
- A. 湿为阴邪，易伤阳气
 - B. 湿为阴邪，湿性重浊
 - C. 湿性黏滞，易阻气机
 - D. 湿性趋下，易袭阴位
 - E. 湿邪为患，其性重浊
19. 具有藏泄互用关系的两脏是
- A. 肝与脾
 - B. 肝与肾
 - C. 肺与肝
 - D. 肝与心
 - E. 脾与肾
20. “至虚有盛候”的证候性质为
- A. 实中夹虚
 - B. 虚中夹实
 - C. 真虚假实
 - D. 真实假虚
 - E. 虚实夹杂
21. 瘀血的疼痛特点叙述正确的是
- A. 多为胀痛
 - B. 痛处游走不定
 - C. 病在气分
 - D. 夜间痛甚
 - E. 遇温痛减
22. 与生俱来的感知觉和运动能力概括为A.
- 神
 - B. 魂
 - C. 魄
 - D. 意
 - E. 志
23. 与血液的运行密切相关的脏腑
- A. 心、肺、肾、脾
 - B. 心、肺、肝、脾
 - C. 心、肾、肝、脾
 - D. 心、肺、肝、肾
 - E. 肾、肺、肝、脾
24. 与气机升降调节关系密切的两脏是
- A. 心与肺
 - B. 心与肾
 - C. 肺与脾
 - D. 脾与肝
 - E. 肺与肝
25. 阴气不足，可见于五脏六腑，其最主要的
- 是
 - A. 心阴虚
 - B. 脾阴虚
 - C. 肾阴虚
 - D. 胃阴虚
 - E. 肝阴虚
26. 栝蒌薤白白酒汤证的病机是
- A. 胸阳不振，水饮上乘
 - B. 痰涎壅盛，胸中痹阻
 - C. 寒饮内停，逆而上冲
 - D. 中阳不足，寒凝气滞
 - E. 饮邪上乘，胸中气滞
27. “温邪上受”中“上受”是指
- A. 温邪上犯头目
 - B. 温邪从口鼻侵入
 - C. 温邪直入心包
 - D. 温邪邪郁肺卫
 - E. 温邪蒙蔽上焦
28. 不属于温病卫分证的是
- A. 风热

- B. 风寒
- C. 湿热
- D. 暑热
- E. 燥热

29. 治疗湿温初起，三大禁忌包括

- A. 禁润
- B. 禁清
- C. 禁吐
- D. 禁消
- E. 禁补

30. 太阳病，关节疼痛而烦，脉沉而细，此名

- A. 湿痹
- B. 风寒痹
- C. 热痹
- D. 风痹
- E. 寒痹

31. 溢饮的病机是

- A. 饮停胸膈
- B. 饮停胸胁
- C. 饮停胃肠
- D. 饮停四肢肌表
- E. 饮停膀胱

32. 渗湿于热下在辛凉剂中加

- A. 麻黄、桂枝
- B. 薄荷、牛蒡
- C. 芦根、滑石
- D. 黄芩、黄柏
- E. 金银花、连翘

33. 温病治疗中救阴的目的在于

- A. 滋养阴血
- B. 温补阳气
- C. 顾护津液
- D. 宣通气机
- E. 化气利湿

34. 阳明温病，无汗，实证未剧，不可下。小便不利者，甘苦合化，选方为

- A. 白虎汤
- B. 竹叶石膏汤
- C. 冬地三黄汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 犀角地黄汤

35. 黄疸发病常责于

- A. 卫分

- B. 气分
- C. 营分
- D. 血分
- E. 以上均非

36. 《灵枢·决气》中提到的六气为A.

- 精、气、津、液、血、脉
- B. 气、津、液、血、脉、骨
- C. 精、津、液、血、脉、骨
- D. 津、液、血、脉、骨、肉
- E. 精、气、津、肉、血、脉

37. “水谷气血之海”指的是

- A. 脾
- B. 胃
- C. 大肠
- D. 小肠
- E. 三焦

38. 下列说法错误的是

- A. 津质地清稀
- B. 液质地稠厚
- C. 津起滋润作用
- D. 液起濡养作用
- E. 津主要分布于骨节、脏腑

39. 下列不会导致实证短气的是A.

- 痰饮
- B. 胃肠积滞
- C. 火盛
- D. 气滞
- E. 瘀阻

40. 外感风寒或风热之邪，或痰湿壅肺，肺失宣肃，导致的音哑或失音，这种现象称为A. 少气

- B. 短气
- C. 子暗
- D. 金实不鸣
- E. 金破不鸣

42. 患者恶寒发热，头身疼痛，喷嚏，鼻塞，流涕，咽喉痒痛，微有咳嗽。气喘，舌淡红，苔薄，脉浮。属

- A. 表证
- B. 里证
- C. 寒证
- D. 热证
- E. 阴证

43. 体弱气虚者其坐姿为

- A. 坐而喜俯
B. 坐而喜仰 C.
坐卧不安 D.
但卧不得坐E.
但坐不得卧
44. 相兼脉主病中沉涩脉主
A. 痰热
B. 血瘀
C. 痰火
D. 湿热
E. 阴虚火旺
45. 寒湿困脾证与湿热蕴脾证均有的表现是A.
身热不扬
B. 脘腹痞闷
C. 面黄不泽
D. 口渴喜饮
E. 白带量多
46. 临床表现主要为胃脘嘈杂, 饥不欲食, 干呕
呃逆, 口渴咽干, 舌红少苔, 脉细数的证候为
A. 胃阴虚B.
胃阳虚C. 食
滞胃脘D. 肝
胃不和E. 肝
脾不调
47. 面色淡黄, 枯槁无华称为
A. 萎黄
B. 黄胖
C. 阴黄
D. 阳黄
E. 黄疸
48. 形瘦多食者, 多属于
A. 中气虚弱
B. 中焦有火
C. 阴虚不足
D. 阳气不足
E. 痰湿内盛
49. 下列不属于气虚证临床表现的是A.
气短声低
B. 精神疲惫 C.
少气懒言 D.
体倦乏力 E.
脘腹坠胀感
50. 脾胃虚弱患者与正常人均可见的脉象表
现是
A. 沉脉
B. 实脉
C. 缓脉
D. 长脉
E. 滑脉
51. 暑邪伤人出现气短乏力的症状主要是由于
A. 暑为阳邪, 其性炎上
B. 暑性升散, 伤津耗气
C. 暑多夹湿, 阻遏气机
D. 暑性升发, 易扰心神
E. 暑性干涩, 易伤津液
52. 以身热夜甚、心烦不寐、舌绛、脉细数为
辨证要点的是
A. 卫分证 B.
气分证 C.
营分证 D.
血分证 E.
以上均非
53. 下列因痰湿内阻所致的头晕特点为
A. 头晕而胀, 烦躁易怒
B. 头晕胀痛, 头重脚轻
C. 头晕且重, 如物裹缠
D. 头晕耳鸣, 腰酸遗精
E. 头晕面白, 神疲乏力
54. 口渴咽干, 鼻干唇燥, 秋季多发者属于A.
燥邪伤津
B. 痰饮内停
C. 瘀血内停
D. 里热炽盛
E. 外感温热病初期
55. 寒痰的咳痰特点是A.
咳吐脓血腥臭痰 B.
痰中带血, 色鲜红
C. 痰少而黏, 难于咯出 D.
痰白而清稀, 有灰黑点
E. 痰白滑而量多, 易咯出者
56. 既能泻下冷积, 逐水退肿, 又能祛痰利咽,
治疗喉痹的药物是
A. 大黄 B.
芒硝 C.
牛蒡子D.
巴豆

E. 芫花

57. 大蓟治疗血热出血证，多用于治疗

- A. 尿血、血淋
- B. 吐血、咯血
- C. 面部出血 D.
- 胃肠出血 E.
- 便血

58. 功效燥湿消痰，下气除满，治疗梅核气的药物是

- A. 苍术
- B. 枳实
- C. 厚朴
- D. 陈皮
- E. 木香

59. 郁李仁的功效是

- A. 润肠通便，润肺止咳
- B. 疏散风热，清肺利咽
- C. 润肠通便，下气利水
- D. 润肠通便，祛痰利咽
- E. 润肠通便，消肿散结

60. 下列各项，不属栀子主治病证的是

- A. 血淋涩痛
- B. 骨蒸潮热
- C. 火毒疮疡
- D. 湿热黄疸
- E. 血热吐衄

61. 辛夷入汤剂宜

- A. 冲服
- B. 后下
- C. 包煎
- D. 先煎
- E. 烊化

62. 下列药物中既能止咳平喘，又能润肠通便的为

- A. 薏苡仁
- B. 火麻仁
- C. 苦杏仁
- D. 郁李仁
- E. 酸枣仁

63. 下列具有散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻功效的药物是

- A. 肉桂 B.
- 干姜 C.
- 吴茱萸

D. 高良姜

E. 附子

64. 下列药物中具有润肺清心，养阴生津功效的是

- A. 石斛
- B. 生地
- C. 麦冬
- D. 黄精
- E. 天冬

65. 具有补血活血，调经止痛，润肠通便功效的药物是

- A. 当归
- B. 白芍 C.
- 三七 D.
- 何首乌 E.
- 阿胶

66. 下列具有解表退热功效的是

- A. 薄荷
- B. 柴胡
- C. 刺蒺藜
- D. 菟丝子
- E. 钩藤

67. 下列药物中，不具有行气，止痛功效的药物是

- A. 郁金
- B. 白前
- C. 三棱
- D. 姜黄
- E. 川芎

68. 具有养阴生津功效的药物是

- A. 牡丹皮
- B. 赤芍
- C. 紫草 D.
- 金银花 E.
- 生地

69. 补气养血药中加入适量肉桂，其主要目的为

- A. 补而不滞
- B. 发汗解表
- C. 引火归原
- D. 鼓舞气血生长
- E. 散寒止痛

70. 蒲黄的功效是 A.

凉血，止血，利尿

- B. 活血，祛瘀，止痛
- C. 止血，化瘀，通淋
- D. 止血，化瘀，利尿
- E. 止血，消肿，生肌

71. 治疗热淋涩痛，宜选用

- A. 知母
- B. 芦根 C.
- 天花粉D.
- 夏枯草E.
- 石膏

72. 治疗胃热呕啰，宜选用

- A. 知母
- B. 芦根 C.
- 天花粉D.
- 夏枯草E.
- 石膏

73. 茯苓的功效是

- A. 利水渗湿
- B. 利水渗湿，泄热
- C. 利水渗湿，清热排脓
- D. 利水渗湿，健脾除痹
- E. 利水渗湿，健脾宁心

74. 具有开窍、辟秽、止痛功效的药物是A.

- 麝香
- B. 冰片 C.
- 龙骨 D.
- 苏合香E.
- 石菖蒲

75. 下列不属于羚羊角主治病证的是A.

- 惊痫抽搐
- B. 头晕目眩
- C. 目赤头痛
- D. 热毒发斑
- E. 风湿痹痛

76. 功效具有凉血止血. 清肝泻火的药物是A.

- 小蓟
- B. 大蓟 C.
- 地榆 D.
- 槐花 E.
- 侧柏叶

77. 艾叶除了具有温经止血. 散寒调经之功效外，还兼有

- A. 止痢
- B. 截疟

- C. 止痒
- D. 补虚
- E. 利尿

78. 下列何药为治疗湿热泻痢的要药

- A. 黄芩
- B. 黄连 C.
- 黄柏 D.
- 龙胆草E.
- 淡竹叶

79. 治疗亡阳证，寒饮咳喘，应选用的药物是

- A. 附子
- B. 干姜 C.
- 肉桂 D.
- 吴茱萸E.
- 小茴香

80. 桑寄生的功效不包括的是

- A. 利水
- B. 安胎
- C. 强筋骨
- D. 祛风湿
- E. 补肝肾

81. 功效为收敛固涩. 益气生津. 补肾宁心的药物是

- A. 乌梅 B.
- 诃子 C.
- 肉豆蔻D.
- 五味子E.
- 赤石脂

82. 山楂的功效是

- A. 消食健胃，行气散瘀
- B. 消食除胀，降气化痰
- C. 消食健胃，回乳消胀
- D. 消食健胃，疏肝解郁
- E. 消食健胃，涩精止遗

83. 下列何药是消除脘腹胀满之要药

- A. 藿香
- B. 苍术
- C. 厚朴
- D. 砂仁
- E. 佩兰

84. 车前子的功效不包括的是

- A. 明目
- B. 祛痰

- C. 利尿通淋
- D. 渗湿止泻
- E. 收湿敛疮

85. 天冬麦冬相比，功效偏于治疗

- A. 肺阴虚
- B. 胃阴虚 C.
- 心阴虚 D.
- 肾阴虚 E.
- 肠燥便秘

81. 患者，男，28岁，现发热恶热，烦躁，口渴喜饮，汗多，面赤，舌红，苔灰黑，脉数有力。其证属

- A. 风淫证
- B. 火淫证
- C. 暑淫证
- D. 湿淫证
- E. 燥淫证

82. 患者，女，35岁，现症见面色晦滞，神疲乏力，气短懒言，食少纳呆，肢体麻木，舌淡紫或有瘀点瘀斑，脉细涩。其证属

- A. 气虚证
- B. 气虚血瘀证
- C. 气血两虚证
- D. 气不摄血证
- E. 气滞血瘀证

83. 患者，男，69岁，近日脘腹痞胀，泛吐清水，伴有胸闷，心悸，息促不得卧，舌苔白滑，脉滑。其证属

- A. 痰证 B.
- 水停证C.
- 饮证 D.
- 气虚证E.
- 气逆证

84. 患者，男，38岁，现身热，无恶寒，汗出，烦渴，胸闷痛，舌红苔黄，脉数。其证属

- A. 邪热壅肺证
- B. 热扰胸膈证
- C. 风热犯肺证
- D. 燥热犯肺证
- E. 热灼营阴证

85. 患者男，69岁，近日食欲不振，食少腹胀，便溏，并久咳不止，气短而喘，咯痰清稀，声低懒言，神疲乏力，舌淡，苔白滑，

脉弱。其证属

- A. 心肺气虚证
- B. 脾肺气虚证
- C. 肺肾气虚证
- D. 脾肾阳虚证
- E. 脾气虚证

- A. 佐金平木法
- B. 抑木扶土法
- C. 滋水涵木法
- D. 培土生金法
- E. 泻南补北法

91. 肝火犯肺证的治法是

92. 肝脾不和的治法是

- A. 因时制宜
- B. 因地制宜
- C. 治病求本
- D. 祛除邪气
- E. 因人制宜

93. 属于夏季用药慎用温热的理论依据的是

94. 属于阴盛之体慎用寒凉的理论依据是A.

任脉

B. 督脉 C.

带脉 D.

冲脉 E.

阴维脉

95. 被称为十二经脉之海的是

96. 与女子妊娠密切相关的经脉

- A. 虚寒
- B. 真寒假热
- C. 实热
- D. 实寒
- E. 虚热

97. 阴偏衰所形成的病理变化是

98. 阴偏胜所形成的病理变化是

- A. 阴维脉、阳维脉
- B. 督脉
- C. 任脉
- D. 带脉
- E. 阴跷脉、阳跷脉

99. 具有维络腰腹，提系胞胎，固护胎儿作用的经脉是

100. 维系联络全身阴经和阳经的经脉是

- A. 怒
- B. 喜
- C. 思
- D. 悲
- E. 恐

101. 脾在志为

。

102. 肺在志为

- A. 思则气结
- B. 恐则气下
- C. 怒则气上
- D. 悲则气消
- E. 喜则气缓

103. 患者因过度悲忧，导致肺气耗伤或宣降失常。其病机是

104. 患者因过度思虑，导致心脾气机郁滞，运化失职。其病机是

- A. 前额
- B. 眉间
- C. 鼻D.
- 颊侧E.
- 耳门

105. 与明堂对应的是

106. 与庭、颜对应的是

- A. 筋
- B. 骨
- C. 气
- D. 肉
- E. 脉

107. 根据《素问·宣明五气》所说，“久行”可伤的是

108. 根据《素问·宣明五气》所说，“久坐”可伤的是

- A. 当归芍药散
- B. 温经汤
- C. 甘麦大枣汤
- D. 半夏厚朴汤
- E. 白术散

109. 妇人怀妊，腹中疝痛，宜选用

110. 妇人咽中如有炙脔，宜选用
(111~112 题共用备选答案)

- A. 当归芍药散
- B. 温经汤
- C. 胶艾汤
- D. 附子汤
- E. 白术散

111. 妊娠腹痛由于阳虚寒甚者，选用

112. 妊娠腹痛由于冲任虚寒者，选用
(113~114 题共用备选答案)

- A. 肝风内动
- B. 热入心包
- C. 阴虚火旺
- D. 心脾热盛
- E. 中风先兆

113. 歪斜舌多见于

114. 颤动舌多见于

(115~116 题共用备选答案)

- A. 中阳偏旺
- B. 胃家实
- C. 中焦气机壅滞
- D. 脾胃健运
- E. 中脘胀满

115. “中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴”，其中“中气实”的最佳解释是

116. “若湿热之证，不夹内伤，中气实者，其病必微”，其中“中气实”的最佳解释是

(117~118 题共用备选答案)

- A. 舌尖
- B. 舌中
- C. 舌根
- D. 舌两侧
- E. 舌底

117. 肾在舌上分属部位是

118. 肝在舌上分属部位是

(119~120 题共用备选答案)

- A. 口腔不洁
- B. 食积胃肠
- C. 胃热
- D. 牙疳
- E. 内有溃腐脓疡

119. 口气臭秽者多见于

120. 口臭难闻，牙龈腐烂者多见于

- A. 肾阳不足，水停泛滥
- B. 肾阳衰微，水湿凝结
- C. 脾虚失运，水湿内停
- D. 肺失通调，停水外溢
- E. 水湿滞留，营卫郁滞

121. 石水的病机为

122. 正水的病机为

- A. 正胜邪退
- B. 邪去正虚
- C. 邪胜正衰
- C. 正虚邪恋
- E. 邪正相持

123. 邪气退却而正气大伤的病理状态为

124. 正气不能完全祛邪外出，邪气可以稽留于一定的部位为

- A. 地域因素
- B. 邪气侵害
- C. 邪盛正衰
- D. 气候因素
- E. 正气不足

125. 疾病发生的重要条件是

126. 疾病发生的基础是

- A. 急则治其标
- B. 缓则治其本
- C. 标本同治
- D. 先扶正后祛邪
- E. 先祛邪后扶正

127. 虚人感冒应选用的方法是

128. 二便不利应选用的方法是

- A. 热甚
- B. 热在表 C.
- 热在里 D.
- 湿热内蕴E.
- 实热证

129. 身热初按热甚，久按热反转轻者为

130. 久按其热反甚者为

- A. 既能治疗血虚证，又能治疗遗精盗汗证B.
- 既能治疗血虚证，又能治疗胁肋脘腹疼痛C.
- 既能治疗血虚证，又能治疗痈疽疮疡证D.
- 既能治疗血虚证，又能治疗虚劳喘咳证E.
- 既能治疗血虚证，又能治疗出血证

131. 阿胶的主治病证是

132. 白芍的主治病证是

- A. 蕲蛇
- B. 木瓜
- C. 威灵仙
- D. 秦艽 E.

桑寄生

133. 具有祛风，通络，止痉功效的药物是

134. 具有舒筋活络，和胃化湿功效的药物是

- A. 地榆
- B. 侧柏叶
- C. 仙鹤草
- D. 棕榈炭
- E. 血余炭

135. 既能收敛止血，又能截疟的药物是

136. 既能收敛止血，又能利尿的药物是

- A. 开窍醒神，清热止痛
- B. 开窍醒神，活血通经，消肿止痛C.
- 开窍醒神，辟秽止痛
- D. 化痰开窍，凉肝息风，清热解毒E.
- 开窍醒神，清心化痰

137. 麝香的功效是

138. 牛黄的功效是

- A. 滑石
- B. 茵陈 C.
- 萹藤 D.
- 地肤子E.
- 泽泻

139. 具有利湿去浊，祛风除痹功效的药物是

140. 具有清利湿热，利胆退黄功效的药物是A.

- 干姜
- B. 附子
- C. 肉桂 D.
- 丁香 E.
- 吴茱萸

141. 治疗腹痛、泄泻，为温暖中焦之主药的是

142. 治疗阳痿、宫冷，虚阳上浮的药物是

- A. 贵重药物
- B. 胶类药物

- C. 气味芳香的药物 D. 矿物、介壳类药物
E. 粉末状及带有绒毛的药物
143. 入汤剂宜后下的药物是
144. 入汤剂宜烔化的药物是
- A. 薄荷
B. 荆芥 C. 桑叶 D. 菊花 E. 牛蒡子
145. 患者恶风发热，咳嗽痰少，伴目赤涩痛，首选药物是
146. 患者恶风发热，咳嗽痰多，伴咽喉肿痛，首选药物是
- A. 鱼腥草
B. 牡丹皮
C. 败酱草
D. 山慈菇
E. 大血藤
147. 具有清热解毒，祛风止痛功效的药物是
148. 具有清热解毒，祛瘀止痛功效的药物是A. 龙骨
B. 诃子
C. 乌梅 D. 五味子E. 五倍子
149. 具有敛肺降火，涩肠止泻，敛汗止血，收湿敛疮功效的药物是
150. 具有收敛固涩，益气生津，补肾宁心功效的药物是

第二单元

1. 属于桑菊饮功用的是
- A. 消食导滞
B. 行气化滞
C. 宣肺止咳
D. 燥湿和胃
E. 消痞除癥
2. 酸枣仁汤中益心脾而宁心神的药物是A. 茯苓
B. 远志 C. 茯神木

- D. 石菖蒲
E. 琥珀
3. 不含川芎的方剂是
- A. 温经汤
B. 四物汤
C. 越鞠丸
D. 生化汤
E. 归脾汤
4. 半身不遂，口眼歪斜，语言謇涩，口角流涎，脉缓无力者。选方为
- A. 桃核承气汤
B. 小活络丹 C. 温经汤
D. 血府逐瘀汤
E. 补阳还五汤
5. 恶寒发热，无汗，头痛项强，肢体酸楚疼痛，口苦微渴，舌苔白或微黄，脉浮。治宜选用
- A. 越鞠丸
B. 麻杏石甘汤
C. 天麻钩藤饮
D. 九味羌活汤
E. 大青龙汤
4. 下列不属于至宝丹功用的是
- A. 开窍
B. 息风
C. 化浊
D. 解毒
E. 清热
7. 属于天台乌药散组成药物的是
- A. 陈皮
B. 草豆蔻
C. 肉桂 D. 厚朴 E. 川楝子
8. 玉屏风散的功用为
- A. 涩肠止遗
B. 清热养血
C. 固冲摄血
D. 补肾纳气
E. 益气固表止汗
9. 朱砂安神丸中泻火除烦的药物是A. 黄连
B. 石膏

- C. 竹叶
- D. 知母
- E. 栀子

10. 天王补心丹与朱砂安神丸组成中均含有的药物有

- A. 炙甘草
- B. 玄参 C.
- 黄柏 D.
- 生地黄E.
- 酸枣仁

11. 酸枣仁汤中养肝血，安心神的药物是A.

- 茯苓
- B. 甘草
- C. 知母 D.
- 川芎 E.
- 酸枣仁

12. 保和丸的组成药物中含有

- A. 半夏、生姜
- B. 神曲、金银花
- C. 陈皮、甘草 D.
- 山楂、神曲 E.
- 茯苓、白术

13. 下列属于槐花散功用的是

- A. 行气解郁
- B. 解表散邪
- C. 清热解毒
- D. 祛湿排脓
- E. 疏风行气

14. 治疗头微痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽干，舌苔白，脉弦，应首选

- A. 麻黄汤B.
- 止嗽散 C.
- 小青龙汤D.
- 桑杏汤 E.
- 杏苏散

15. 止嗽散的组成药物中含有

- A. 防风
- B. 木香
- C. 杏仁 D.
- 陈皮 E.
- 款冬花

16. 川楝子在一贯煎中的作用是

- A. 疏肝理气
- B. 君药

- C. 臣药
- D. 杀虫 E.
- 反佐药

17. 下列主治气虚. 外感风寒湿表证的方剂是

- A. 黄芪建中汤
- B. 败毒散
- C. 防风通圣散
- D. 补中益气汤
- E. 葛根芩连汤

18. 身热汗多，口渴心烦，小便短赤，体倦少气，精神不振，脉虚数，治宜用

- A. 银翘散 B.
- 大青龙汤
- C. 九味羌活汤
- D. 清暑益气汤
- E. 麻杏石甘汤

19. 理中丸的功用是 A.

- 健脾益气，渗湿止泻B.
- 温中健脾，和里缓急C.
- 温中祛寒，补气健脾D.
- 温中补虚，降逆止呕E.
- 健脾益气，养胃和中

20. 天王补心丹的主治辨证要点是

- A. 精神恍惚，悲伤欲哭，舌红苔少，脉细B.
- 心悸失眠，体倦食少，舌淡，脉细弱 C.
- 失眠，惊悸，舌红苔黄，脉弦数
- D. 失眠，心悸，手足心热，舌红少苔，脉细数
- E. 虚烦失眠，咽干口渴，舌红，脉弦细

21. 下列抗菌药物中是治疗肺炎球菌肺炎首选的是

- A. 青霉素 B.
- 红霉素 C.
- 四环素 D.
- 庆大霉素
- E. 三代头孢菌素

22. 关于急性白血病的叙述，不正确的是A.

- 出血的机制是凝血因子缺乏
- B. 呈正细胞正色素性贫血
- C. 是造血干细胞的恶性克隆性疾病D.
- 半数以上患者以发热起病
- E. 感染是最常见的死亡原因之一

23. 糖化血红蛋白A1 可反映平均血糖水平的

时间是

- A. 6~8 周
- B. 8~12 周
- C. 1~2 周
- D. 2~4 周
- E. 4~6 周

24. 关于肺心病的说法, 错误的是

- A. COPD 病史最常见
- B. 肺动脉瓣区 S₂ 亢进
- C. 剑突下可触及心脏搏动
- D. 下肢水肿

25. 癫痫单纯部分性发作一般不超过

- A. 数十分钟
- B. 1 小时
- C. 不超过 1 分钟
- D. 数分钟
- E. 十数分钟

26. 肺癌常见的淋巴结转移部位是

- A. 颌下淋巴结
- B. 颏下淋巴结
- C. 颈前淋巴结
- D. 锁骨上淋巴结
- E. 腋窝淋巴结

27. 慢性肾炎治疗措施中不做常规应用的是

- A. 避免有损肾功能的因素
- B. 应用血小板解聚药
- C. 糖皮质激素及细胞毒药物
- D. 积极控制血压
- E. 优质低蛋白饮食及低磷饮食

28. 与原发肝癌发病最密切相关的是

- A. 戊型肝炎
- B. 自身免疫性肝炎
- C. 肝血管瘤
- D. 乙型肝炎
- E. 多囊肝

29. 可继发再生障碍性贫血的疾病是

- A. 慢性肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 急性胰腺炎
- D. 病毒性肝炎
- E. 糖尿病

30. 救治急性一氧化碳中毒最有效的措施是

- A. 输注新鲜全血
- B. 输注浓缩红细胞悬液
- C. 应用呼吸兴奋剂
- D. 进行机械通气
- E. 高压氧治疗

31. 有机磷杀虫药中毒时患者呼气的特异气味是

- A. 大蒜臭味
- B. 汗臭味
- C. 烂苹果味
- D. 氨味
- E. 肝臭味

32. 洋地黄中毒引发的室早, 首选的治疗措施是

- A. 立即停用洋地黄
- B. 静脉注射利多卡因
- C. 休息
- D. 吸氧
- E. 停用排钾利尿剂

33. X 线钡餐检查诊断消化性溃疡的直接征象是

- A. 充盈缺损
- B. 胃壁蠕动减少呈皮革状
- C. 黏膜呈锯齿状增粗
- D. 有激惹及变形
- E. 龛影

34. 属于低血容量性休克的情况为

- A. 细胞性休克
- B. 神经精神性休克
- C. 失血性休克
- D. 感染性休克
- E. 过敏性休克

35. 萎缩性胃炎, 胃黏膜的病理改变是

- A. 糜烂, 出血
- B. 渗出
- C. 苍白, 颗粒状
- D. 肥厚, 粗糙
- E. 充血, 水肿

36. 癫痫单纯部分性发作一般不超过

- A. 数十分钟
- B. 1 小时
- C. 不超过 1 分钟
- D. 数分钟
- E. 十数分钟

37. 与原发肝癌发病最密切相关的是

- A. 慢性肾炎
- B. 肾病综合征
- C. 急性胰腺炎
- D. 病毒性肝炎
- E. 糖尿病

- A. 戊型肝炎
B. 自身免疫性肝炎
C. 肝血管瘤
D. 乙型肝炎
E. 多囊肝
38. 骨髓增生异常综合征血象检查最明显的改变是
A. 白细胞计数明显增多
B. 白细胞持续降低
C. 持续性全血细胞减少
D. 骨髓巨核细胞减少 E. 持续性全血细胞增多
39. 富含嘌呤的食物是
A. 牛奶
B. 鸡蛋
C. 动物内脏
D. 黄瓜
E. 米饭
40. 肠套叠可见腹痛，并伴有的症状是
A. 急性发热
B. 黄疸
C. 呃逆
D. 腹泻
E. 血便
41. 患者 X 线下见两肺上部有多发的厚壁空洞，周围有较广泛的纤维条索影。应首先考虑的疾病为
A. 肺大泡
B. 肺脓肿
C. 浸润型肺结核空洞形成
D. 慢性纤维空洞型肺结核
E. 周围型肺癌空洞形成
42. 下列哪项是甲状腺功能减退病人可见的面容
A. 黏液性水肿面容
B. 苦笑面容
C. 无欲貌
D. 满月脸
E. 肢端肥大症面容
43. 风湿热引起发热的主要原因是
A. 坏死物质吸收
B. 内分泌与代谢障碍
C. 产热过多
D. 散热过少
E. 抗原-抗体反应
44. 可引起阻塞性黄疸的疾病是
A. 蚕豆病
B. 病毒性肝炎
C. 胰头癌
D. 系统性红斑狼疮
E. 毒蕈中毒
45. 胆囊触痛征（墨菲征）阳性，见于
A. 胰头癌
B. 肝癌
C. 急性胆囊炎
D. 肝硬化
E. 胆囊癌
46. 红细胞直径 $>15\mu\text{m}$ 见于
A. 溶血性贫血
B. 失血性贫血 C. 缺铁性贫血 D. 巨幼细胞贫血
E. 再生障碍性贫血
47. 导致内出血低热的原因可能是
A. 代谢障碍
B. 植物神经功能紊乱 C. 无菌性坏死物质吸收
D. 继发感染
E. 失血导致体温调节中枢功能障碍
48. 多发生脊柱前凸的部位是
A. 腰椎
B. 骶椎 C. 颈段 D. 颈胸段
E. 胸段
49. 下列疾病，不出现杵状指（趾）的是
A. 支气管扩张
B. 肺癌
C. 发绀型先天性心脏病
D. 佝偻病
E. 亚急性感染性心内膜炎
50. 下列各项，不会出现血小板减少的疾病是
A. 急性放射病
B. 急性大失血
C. 脾功能亢进
D. 急性白血病
E. 再生障碍性贫血

51. 下列最不符合III度房室传导阻滞的是

- A. QRS 波群形态正常
- B. QRS 波群宽大畸形
- C. P 与 QRS 无固定关系
- D. 心房率快于心室率E. 心房率慢于心室率

52. 无尿是尿量小于

- A. 17ml/h
- B. 100ml/24h
- C. 400ml/h
- D. 100ml/h
- E. 17ml/24h

53. 稽留热 24 小时内温差为

- A. 1℃以上
- B. 2℃以上
- C. 3℃以上
- D. 1℃以下
- E. 2℃以下

54. 声音嘶哑的咳嗽多由于

- A. 纵膈肿瘤
- B. 支气管癌
- C. 声带炎
- D. 支气管哮喘
- E. 支气管炎

55. 小量咯血是 24 小时咯血量不超过

- A. 100ml
- B. 300ml
- C. 400ml
- D. 500ml
- E. 1000ml

56. 医学伦理学的研究对象是

- A. 医学道德难题
- B. 医学道德关系
- C. 医学基本理论
- D. 医学基本规范
- E. 医学基本原则

57. 被尊称为“坐堂大夫”的医家是A.

- 华佗
- B. 张仲景
- C. 孙思邈
- D. 葛洪 E. 薛生白

58. 下列除哪项外均是医德品质的内容A.

公正

B. 严谨

- C. 奉献
- D. 乐观
- E. 仁爱

59. 患者权利包括

- A. 平等享有医疗的权利
- B. 获得自己所患疾病真实情况
- C. 拒绝治疗的权利
- D. 监督医疗过程的权利
- E. 以上都是

60. 不属于医患之间非技术关系的是

- A. 经济关系
- B. 法律关系
- C. 道德关系
- D. 同事关系
- E. 价值关系

61. 医患关系模式正确的是

- A. 主动-合作型, 相互-指导型, 共同参与型 B. 主动-配合型, 指导-合作型, 共同参与型 C. 主动-被动型, 指导-合作型, 共同参与型D. 主动-被动型, 共同参与型, 父权主义型E. 主动-被动型, 互相-合作型, 平等参与型
62. 患者手足厥寒, 腰腿疼痛, 口不渴, 舌淡苔白, 脉沉细。治宜首选的是

- A. 桂枝汤倍桂枝
- B. 桂枝汤去芍药
- C. 桂枝汤倍芍药
- D. 桂枝汤倍芍药, 加饴糖
- E. 桂枝汤去生姜, 倍大枣, 加当归、通草、细辛

63. 患者牙痛牵引头疼, 面颊发热, 口气热臭, 舌红苔黄, 脉滑数。治宜首选的方剂是A. 黄连解毒汤

- B. 左金丸
- C. 导赤散
- D. 白虎汤
- E. 清胃散

64. 患者气喘咳嗽, 皮肤蒸热, 日晡尤甚, 舌红苔黄, 脉细数。治宜首选的方剂是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 左金丸
- C. 泻白散
- D. 导赤散
- E. 苇茎汤

65. 患者女, 70 岁。COPD 病史多年, 每年冬季发作, 查体呈桶状胸, 双肺叩诊呈过清音, 心浊音界缩小, 呼吸音减弱, 肺功能检查显示 $79\% > FEV1\% \geq 50\%$, COPD 严重程度分级是

- 级
- B. 2 级
- C. 3 级
- D. 4 级
- E. 5 级

66. 男性, 65 岁, 高血压病史 14 年, 今晨起床突然发现右侧肢体瘫痪。感觉障碍伴有失语, 经检查诊断为动脉血栓性脑梗死, 其最可能的梗死部位是

- A. 左侧大脑中动脉
- B. 右侧大脑中动脉
- C. 左侧大脑前动脉
- D. 右侧大脑前动脉
- E. 椎-基底动脉

67. 中年男性, 既往有肺结核病史, 近 1 个月咳嗽、咳痰、痰中带血, 伴发热、消瘦就诊, 为排除肺癌最有鉴别意义的是

- A. 原发病史
- B. 全身中毒症状
- C. 咳嗽、咳痰、咯血症状
- D. 血沉增快
- E. 痰液检查

68. 女性, 54 岁, 腹部 B 超检查发现肝占位性病变, 查肝功能正常。最有助于诊断或排除原发性肝癌的是

- A. γ -GT
- B. AFP
- C. AST
- D. ALT
- E. LPH

69. 女性, 32 岁, 因双侧腰背酸痛, 尿频, 尿急, 尿痛 7 天就诊, 体温 39°C , 双肾叩击痛 (+)。尿检: 蛋白 (+), 脓细胞 (+++), 红细胞 (+), 最可能的诊断是

- A. 急性肾炎
- B. 急性膀胱炎
- C. 肾结核
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

70. 男性, 37 岁, 确诊为急性粒细胞白血病,

近 2 周出现发热, 坐位站立时黑矇、头晕、极度乏力, 急查血常规血红蛋白 47g/L , 纠正贫血快速有效的方法是

- A. 补充铁剂
- B. 输注全血
- C. 口服铁剂
- D. 应用促红细胞生成素
- E. 输用浓缩红细胞

71. 女性, 29 岁, 孕 5 月, 确诊为甲亢, 最适当的治疗是

- A. 甲状腺次全切除
- B. 最小有效剂量硫脲类药物
- C. 放射性碘治疗
- D. 普萘洛尔
- E. 甲巯咪唑

72. 男性, 38 岁。甲亢复发。查体: 轻度突眼, 甲状腺弥漫性肿大, 心率 120 次/分。实验室检查: FT_3 , FT_4 , TSH_4 , AST 中度升高, 血 $WBC 3.8 \times 10^9/L$ 。适宜的治疗措施是

- A. 抗甲状腺药物治疗
- B. 复方碘溶液
- C. 甲状腺手术治疗
- D. 抗甲状腺药物+糖皮质激素
- E. 放射性 ^{131}I 治疗

73. 女性, 58 岁。甲状腺 I 度肿大, 反应迟钝, 厌食, 腹泻。实验室检查: $FT_3 \uparrow$, TT_4 正常, $TSH \downarrow$, 甲状腺摄 ^{131}I 率正常。诊断是

- A. 亚急性甲状腺炎
- B. 亚临床型甲亢
- C. T_3 型甲亢
- D. 甲状腺危象
- E. 淡漠型甲亢

74. 患者因怕热、多汗、心悸、甲状腺肿大等诊断为甲亢, 心电图检查为心律失常, 最可能出现的心律失常是

- A. 室性早搏
- B. 交界性早搏
- C. 阵发性室上性心动过速
- D. 房颤
- E. 房室传导阻滞

75. 男性, 55 岁, 消化性溃疡病史 15 年, 近 2 个月疼痛复发, 经 8 周内科药物治疗无效, 粪便隐血试验持续阳性, 最可能的诊断是

- A. 胃溃疡活动
B. 十二指肠溃疡活动
C. 胃溃疡癌变
D. 慢性胃体炎
E. 慢性胃窦炎
76. 女性, 30 岁, 尿痛、尿频、尿急 2 天, 伴发热、腰痛、恶心、呕吐, 血压 120/80mmHg, 尿常规检查有红、白细胞及白细胞管型, 其诊断可能是
A. 急性膀胱炎 B.
急性肾盂肾炎 C.
慢性肾盂肾炎 D.
急性肾炎
E. 慢性肾炎
77. 女性, 48 岁, 反复尿频、尿急、尿痛、夜尿增多、低热 1 年余, 近 2 天来高热, 上述症状加剧入院。每次发作抗菌素治疗有效, 既往有肺结核病史, 血压 165/95mmHg, 尿蛋白 (+), 白细胞 8 个/HP, 静脉肾盂造影示 肾盂肾盏瘢痕狭窄扩张, 尿菌培养阴性, 诊断最可能的
A. 慢性肾小球肾炎
B. 慢性肾盂肾炎 C.
急性肾盂肾炎 D.
肾结石
E. 肾结核
78. 女性, 20 岁, 因疲乏、无力、烦躁、易激动、注意力不集中等就诊, 诊断为缺铁性贫血, 支持该诊断检查结果是
A. 血清铁浓度正常
B. 总铁结合力降低
C. 转铁蛋白饱和度升高
D. 血清铁蛋白降低
E. 骨髓铁染色弱阳性
79. 男性, 56 岁, 身高 175cm, 体重 75kg, 因 2 个月内体重下降 5kg 而就诊, 查空腹血糖 7.9mmol/L, 下列正确的是
A. 可诊断糖尿病
B. 应进行口服葡萄糖耐量试验
C. 可诊断继发性糖尿病
D. 可诊断糖耐量减低
E. 应进行 100g 口服葡萄糖耐量试验
80. 男性, 39 岁, 发作时先觉胃部一股气体上升, 并有咀嚼、吞咽动作, 喃喃自语, 走动, 似在找东西, 呼唤无反应, 持续约 4 分钟。其癫痫的发作类型是
A. 强直-阵挛性发作
B. 失神发作
C. 复杂部分性发作
D. 脑缺血发作
E. 假性发作
81. 患者高热、胸痛、咳嗽、咳痰, 经检查诊断为肺炎链球菌肺炎, 其治疗应首选的药物 A. 青霉素
B. 红霉素 C.
甲硝唑 D.
氧氟沙星
E. 头孢唑啉钠
82. 患者 59 岁, COPD 病史 11 年, 近来因咳嗽、喘加重就诊, 查体示 P2 亢强, 剑突下可触及心脏搏动, 该患者最可能的诊断是
A. 合并支气管肺炎
B. 合并支气管扩张
C. 合并冠心病
D. 慢性肺源性心脏病
E. COPD 急性加重期
83. 男性, 36 岁, 反复浮肿, 高血压 4 年, 近日常气明显, 深大呼吸, 查血红蛋白 60g/L, 双肺呼吸音清晰, 未闻及啰音, 心率 92 次/分, 节律整齐。患者气喘最可能的原因是 A. 心功能不全
B. 贫血 C.
酸中毒
D. 上呼吸道感染
E. 水肿
84. 女性, 54 岁, 类风湿关节炎病史 5 年, 可生活自理, 不能参加工作, 活动受限, 其关节功能障碍的分级是
A. I 级
B. II 级
C. III 级
D. IV 级
E. V 级
85. 女性, 29 岁, 因手部关节疼痛、肿胀就诊。发病前有病毒性呼吸道感染史, 慢性起病, 逐渐加重。下列检查结果中, 有助于鉴别类风湿关节炎与系统性红斑狼疮的是
A. 轻度贫血

- B. 血沉增快
C. C 反应蛋白升高
D. 心脏超声示少量心包积液 E.
手部 X 线检查未见骨质改变
86. 女性, 47 岁, 既往健康, 晨练时突然出现剧烈头痛伴喷射性呕吐, 拟诊为蛛网膜下腔出血, 尽快确诊应首选的检查是
A. 脑血流图 B.
脑脊液检查C.
脑血管造影
D. 出凝血项目检测
E. 免疫学检查
87. 急性上消化道出血患者, 查体心率 122 次/分, 血压 70/50mmHg, 估计患者出血量至少是
A. 500mL
B. 1000mL
C. 1200mL
D. 1500mL
E. 2000mL
88. 女性, 45 岁, 上腹痛 2 天, 呕吐, 腹胀, 血淀粉酶 750U/L(Somogyi), 血压 80/50mmHg, 脉搏 120 次/分, 最可能的诊断为
A. 急性胃炎 B.
急性胰腺炎
C. 急性心肌梗死 D.
急性肾功能衰竭E.
急性肝炎
89. 男性, 40 岁, 慢性肝炎病史 14 年, 近来腹胀、消瘦。查体: 巩膜黄染, 右上腹部触到拳头大、质硬、表面不光滑包块。最可能的诊断是
A. 原发性肝癌
B. 转移性肝癌
C. 慢性活动性肝炎
D. 肝脓肿
E. 肝硬化
90. 男, 24 岁。突然意识不清, 跌倒, 全身强直数秒钟后抽搐, 咬破舌。2 分钟后抽搐停止。醒后活动正常。首选应考虑的疾病是A. 脑出血
B. 脑血栓
C. 蛛网膜下腔出血
D. 癫痫
E. 脑栓塞
91. 应进一步做的检查是
A. 头颅 X 线片
B. 脑电图
C. 脑脊液检查
D. 脑血管造影
E. 经颅超声多普勒 (TCD)
92. 治疗的首选药物是
A. 降颅压药
B. 溶栓治疗
C. 止血药 D.
扩血管药E.
抗癫痫药
93. 男性, 55 岁的心房颤动患者, 近期反复出现发作性眩晕, 眼球震颤, 伴有恶心、呕吐, 每次持续 10 分钟。查体无神经系统异常。急诊 CT 未发现与症状相关的病灶。目前可能的诊断是
A. 脑动脉瘤 B.
脑血栓形成C.
脑出血
D. 脑血管畸形
E. 短暂性脑缺血发作
94. 出现以上症状及体征, 完全恢复最长应在
A. 6 小时内
B. 12 小时内
C. 24 小时内
D. 48 小时内
E. 72 小时内
95. 预防复发应首先的药物是
A. 阿司匹林
B. 低分子右旋糖酐
C. 丙戊酸钠
D. 胞二磷胆碱
E. 降纤酶
96. 男, 45 岁。吃海鲜后夜间突发左足第 1

跖趾关节剧烈疼痛1天。查体关节局部红肿，压痛明显。既往无类似发作。化验：血尿酸602mmol/L。目前最主要的治疗药物是

- A. 苯溴马隆
- B. 别嘌醇 C. 抗生素
- D. 非甾体类抗炎药
- E. 甲氨蝶呤

97. 不恰当的治疗和处理是

- A. 足部制动，抬高患肢 B. 使用激素
- C. 口服秋水仙碱
- D. 禁酒
- E. 口服吲哚美辛

98. 13岁女性，两年前起病，于生气后突然大叫一声，随之倒地呼之不应，牙关紧闭，双眼上视，一头颈后仰，四肢抽搐，无二便失禁，无舌咬伤。发作停止后对整个过程不能回忆，未给予特殊处置，照常上学。2个月后于夜间入睡后又出现抽搐，有小便失禁，抽搐停止后，突然起床冲出门外。无目的漫游，呼之不应，冲动毁物，持续2小时后恢复清醒，对经过全无记忆。此后反复有类似发作，平均每月3次。在以下检查中最可能见到异常的是

- A. 心理测试
- B. CT
- C. MRI
- D. EEG
- E. 头颅平片

99. 该患者最可能的诊断是

- A. 神经症
- B. 癔症
- C. 急性应激障碍
- D. 癫痫
- E. 脑肿瘤所致精神障碍

100. 下列选项中最有效的治疗措施是A.

- 心理治疗
- B. 氯丙嗪治疗 C. 卡马西平治疗

D. 手术治疗
E. 电休克

- A. 收敛肺气
- B. 安蛔止痛
- C. 生津止渴
- D. 涩精止遗
- E. 固冲止血

101. 二陈汤中乌梅的配伍意义是

102. 乌梅丸中乌梅的配伍意义是

- A. 猪苓汤
- B. 真武汤
- C. 实脾散
- D. 五苓散
- E. 苓桂术甘汤

103. 主治阳虚水泛证的首选方剂是

104. 主治脾肾阳虚，水气内停之阴水的首选方剂是

- A. 透邪解郁，疏肝理脾
- B. 寒热平调，消痞散结
- C. 温阳健脾，行气利水
- D. 清胆利湿，和胃化痰
- E. 肝疏解郁，养血健脾

105. 四逆散的功用是

106. 逍遥散的功用是 A.

泻热破瘀，散结消肿B.

攻下冷积，温补脾阳C.

温阳健脾，行气利水D.

清胆利湿，和胃化痰E.

峻下热结

107. 大黄牡丹汤的功用是

108. 大承气汤的功用是

- A. 清营解毒，透热养阴
- B. 清泻肺热，止咳平喘
- C. 清热解毒，凉血散瘀
- D. 清肺化痰，逐瘀排脓
- E. 清泻肝火，降逆止呕

109. 左金丸的功用是

- A. 干姜、半夏
- B. 干姜、茯苓

C. 肉桂、当归 D.
人参、代赭石 E.
柴胡、苏叶

111. 属于旋覆代赭汤的组成药物的是

A. 大补阴丸
B. 一贯煎
C. 百合固金汤
D. 地黄饮子 E.
六味地黄丸

113. 主治肝肾阴虚，肝气郁滞证的方剂是

114. 主治嗜痂证的方剂是

A. 桑杏汤
B. 泻白散 C.
止嗽散 D.
麦门冬汤 E.
桑菊饮

115. 咳嗽气喘，咽喉不利，咳唾涎沫，口干咽燥，手足心热，舌红少苔，脉虚数，应选用

116. 干咳少痰，痰粘难吐，咽干鼻燥，身热不甚，口渴，舌红，脉浮数，应选用

A. 甲状腺呈弥漫性或结节性肿大， ^{131}I 摄取率高但能够被 T3 所抑制，对 TRH 反应正常
B. 心悸、出汗、怕热、粗大肌肉震颤，但测定甲状腺功能正常，无突眼
C. 甲状腺肿大呈弥漫性、对称性，较软，可伴震颤及杂音，有突眼，吸碘率增高伴高峰前移
D. 有发热，短期内甲状腺肿大，触之坚硬而疼痛。白细胞正常或升高，血沉增高，摄 ^{131}I 碘率下降
E. 易疲劳、怕冷、体重增加、嗜睡，血清 TSH 增高，TT3、TT4 降低

117. Graves 病的特点是

118. 亚急性甲状腺炎的特点是

A. PaO₂ 为 50mmHg，PaCO₂ 为 40mmHg
B. PaO₂ 为 50mmHg，PaCO₂ 为 60mmHg

C. PaO₂ 为 65mmHg，PaCO₂ 为 40mmHg
D. PaO₂ 为 70mmHg，PaCO₂ 为 40mmHg
E. PaO₂ 为 70mmHg，PaCO₂ 为 45mmHg

119. 符合 I 型呼吸衰竭的动脉血气标准是

120. 符合 II 型呼吸衰竭的动脉血气标准是 A.
黄疸

B. 呕吐
C. 腹泻
D. 血便
E. 急性发热

121. 肠梗阻可见腹痛，并伴有

122. 肠套叠可见腹痛，并伴有

A. 幽门梗阻
B. 过敏性紫癜 C.
急性心肌梗死 D.
急性溶血
E. 肾结石

123. 上述各项，表现为腹痛伴黄疸的是

124. 上述各项，表现为腹痛伴休克的是

A. 急性白血病
B. 传染性单核细胞增多症
C. 再生障碍性贫血
D. 类白血病反应
E. 特发性血小板减少性紫癜 125.

肝炎病毒可诱发的血液病是

126. 人类 T 淋巴细胞病毒 I 型可诱发的血液病是

A. 肌红蛋白
B. 肌钙蛋白
C. 肌酸激酶同工酶
D. 肌酸激酶
E. α -酮戊二酸脱氢酶

127. 心梗起病 2 小时内升高的是

128. 心梗起病后 4 小时内升高的是

A. 口服碳酸钙
B. 必需氨基酸疗法
C. 补充 (OH)
D. 促红细胞生成素
E. 血液透析治疗

129. 慢性肾功能不全出现肾性贫血最合适的治疗药物是

130. 尿毒症患者伴高钾血症最有效降血钾疗法是

- A. 慢性阻塞性肺气肿
 B. 慢性支气管炎
 C. 支气管扩张症
 D. 肺炎
 E. 急性肺水肿
131. 咳嗽痰量大有分层现象的疾病是
 132. 咳嗽咯粉红色泡沫样痰的疾病是
 A. 扁平胸
 B. 鸡胸 C. 桶状胸
 D. 漏斗胸
 E. 胸廓局限变形
133. 慢性消耗性疾病患者的胸廓是
 134. 慢性阻塞性肺气肿患者的胸廓是
 A. 食管癌
 B. 肠梗阻
 C. 胃肠道穿孔 D. 消化性溃疡 E. 食管静脉曲张
135. 立位腹部平片, 显示两侧膈下有半月形透亮气体影的疾病是
 136. 立位腹部平片, 显示肠管扩张呈阶梯状气液平面影的疾病是
 A. 稽留热
 B. 弛张热
 C. 间歇热
 D. 回归热
 E. 波状热
137. 斑疹伤寒高热期的热型是
 138. 败血症的热型是
 A. 正极接左上肢, 负极接右上肢
 B. 正极接左下肢, 负极接右上肢
 C. 正极接左下肢, 负极接左上肢
 D. 正极接左上肢, 负极接右下肢
 E. 正极接左下肢, 负极接右下肢
139. I 导联是指
 140. II 导联是指
 A. 皮下出血直径 < 2mm
 B. 皮下出血直径 3~5mm
 C. 皮下出血直径 > 5mm
 D. 片状出血伴有皮肤显著隆起 E. 片状出血伴有皮下握雪感
141. 紫癜引起皮下出血的特征为
 142. 瘀斑引起皮下出血的特征为
 A. 无肢体活动, 也无肌肉收缩, 为完全性瘫痪
 B. 可见肌肉收缩, 但无肢体活动
 C. 肢体能床面上做水平移动, 但不能抬起
 D. 肢体能抬高床面, 但不能抵抗阻力
 E. 能做抵抗阻力的动作, 但较正常差
143. 肌力分级分为 6 级, 2 级的表现为
 144. 肌力分级分为 6 级, 3 级的表现为
 A. 忽视了生命的生物复杂性和社会复杂性
 B. 形式单一不具有统一观念
 C. 忽视了人与自然的协调统一
 D. 忽视了社会环境. 个体行为. 生活方式. 心理因素等对人体健康和疾病的影响
 E. 忽视了心理变化对身体的影响
145. 机械论医学模式的缺点是
 146. 属于体格检查的道德要求的是
 2. 关心体贴, 减少痛苦。3. 尊重病人, 心正无私。
 A. 继承发展了历史上幸福论和快乐主义的伦理传统
 B. 认为人的生命是宝贵的, 人的生命和尊严具有最高的价值, 应当受到尊重
 C. 将生命的内在价值和外在价值统一起来
 D. 强调医务人员的责任和义务
 E. 研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格
147. 符合“人道论”的是
 148. 符合“美德论”的是
 A. 认为人的本性就是追求快乐和幸福
 B. 研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格
 C. 人道主义思想在医学领域中的具体体现
 D. 强调人的责任. 义务
 E. 生命神圣与生命质量统一
149. 符合“功利论”的是
 150. 符合“道义论”的是
 A. 认为人的本性就是追求快乐和幸福
 B. 研究和探讨人应该具有什么样的美德和品格
 C. 人道主义思想在医学领域中的具体体现
 D. 强调人的责任. 义务
 E. 生命神圣与生命质量统一

第三单元

A1 型题

1. 治疗咳血之燥热伤肺证，应首选

- A. 麦门冬汤
- B. 清燥救肺汤
- C. 沙参麦冬汤
- D. 桑杏汤
- E. 百合固金汤

2. 厥证的基本病机是

- A. 失血过多，气随血脱
- B. 气血凝滞，脉络瘀阻
- C. 气虚下陷，清阳不升
- D. 气机逆乱，升降乖戾
- E. 痰随气升，上蒙清窍

3. 下列不属于外感腰痛之致病病邪是

- A. 热
- B. 燥
- C. 风
- D. 寒
- E. 湿

4. 尿血与血淋的鉴别，主要在于

- A. 有无尿痛
- B. 尿味的情况
- C. 尿色的深浅
- D. 尿量的多少
- E. 以上均非

5. 治疗胃痛饮食伤胃证的中医治法是

- A. 温胃散寒，行气止痛
- B. 疏肝解郁，理气止痛
- C. 清化湿热，理气和胃
- D. 消食导滞，和胃止痛
- E. 以上均非

6. 治疗呃逆气机郁滞证，应首选

- A. 竹叶石膏汤
- B. 橘皮竹茹汤
- C. 丁香散

D. 益胃汤 E.

五磨饮子

7. 治疗胃痛脾胃虚寒证，应首选

- A. 良附丸
- B. 黄芪建中汤
- C. 小建中汤 D.
- 理中丸

E. 附子理中丸 8.

气秘的治法是A.

通便止痛

- B. 益气润肠
- C. 润肠通便
- D. 顺气导滞
- E. 以上均非

9. 以下哪项是健忘的表现

- A. 神情呆滞
- B. 精神恍惚
- C. 善忘前事
- D. 告知不晓
- E. 智能减退

10. 鼓胀与下列哪些脏腑关系最为密切

- A. 肺. 肝. 肾
- B. 心. 脾. 肾
- C. 肺. 脾. 肾
- D. 肝. 脾. 肾
- E. 心. 脾. 肝

11. 内伤发热虚证的治疗原则不包括的是

- A. 清热
- B. 养血
- C. 滋阴
- D. 温阳
- E. 益气

12. 脾肾两虚型痴呆的治法是

- A. 补肾益髓，填精养神
- B. 健脾化浊，豁痰开窍
- C. 活血化瘀，开窍醒脑
- D. 益气养血，清心宣窍

E. 补肾健脾，益气生精

13. 冷哮咳痰特点

A. 臭脓痰

B. 痰稠黄胶黏

C. 痰少咯吐不爽，色白而多泡沫

D. 痰如白沫量多

E. 痰黄白相兼

14. 下列情况对胃痞和胸痹的鉴别诊断最具有价值者为

A. 诱因

B. 转归

C. 病位

D. 病程

E. 起病

15. 下列哪个部位是胃痞的基本病位

A. 肝胆

B. 脾胃

C. 肝脾

D. 脾

E. 胃

16. 咳嗽之风寒袭肺证，首选方剂是

A. 荆防达表汤

B. 沙参麦冬汤

C. 桑菊饮

D. 三拗汤合止嗽散

E. 桑杏汤

17. 肺痈初期，首选治疗方剂是

A. 沙参清肺汤

B. 桔梗杏仁煎

C. 银翘散

D. 《千金》苇茎汤

E. 加味桔梗汤

18. 下列各项，属淋证主要病理因素的是

A. 瘀血

B. 气滞

C. 正虚

D. 湿热

E. 痰浊

19. 下列各项，不属于黄疸病因的是

A. 病后续发

B. 情志内伤

C. 外感疫毒

D. 饮食不节

E. 劳倦

20. 胃痛脾胃虚寒证的疼痛特点为

A. 胀痛 B.

刀绞痛 C.

刺痛 D.

灼痛 E.

隐痛

21. 治疗颤证阳气虚衰证，应首选的方剂是

A. 人参养荣汤

B. 地黄饮子 C.

附子理中丸 D.

龟鹿二仙膏 E.

金匱肾气丸

22. 虚劳辨证中，首先要辨别的要点是

A. 辨明有无因虚致实的表现

B. 辨明原有疾病是否还继续存在

C. 辨别五脏气血阴阳亏虚

D. 辨本症与并发症

E. 是否兼夹外邪

23. 下列各项，不符合痿证临床特征的是

A. 肢体关节疼痛

B. 可有肌肉萎缩

C. 肢体筋脉弛缓

D. 肢体软弱无力

E. 肢体运动不利

24. 不属于消渴并发症的是

A. 水肿

B. 中风

C. 夜盲

D. 疮疖痈疽

E. 肺胀

25. 下列各项，不属腹痛病理因素的是

A. 食积

- B. 瘀血
- C. 风邪
- D. 气滞
- E. 火郁

26. 肝气犯胃型呕吐的特点是

- A. 清水
- B. 酸腐量多, 气味难闻
- C. 苦水. 黄水
- D. 浊痰涎沫
- E. 呕吐吞酸, 暖气频繁

27. 痴呆的病位在

- A. 肝
- B. 脾
- C. 心
- D. 肾
- E. 脑

28. 痴呆的基本病机为A.

- 以虚为本, 虚实夹杂B.
- 气滞血瘀, 痰浊内阻C.
- 阴精不足, 气血亏虚D.
- 髓海不足, 神机失用

E. 脏腑亏虚, 痰瘀内阻

29. 不寐的病位主要为A.

- 脾
- B. 肝
- C. 心
- D. 脑
- E. 肾

30. 不属心悸病理因素的是

- A. 寒凝
- B. 水饮
- C. 气滞
- D. 痰浊
- E. 血瘀

31. 十二经脉的命名主要是结合了哪几方面的内容

- A. 五行. 手足. 阴阳
- B. 手足. 阴阳. 五行

C. 脏腑. 手足. 阴阳

D. 脏腑. 手足. 五行

E. 阴阳. 五行. 脏腑

32. 上肢内侧面, 经脉从前到后正确分布顺序是

- A. 心包经. 心经. 肺经 B.
- 肺经. 大肠经. 小肠经C.
- 大肠经. 小肠经. 心经D.
- 肺经. 心经. 心包经
- E. 肺经. 心包经. 心经

33. 治疗落枕的主穴是

- A. 天柱. 肩井. 阿是穴. 肩贞
- B. 养老. 后溪. 合谷. 阳池. 风池 C.
- 阿是穴. 外关. 合谷. 肩井. 内关
- D. 外劳宫. 天柱. 阿是穴. 后溪. 悬钟E.
- 后溪. 外关. 束骨. 昆仑. 合谷

34. 治疗遗尿伴夜梦多, 除主穴外, 应加

- A. 百会. 神门 B.
- 脾俞. 内关 C.
- 肾俞. 内关 D.
- 肾俞. 肺俞 E.
- 肺俞. 足三里

35. 下列不属于足太阴经主治范围的是

- A. 肾病 B.
- 脾胃病C.
- 妇科病D.
- 口舌病E.
- 前阴病

36. 用俞募配穴法治疗胃病, 应选的穴位是

- A. 脾俞. 中脘 B.
- 胃俞. 中脘 C.
- 脾俞. 胃俞 D.
- 胃俞. 太白 E.
- 胃俞. 足三里

37. 位于耳前的耳门. 听宫. 听会三穴, 其所归属经脉分别是

- A. 胆经. 三焦经. 小肠经
- B. 三焦经. 胆经. 小肠经

C. 三焦经. 小肠经. 胆经

D. 胆经. 小肠经. 三焦经

E. 小肠经. 胆经. 三焦经

38. 下列哪项属于表里经配穴

A. 咳嗽取尺泽. 鱼际

B. 感冒取列缺. 合谷

C. 膝痛取阳陵泉. 足三里

D. 胃痛取中脘. 内庭

E. 痛经取地机. 隐白

39. 下列穴位与关元相平的是

A. 大赫

B. 大横

C. 外陵

D. 水道

E. 归来

40. 任脉之络的别称为

A. 俞府

B. 虚里

C. 鳩尾

D. 大包

E. 天池

41. 足太阴脾经的五输穴不包括

A. 地机

B. 商丘

C. 太白

D. 隐白

E. 大都

42. 下列哪项是脾经中用于治疗妇科疾病的常用穴位

A. 大横 B.

阴陵泉C.

地机 D.

公孙 E.

商丘

43. 十二经脉中, 相表里的阴经与阳经的交接部位在

A. 胸部 B.

腹部

C. 头部 D.

面部 E.

四肢部

44. 针灸治疗郁证的主穴不包括的是

A. 太冲

B. 水沟

C. 内关

D. 神门

E. 风池

45. 下列腧穴中, 可以治疗胆道蛔虫症的是

A. 手三里

B. 迎香 C.

商阳 D.

合谷 E.

阳溪

46. 在胸部, 距前正中线 4 寸循行的经脉是

A. 足太阴脾经 B.

手厥阴心包经C.

足少阴肾经 D.

足阳明胃经 E.

手太阴肺经

47. 在腹部, 脐中旁开 0.5 寸的腧穴是

A. 育俞

B. 天枢

C. 膏肓

D. 气海

E. 大横

48. 下列对百会穴的描述, 不正确的是

A. 可治疗气虚下陷证

B. 可用灸法

C. 位于头部, 前发际正中直上 7 寸

D. 可治疗神志病证

E. 可治疗头面病证

49. 在手指, 小指末节桡侧, 指甲根角侧上方 0.1 寸的腧穴是

A. 少商

B. 中冲

C. 少冲

- D. 少府
E. 少泽
50. 大包穴位于侧胸部腋中线上
- A. 当第 6 肋间隙处
B. 当第 7 肋间隙处
C. 当第 3 肋间隙处
D. 当第 4 肋间隙处
E. 当第 5 肋间隙处
51. 主客原络配穴指的是
- A. 阳经的原穴与后病的相表里阴经的络穴相配合
B. 同一条经脉的原穴与络穴相配合
C. 先病经脉的原穴与后病的相表里经脉的络穴相配合
D. 后病经脉的原穴与先病的相表里经脉的络穴相配合
E. 阴经的原穴与后病的相表里阳经的络穴相配合
52. 阴脉之海是指
- A. 任脉 B. 冲脉 C. 阴跷脉D. 阴维脉E. 带脉
53. 下列腧穴中，小肠的募穴是
- A. 神阙
B. 中脘
C. 中极
D. 关元
E. 气海
54. 位于足背第 2、3 趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处的腧穴是
- A. 太白
B. 然谷
C. 内庭
D. 行间
E. 侠溪
55. 胃阴不足型胃痛，除主穴外，还应加用
- A. 胃俞. 肺俞
B. 下脘. 梁门 C. 三阴交. 内庭D. 膈俞. 胃俞 E. 气海. 命门
56. 足少阴肾经的络穴是
- A. 复溜
B. 大钟
C. 涌泉
D. 然谷
E. 太溪
57. 不属于足太阳膀胱经的腧穴是
- A. 申脉
B. 攒竹
C. 大椎
D. 天柱
E. 昆仑
58. 治疗郁证的主穴是
- A. 百会. 印堂. 水沟. 内关. 神门. 太冲
B. 四神聪透百会. 神庭透上星
C. 内关. 神门. 巨阙
D. 照海. 申脉. 神门. 印堂. 神门. 百会
E. 内关. 水沟. 丰隆. 后溪. 照海
59. 下列各项中，不属于大椎穴主治病证的是
- A. 痢疾. 脱肛
B. 风疹. 痤疮
C. 热病. 疟疾
D. 项强. 脊痛
E. 癫狂. 惊风
60. 治疗鼻鼾应主选的是
- A. 局部腧穴. 手阳明经穴
B. 局部腧穴. 手太阴经穴
C. 局部腧穴. 足阳明经穴
D. 局部腧穴. 足少阴经穴
E. 局部腧穴. 手少阳经穴

61. 某患者尿血日久，体倦乏力，气短声低，面色不华，舌质淡，脉弱，治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 十灰散
- C. 小蓟饮子
- D. 知柏地黄丸
- E. 无比山药丸

62. 患者胸胁支满，心下痞闷，胃中有振水音，脘腹喜温畏冷，背寒，呕吐清水痰涎，水入易吐，口渴不欲饮，心悸，气短，头晕目眩，食少，形体逐渐消瘦，舌苔白滑，脉弦细而滑。其治法是

- A. 温化寒湿
- B. 逐水化饮
- C. 宣肺化饮
- D. 淡渗利水
- E. 温脾化饮

63. 患者低热，头晕眼花，身倦乏力，心悸不宁，面白少华，唇甲色淡，舌质淡，脉细弱。其主治方剂是

- A. 清骨散
- B. 补中益气汤
- C. 归脾汤
- D. 金匱肾气丸
- E. 以上均非

64. 患者，女性，31岁，症见入寐困难1个月，多梦，胸闷胁胀，急躁易怒，伴头晕头胀，口干口苦，小便短赤，舌红苔黄，脉弦数。治疗方剂是

- A. 泻心汤
- B. 当归龙荟丸
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 滋水清肝饮
- E. 礞石滚痰丸

65. 患者，女性，56岁。有15年肺胀病史，1周前劳累后出现面部水肿，呼吸喘促难续，心悸，胸脘痞闷，尿少，怕冷，纳呆，舌苔白滑，脉沉细。治疗应首选

- A. 参附汤

- B. 金匱肾气丸
- C. 济生肾气丸
- D. 真武汤合五苓散
- E. 实脾饮

66. 患者平素眩晕，耳鸣，突然发生口舌歪斜，舌强语蹇，半身不遂，但其神志清楚，舌红，脉弦细数。其治法是

- A. 平肝潜阳，活血通络
- B. 祛风化痰通络
- C. 息风清火，豁痰开窍
- D. 滋阴潜阳，息风通络
- E. 以上均非

67. 某患者，有哮喘反复发作史。气短声低，自汗，怕风，常易感冒，倦怠无力，食少便溏，或喉中时有轻度哮鸣，痰多质稀色白，舌质淡，苔白，脉细弱。其诊断是

- A. 虚喘，肺虚证
- B. 虚喘，肾虚证
- C. 哮病缓解期，肺脾气虚证
- D. 哮病缓解期，脾虚证
- E. 哮病缓解期，肾虚证

68. 患者腹内积块明显，硬痛不移，面黯消瘦，纳食减少，时有寒热，舌紫暗苔薄，脉细涩。其证候是

- A. 瘀血内结证
- B. 正虚瘀结证
- C. 肝气郁滞证
- D. 食滞痰阻证
- E. 气滞血阻证

69. 患者胃痛隐隐，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，神疲乏力，大便溏薄，舌淡苔白，脉虚弱。其治法是

- A. 清化湿热，理气和胃
- B. 化瘀通络，理气和胃
- C. 养阴益胃，和中止痛
- D. 温中健脾，和胃止痛
- E. 以上均非

70. 胸痹患者，女性，45岁。胸闷重而心痛微，痰多气短，肢体沉重，形体肥胖，遇阴雨天而易发作或加重，伴有倦怠乏力，纳呆便溏，咯吐痰涎，舌体胖大且边有齿痕，舌苔浊腻，脉滑。其证候是

- A. 寒凝气滞证
- B. 气虚血瘀证
- C. 饮邪上犯证
- D. 痰浊闭阻证
- E. 心血瘀阻证

71. 患者，男，46岁，头痛以前额为甚，面红，牙痛，便干，舌红苔黄，脉弦。处方用药加用白芷，其经络归属为

- A. 厥阴经
- B. 少阳经
- C. 太阳经
- D. 阳明经
- E. 少阴经

72. 张某，女性，28岁。10分钟前进食冰淇淋后，出现呃逆，呃声沉缓有力，胸膈及胃脘不舒，得热则减，口淡不渴，舌苔白润，脉迟缓。其诊断是

- A. 呃逆脾胃阳虚证
- B. 呃逆气机郁滞证
- C. 呃逆之胃寒气逆证
- D. 胃痛脾胃虚寒证
- E. 呃逆胃火上逆证

73. 李某，男性，40岁。反复胃脘疼痛8年，近2天，胃脘疼痛，似刀割，痛有定处，按之痛甚，痛时持久，食后加剧，入夜尤甚，黑便，舌质紫暗，脉涩。其治疗应首选的方剂是

- A. 身痛逐瘀汤
- B. 复元活血汤
- C. 血府逐瘀汤
- D. 失笑散合丹参饮
- E. 桃核承气汤

74. 张某，男，70岁。5年来时感眼前发黑，周围景物旋转，甚至无法站立，精神萎靡，腰酸膝软，两目干涩，耳鸣如蝉，舌红少苔，脉细数。其病证诊断是

- A. 眩晕肾精不足证
- B. 厥证之血厥
- C. 中风中经络之阴虚风动证
- D. 眩晕气血亏虚证
- E. 中风肝肾亏虚证

75. 李某，男性，35岁。7天前因外出淋雨，出现高热，时时振寒，汗出烦躁，咳嗽痰多。现症：胸满作痛，转侧不利，咳吐浊痰，呈黄绿色，自觉喉间有腥味，口干咽燥，舌苔黄腻，脉滑数。其诊断是

- A. 肺痈溃脓期
- B. 咳嗽痰热蕴肺证
- C. 肺痈初期
- D. 肺痈恢复期
- E. 肺痈成痈期

76. 患者，女性，40岁。咳嗽1个月，呈阵发性，咳时面赤，咽干口苦，常感痰滞咽喉而咯之难出，量少质黏，胸胁胀痛，咳时引痛，舌红，舌苔薄黄，脉弦数。此病证的治法是

- A. 滋阴润肺，化痰止咳
- B. 疏风清肺，润燥止咳
- C. 清热肃肺，豁痰止咳
- D. 燥湿化痰，理气止咳
- E. 清肺泻肝，顺气降火

77. 王某，女性，30岁。5天来每日一次寒战，发热，寒甚热微，呕吐腹泻，嗜睡不语，神志昏蒙，舌苔厚腻色白，脉弦。3周前曾去贵州旅游。治疗此病证首选的方剂是

- A. 加味不换金正气散
- B. 柴胡截疟饮
- C. 截疟七宝饮
- D. 何人饮
- E. 清瘴汤

78. 患者，女，40岁，精神抑郁，情绪不宁，胸部满闷，肋肋胀痛，痛无定处，脘闷暖气，不思饮食，大便不调，苔薄腻，脉弦。方药宜选

- A. 半夏厚朴汤
- B. 甘麦大枣汤
- C. 平胃散
- D. 丹栀逍遥散合左金丸
- E. 柴胡疏肝散

79. 林某，男性，18岁。3天来双膝关节。肌肉疼痛酸楚，屈伸不利，疼痛呈游走性，初起有恶风。发热。舌苔薄白，脉浮。此病证的证机概要

- A. 寒邪兼夹风湿，留滞经脉，闭阻气血
- B. 痰瘀互结，留滞肌肤，闭阻经脉
- C. 湿邪兼夹风寒，留滞经脉，闭阻气血
- D. 风邪兼夹寒湿，留滞经脉，闭阻气血
- E. 风湿热邪壅滞经脉，气血闭阻不通

80. 患者，女，60岁。年老体虚，近1年来，心悸气短，劳则尤甚，自汗面色（白光）白，头昏神疲，肢体无力，舌苔淡白，脉细软弱。治疗本病的首选方剂是

- A. 七福饮
- B. 加味四君子汤
- C. 天王补心丹
- D. 养心汤
- E. 大补元煎

81. 患者王某，男，36岁。呃声洪亮有力，冲逆而出，口臭烦渴，多喜冷饮，脘腹满闷，大便秘结，小便短赤，苔黄燥，脉滑数。诊断为

- A. 呃逆之气机郁滞证
- B. 呃逆之胃中寒冷证
- C. 呃逆之胃火上逆证
- D. 呃逆之脾胃阳虚证
- E. 呃逆之胃阴不足证

82. 患者，孙某。饮食稍多即吐，时作时止，面色（白光）白，倦怠乏力，喜暖恶寒，四肢不温，大便溏薄，舌质淡，脉濡弱。诊断为

- A. 呕吐之外邪犯胃证
- B. 呕吐之脾胃阳虚证
- C. 呕吐之痰饮内阻证
- D. 呕吐之肝气犯胃证
- E. 呕吐之胃阴不足证

83. 王某，女性，45岁。脘腹痞闷而胀，进食尤甚，拒按，噎腐吞酸，恶食呕吐，或大便不调，矢气频作，味臭如败卵，舌苔厚腻，脉滑。治疗应首选的方剂是

- A. 保和丸
- B. 越鞠丸
- C. 枳实导滞丸
- D. 平胃散
- E. 旋覆代赭汤

84. 张某，女，58岁。时常感到头痛，头痛隐隐，时时昏晕，心悸失眠，面色少华，神疲乏力，遇劳加重，舌质淡，苔薄白，脉细弱。其诊断是

- A. 痰浊头痛
- B. 肝阳头痛
- C. 肾虚头痛
- D. 瘀血头痛
- E. 血虚头痛

85. 患者，女，18岁。头痛昏蒙，兼胸闷脘胀，苔白腻，脉滑。治疗除主穴外，应配选

- A. 血海. 合谷
- B. 中脘. 丰隆
- C. 上星. 头维
- D. 百会. 通天
- E. 率谷. 太阳

86. 患者，男性，26岁。因夜吹风扇，晨起出现右颈项痛，转动受限，并向同侧肩部放射。针灸治疗除主穴外，宜选取

- A. 风池. 合谷
- B. 曲池. 合谷

- C. 血海. 膈俞
D. 合谷. 大椎
E. 风池. 内关
87. 患者, 女性, 23 岁。月经不调, 常提前 7 天以上, 甚至 10 余日一行。治疗应首选
A. 气海. 三阴交. 归来
B. 关元. 三阴交. 肝俞 C.
足三里. 脾俞. 太冲 D.
命门. 三阴交. 足三里 E.
关元. 三阴交. 血海
88. 患者, 男性, 62 岁。咳嗽一个月, 劳累后加重, 咳吐黏稠痰, 胸脘痞闷, 胃纳减少, 舌苔白腻, 脉濡滑。治疗除主穴外, 还应取
A. 尺泽. 列缺
B. 脾俞. 阴陵泉
C. 风门. 大椎 D.
丰隆. 阴陵泉 E.
脾俞. 胃俞
89. 患者, 男, 23 岁。目赤肿痛, 眼涩难开, 流泪, 畏光, 伴发热. 恶风. 头痛, 舌苔薄黄, 脉浮数。治疗除取主穴外, 还应加
A. 四白. 养老
B. 风池. 侠溪
C. 印堂. 内庭
D. 少商. 外关
E. 关冲. 支沟
90. 患者, 男, 45 岁, 天冷外出突觉心前区刺痛, 心痛彻背, 心慌汗出, 面色晦暗, 唇甲青紫, 舌质紫暗, 脉涩, 针灸治疗除主穴外, 应配
A. 内关. 阴郄
B. 心俞. 脾俞
C. 膻中. 心俞
D. 神阙. 关元
E. 神阙. 至阳
91. 患者体质素弱, 近 2 个月来, 呕吐时作时止, 倦怠乏力, 脘腹痛而喜温喜按, 舌苔薄白, 脉弱。治疗除主穴外, 应选用
A. 期门. 太冲
B. 脾俞. 胃俞
C. 丰隆. 公孙
D. 上脘. 胃俞
E. 梁门. 天枢
92. 患者突然出现左半身活动不利, 舌强语謇, 兼眩晕头痛, 烦躁, 舌红, 苔黄, 脉弦而有力。针灸治疗除主穴外, 应加用
A. 足三里. 气海
B. 太溪. 风池 C.
丰隆. 合谷 D.
曲池. 内庭 E.
太冲. 太溪
93. 患者, 女性, 35 岁。2 个月前突发高热, 热退后出现周身乏力, 并见下肢痿软无力, 食少纳呆, 腹胀便溏, 神疲乏力。治疗本病应选用主要经脉是
A. 手足阳明经穴. 夹脊穴
B. 手足太阳经穴. 夹脊穴
C. 手足太阴经穴. 夹脊穴
D. 手足厥阴经穴. 夹脊穴
E. 手足少阳经穴. 夹脊穴
94. 患者, 女性, 48 岁。失眠 1 年, 多梦少寐, 入睡迟, 易惊醒, 多疑善惊, 气短头晕, 舌淡, 脉弦细。治疗除选取主穴外, 应加用的腧穴是
A. 肝俞. 间使
B. 脾俞. 胃俞
C. 心俞. 胆俞
D. 心俞. 肾俞
E. 心俞. 脾俞
95. 患者, 男, 70 岁。右侧肢体活动不利 1 月, 神志清楚, 伴舌强语謇, 右侧口角下垂。治疗应首选的经穴是
A. 督脉. 手厥阴及足太阴经穴
B. 督脉. 手厥阴及足少阴经穴
C. 督脉. 手少阴及足太阴经穴
D. 督脉. 手少阴及足厥阴经穴
E. 督脉. 手少阴及足少阴经穴

96. 患者，女，66岁。夜间难以入睡2月，平素急躁易怒，时有心烦，舌红，苔黄，脉弦数。针刺选穴中具有调理阴阳、安神助眠作用的腧穴是

- A. 后溪. 太溪
- B. 后溪. 照海
- C. 列缺. 申脉
- D. 太溪. 申脉
- E. 照海. 申脉

97. 患者，男，79岁。哮喘反复发作，声低气怯，气息短促，体质虚弱，舌淡，脉细无力。治疗除相应背俞少外，还应选取的经穴是

- A. 手太阴. 手阳明经穴
- B. 手阳明. 足太阴经穴
- C. 手太阴. 足少阴经穴
- D. 手少阴. 足太阴经穴
- E. 手少阴. 足少阴经穴

98. 患者，女，26岁。产后乳少，乳房胀满疼痛，胸肋胀闷，舌红，苔薄黄，脉弦。除乳根、膻中、少泽外，应加取

- A. 太冲. 内关
- B. 外关. 肝俞
- C. 膈俞. 期门
- D. 中脘. 天枢. 期门 E. 足三里. 脾俞. 胃俞

99. 患者咽喉肿痛，咽干，口渴，便秘，舌红，苔黄，脉洪大。除少商、合谷、尺泽、关冲外，应加取

- A. 内庭. 关冲
- B. 厉兑. 天突
- C. 内庭. 鱼际
- D. 列缺. 照海
- E. 曲池. 鱼际

100. 患者，女，41岁。精神抑郁善忧，情绪不宁，伴咽中有物梗塞，舌苔白腻，脉弦滑。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 曲泉. 膻中. 期门
- B. 行间. 侠溪. 外关

C. 通里. 心俞. 三阴交

D. 太溪. 三阴交. 肝俞

E. 丰隆. 阴陵泉. 天突

101. 患者，女，52岁。月经时多时少，伴有心烦易怒，烘热汗出，腰膝酸软，舌质红，脉弦细。针灸治疗除主穴外，还应选取的配穴是

- A. 照海. 阴谷
- B. 风池. 太冲
- C. 关元. 命门
- D. 中脘. 丰隆
- E. 心俞. 神门

102. 患者，男，35岁。后腰肾区突发绞痛，向腹部、同侧阴囊放射，伴有排尿中断，尿血，舌红，苔黄腻，脉弦滑数。治疗除取主穴外，还应选用的穴位是

- A. 神阙. 关元
- B. 气海. 关元
- C. 太冲. 丘墟
- D. 胆俞. 至阳
- E. 委阳. 合谷

A3型题

患者男性，56岁，肢体颤动粗大，程度较重，不能自制，眩晕耳鸣，面赤烦躁，易激动，心情紧张时颤动加重，伴有肢体麻木，口苦而干，语言迟缓不清，流涎，尿赤，大便干，舌质红，苔黄，脉弦。

103. 该病诊断为

- A. 颤证
- B. 痹证
- C. 痿证
- D. 痫证
- E. 癲证

104. 该病治法为

- A. 平肝潜阳，熄风活络
- B. 舒筋止颤，镇肝熄风
- C. 填精补髓，育阴熄风
- D. 益气养血，濡养筋脉
- E. 清热化痰，平肝熄风

105. 该病代表方剂是 A.

导痰汤合羚角钩藤汤B.

人参养荣汤

C. 龟鹿二仙膏

D. 天麻钩藤汤合镇肝熄风汤加减

E. 地黄饮子

患者，女性，48岁。既往有焦虑、忧愁病史，常因情志抑郁起病。此次因与他人发生争执后，症状加重。遂来就诊。现症见：情绪不宁，心悸健忘，失眠多梦，五心烦热，盗汗，口咽干燥，舌红少津，脉细数。

106. 其中医诊断为

A. 郁证

B. 癲证

C. 痢证

D. 狂证

E. 虚火喉痹

107. 其中医辨证为

A. 心脾两虚证

B. 气郁化火证

C. 心肾阴虚证

D. 肝气郁结证

E. 心神失养证

108. 治疗宜首选的方剂是

A. 归脾汤

B. 天王补心丹

C. 羚角钩藤汤

D. 镇肝熄风汤

E. 甘麦大枣汤

109. 若心肾不交而见心烦失眠，多梦遗精者，可加用药物

A. 黄连、肉桂 B.

芡实、莲须 C.

芡实、金樱子D.

黄连、金樱子E.

黄柏、金樱子

患者于某，女性，58岁。两年前曾患“中风”，经治已愈，之后逐渐出现善忘呆滞，言语模糊不清，行为古怪孤僻，时哭时笑，症见两目黯晦，舌黯，脉细涩。

110. 其诊断是

A. 中风恢复期

B. 中风后遗症

C. 郁证

D. 健忘

E. 痴呆

111. 其辨证分型是

A. 髓海不足证

B. 瘀血内阻证

C. 风痰瘀阻证

D. 气虚络瘀证

E. 痰浊蒙窍证

112. 其治法是

A. 活血化痰，开窍醒脑

B. 豁痰开窍，健脾化浊

C. 祛风化痰，通络化瘀

D. 益气养血，化瘀通络

E. 搜风化痰，行瘀通络 113.

其治疗应首选的方剂是

A. 七福饮加减

B. 天麻钩藤饮加减

C. 涤痰汤加减

D. 通窍活血汤加减

E. 还少丹加减

患者，男，25岁。腹痛伴剧烈呕吐2天。病初腹痛呈阵发性加剧，曾吐出咖啡色物，已2天未进食，腹胀拒按，大便秘结，小便短黄，口燥咽干。2年前曾做过阑尾炎手术。检查：于脐旁可触到条索状肿物。舌质红，苔黄燥，脉滑数。

114. 其辨证是

A. 气滞腹痛证

B. 寒积腹痛证

C. 湿热壅滞证

D. 中阳不足证

E. 瘀血阻滞证

115. 其治法是

A. 理气止痛

B. 温中散寒，健脾和胃

C. 泻热通腑，行气导滞

D. 温补脾胃，缓急止痛

E. 活血化瘀

116. 治疗应首选的方剂是

A. 木香顺气散加减

B. 良附丸加减

C. 大承气汤加减

D. 黄芪建中汤加减

E. 少腹逐瘀汤加减

患者，男，50岁。1个月前因劳累过度出现形体倦怠，头晕恶心，纳食不佳，厌食油腻，过1周后两目黄染，随后皮肤亦黄，黄色尚鲜明，伴胁痛，脘胀，头重如裹，小便短黄，大便稀溏。舌苔黄腻，脉濡数。

117. 其辨证是

A. 热重于湿证

B. 湿重于热证

C. 寒湿阻遏证

D. 疫毒炽盛证

E. 脾虚湿滞证

118. 其治法是

A. 清热通腑，利湿退黄

B. 清热解毒，凉血开窍

C. 温中化湿，健脾和胃

D. 利湿化浊运脾，佐以清热

E. 健脾养血，利湿退黄

119. 治疗应首选的方剂是

A. 茵陈五苓散合甘露消毒丹

B. 《千金》犀角散

C. 茵陈术附汤

D. 茵陈蒿汤 E.

黄芪建中汤

120. 下列哪项不属于阳黄与阴黄鉴别要点的是

A. 病程较长与较短

B. 起病急与起病缓

C. 黄疸鲜明与晦暗

D. 小便黄与不黄

E. 热证与寒证

B 型题

A. 小便混浊，白如泔浆，尿道不痛B.

小便混浊，状如脂膏，尿热涩痛C.

发热，小便赤热，尿时灼痛

D. 排出砂石，排尿中断，腰酸绞痛E.

小腹胀满，尿涩疼痛，余沥不尽121.

膏淋的临床特点是

122. 尿浊的临床特点是

A. 左归丸 B.

大补元煎

C. 滋水清肝饮

D. 黄连阿胶汤

E. 二阴煎

123. 治肾精不足之眩晕首选

124. 治疗肾虚头痛首选

A. 暖气呃逆，呕吐痰涎

B. 水饮不下，面浮足肿

C. 胸膈痞胀，暖气则舒

D. 胸膈刺痛，痛处固定不移

E. 食道干涩，饮食难下

125. 噎膈痰气交阻证的主症特点是

126. 噎膈瘀血内结者的主症特点是

A. 黄芩. 黄连

B. 金钱草. 海金沙

C. 延胡索. 川楝子

D. 茵陈. 黄柏

E. 大黄. 芒硝

127. 胁痛肝胆湿热证，若兼见发热. 黄疸，应加用

128. 胁痛肝胆湿热证，如砂石阻滞胆道，应加用

- A. 地黄. 当归
- B. 银柴胡. 地骨皮
- C. 竹茹. 竹叶
- D. 天花粉. 川贝母
- E. 沙参. 玉竹

129. 肺痿虚热证, 出现虚烦. 呕逆者, 应加用

130. 肺痿虚热证, 出现津伤甚者, 应加用

- A. 五味子. 牡蛎. 浮小麦
- B. 党参. 白术
- C. 苍术. 牛膝. 黄柏. 薏苡仁
- D. 秦艽. 银柴胡. 白薇
- E. 黄芩. 栀子. 柴胡

131. 盗汗阴虚火旺证, 潮热甚者, 应加用的药物是

132. 自汗肺卫不固证, 气虚甚者, 应加用的药物是

- A. 枳实导滞丸
- B. 小柴胡汤 C.
- 厚朴温中汤D.
- 葛根芩连汤E.

枳术丸

133. 胃痛寒邪客胃证, 兼见有纳呆. 身重. 恶心欲吐. 苔白腻者, 可加

134. 胃痛饮食伤胃证, 胃脘胀痛而便秘者, 可用

- A. 石斛. 芦根 B.
- 金银花. 连翘C.
- 石膏. 郁金 D.
- 黄芩. 桑白皮E.
- 栀子. 黄连

135. 呃逆胃阴不足证, 若咽喉不利, 胃火上炎者, 应加用

136. 呃逆气机郁滞证, 若心烦口苦, 气郁化热者, 应加用

A. 病人呼气时进针, 吸气时出针

B. 进针时疾速刺入, 多捻转, 徐徐出针C.

进针时徐徐刺入, 少捻转, 疾速出针D.

出针时摇大针孔而不按

E. 病人吸气时进针, 呼气时出针

137. 属于疾徐补法操作的是

138. 属于呼吸泻法操作的是

- A. 四肢疼痛
- B. 全身疼痛
- C. 乳痈
- D. 咳嗽
- E. 瘾疹

139. 常用大包穴治疗的是

140. 常用血海穴治疗的是

- A. 神门
- B. 通里
- C. 少府
- D. 阴郛
- E. 少海

141. 在腕横纹上 0.5 寸, 尺侧腕屈肌腱的桡侧缘的腧穴是

142. 在腕横纹上 1 寸, 尺侧腕屈肌腱的桡侧缘的腧穴是

- A. 外踝高点上 3 寸, 腓骨前缘
- B. 外踝高点上 4 寸, 腓骨前缘
- C. 内踝前下方凹陷中, 当舟骨结节与内踝尖连线的中点处
- D. 外踝前下方, 趾长伸肌腱的外侧凹陷中E.
- 外踝高点上 2 寸, 腓骨前缘

143. 悬钟穴的定位是

144. 丘墟穴的定位是

- A. 目内眦
- B. 目外眦
- C. 目上 D.
- 目下 E.
- 鼻旁

145. 手少阳经与足少阳经相交接的部位是

146. 手太阳经与足太阳经相交接的部位是

- A. 先深后浅，轻插重提，提插幅度大，频率快，操作时间长
- B. 先浅后深，重插轻提，提插幅度小，频率慢，操作时间短
- C. 病人吸气时进针，呼气时出针
- D. 出针时摇大针孔而不按压
- E. 出针后迅速按压针孔

147. 属于提插补法操作的是

148. 属于开阖补法操作的是

- A. 陷下则灸之
- B. 热则疾之
- C. 寒则留之
- D. 标本同治
- E. 三因制宜

149. 以上哪项属于补虚泻实的治疗原则

150. 以上哪项属于治病求本的治疗原则

E. 张介宾

4. 脾失统摄，冲任不固可导致的妇科疾病是

- A. 经期延长
- B. 带下臭秽
- C. 经行吐衄
- D. 痛经
- E. 闭经

5. 经行乳房胀痛肝气郁结证的治法是

- A. 疏肝解郁，行气止痛
- B. 疏肝理气，和胃通络
- C. 疏肝解郁，活血止痛
- D. 疏肝理气，柔肝止痛
- E. 疏肝解郁，养血止痛

6. 治疗经行浮肿脾肾阳虚证，应首选的方剂是

- A. 参苓白术散
- B. 二仙汤合苓桂术甘汤
- C. 肾气丸合苓桂术甘汤
- D. 金匮肾气丸
- E. 右归丸合苓桂术甘汤

7. 治疗经行浮肿气滞血瘀证，应首选的方剂是

- A. 四物汤
- B. 八物汤
- C. 逍遥散
- D. 四神丸合健固汤
- E. 六味地黄丸

8. 治疗经断复来血热证，应首选的方剂是

- A. 安老汤
- B. 知柏地黄丸
- C. 益阴煎
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 易黄汤

9. 妊娠小便不通气虚证的代表方剂为

- A. 导赤散
- B. 加味五苓散
- C. 补中益气汤
- D. 益气导溺汤

第四单元

1. 治疗经行头痛血虚证，应首选的方剂是A.

归脾汤

- B. 补中益气汤
- C. 八珍汤
- D. 十全大补汤
- E. 人参养荣汤

2. 滑胎之肾阳亏虚证的主治方剂

- A. 补肾固冲丸
- B. 育阴汤
- C. 肾气丸
- D. 安奠二天汤
- E. 以上均非

3. 持“阳非有余，阴常不足”学术观点的医家是

- A. 薛己
- B. 陈自明
- C. 赵献可
- D. 陈修园

- E. 肾气丸
10. 治疗阴疮寒湿证，应首选的方剂是A.
仙方活命饮
B. 龙胆泻肝汤
C. 蛇床子散 D.
萆薢渗湿汤E.
托里消毒散
11. 月经产生机制是
A. 肾气. 天癸. 冲任. 经络协调作用于胞宫B.
脏腑. 天癸. 气血. 经络协调作用于胞宫C.
肾气. 天癸. 气血. 冲任调作用于胞宫 D.
脏腑. 气血. 天癸. 冲任调作用于胞宫
E. 脾胃. 气血. 冲任. 经络调作用于胞宫
12. 分泌晚期，子宫内膜正常厚度为 A.
子宫内膜厚达 3mm
B. 子宫内膜厚达 5mm
C. 子宫内膜厚达 7mm
D. 子宫内膜厚达 8mm
E. 子宫内膜厚达 10mm
13. 小儿稚阴稚阳学说，是指其生理状态为A.
脏气清灵，易趋健康
B. 脾常不足，肝常有余
C. 阳常有余，阴常不足
D. 脏腑娇嫩，形气未充
E. 生机蓬勃，发育迅速
14. 治疗蛔虫病肠虫证，应首选的方剂是
A. 乌梅丸 B.
驱虫粉 C.
使君子散D.
化虫丸 E.
追虫丸
15. 7 周岁小儿的身长应为
A. 95cm
B. 100cm
C. 105cm
D. 124cm
E. 90cm
16. 尿频脾肾气虚证的症状特点是
A. 起病急，小便频数，滴沥不尽，小腹坠胀B.
病程长，小便频数，尿液清晰
C. 病程长，小便频数，尿急，尿痛
D. 病程长，小便频数，滴沥不尽，纳差畏寒E.
病程长，小便频数短赤，五心烦热
17. 治疗小儿厌食脾失健运证，应首选的方剂是
A. 异功散
B. 平胃散
C. 不换金正气散
D. 保和丸
E. 健脾丸
18. 治疗小儿厌食脾胃气虚证，应首选的方剂是
A. 补中益气汤 B.
不换金正气散C.
保和丸
D. 异功散 E.
四君子汤
19. 小儿遗尿的病机主要是
A. 肝经郁热，疏泄失司
B. 脾肾气虚，下元不固
C. 肾气不足，膀胱虚寒
D. 肺脾气虚，水道失约
E. 心肾失交，水火不济
20. 小儿睡时露睛，属于
A. 脾胃不和
B. 肝脾不和
C. 脾虚气弱
D. 胃气不降
E. 肾不纳气
21. 乳蛾热毒炽盛证应首选的方剂是
A. 银翘马勃散
B. 牛蒡甘桔汤
C. 养阴清肺汤
D. 普济消毒饮
E. 荆防败毒散

22. 反复呼吸道感染最常见的发病年龄是

- A. 2~3 岁
- B. 1~3 岁
- C. 6 个月~3 岁
- D. 6 个月~6 岁
- E. 2~5 岁

23. 患儿, 3 岁。闻爆竹巨响后出现惊惕不安, 身体战栗, 间断抽搐伴神志不清, 大便色青, 脉律不整。治疗应首选的方剂是

- A. 清瘟败毒饮
- B. 羚角钩藤汤
- C. 天麻钩藤饮
- D. 大定风珠 E.

琥珀抱龙丸

24. 以下哪个不是小儿腹痛发病原因

- A. 腹部中寒
- B. 乳食积滞
- C. 胃肠热结
- D. 脾胃虚寒
- E. 外邪犯肺

25. 不适合用清热法治疗的是

- A. 流痰后期, 阴虚火旺, 虚热不退者 B.

药物性皮炎皮损色红灼热

- C. 局部红. 肿. 热. 痛 D.

热毒内传之走黄内陷

- E. 疮色晦暗不泽, 皮温较低

26. 疮疡疾患中, 部位表浅, 范围较小的急性化脓性疾病是

- A. 疔
- B. 发 C.

流注

- D. 有头疽
- E. 无头疽

27. 中医外科学中, 温阳托毒法的代表方剂是

- A. 右归丸
- B. 托里消毒散
- C. 金匱肾气丸

- D. 六君子汤 E.

神功内托散

28. 疔的病因病机

- A. 内郁湿火, 外感风邪
- B. 营卫不和, 气血凝滞
- C. 汗出不畅, 湿热蕴蒸肌肤
- D. 搔抓疔子, 破伤染毒
- E. 感受暑毒

29. 属于瘾疹的特点是

- A. 呈带状分布的红斑上成簇的水疱
- B. 大小不等的风团, 色鲜红, 骤起骤退
- C. 皮肤上浅在性脓疱和脓痂
- D. 皮肤油腻, 出现红斑, 覆有鳞屑 E.

对称分布, 多形损害, 剧烈瘙痒

30. 桃红四物汤宜用于脱疽的哪一证型

- A. 气阴两虚证
- B. 血脉瘀阻证
- C. 热毒伤阴证
- D. 寒湿阻滞证
- E. 湿热毒盛证

31. 颜面疔的内治治疗大法, 主要是

- A. 行瘀活血
- B. 透脓托毒
- C. 清热解毒
- D. 散风清热
- E. 调补气血

32. 关于白秃疮, 说法错误的是

- A. 头皮有覆盖灰白色鳞屑的斑片
- B. 毛发干枯无光泽
- C. 发缘处一般不被累及
- D. 可形成永久性脱发
- E. 病发根部有白色菌鞘包绕 33.

脂瘤痰湿化热证最佳选方为 A.

丹栀逍遥散

- B. 清肝芦荟丸

C. 化痰开郁方

- D. 芩连二母丸合凉血地黄汤

- E. 龙胆泻肝汤合仙方活命饮
34. 脂溢性皮炎肠胃湿热证最佳方药为A.
五味消毒饮
B. 通窍活血汤
C. 四物汤合六味地黄汤
D. 消风散合当归饮子
E. 参苓白术散合茵陈蒿汤
35. 精癯脾肾气虚证, 采用的治疗方药为A.
补中益气汤
B. 八正散
C. 沉香散
D. 知柏地黄丸
E. 济生肾气丸
36. 石瘕应首选的治疗原则是
A. 早期, 中药外敷
B. 早期, 中药内治
C. 早期化学治疗 D.
早期手术切除 E.
早期放射治疗
37. 自然疫源性传染病是
A. 患者
B. 病原携带者
C. 隐性感染者
D. 家禽
E. 野生动物
38. 中毒型菌痢好发年龄是
A. 青壮年
B. 10~14 岁
C. 2~7 岁
D. 2 岁以下
E. 老年
39. 有关乙型肝炎流行特征的叙述, 不正确的是
A. 重叠感染 HDV 易演变为重型肝炎
B. 发病无明显季节性
C. 多为散发
D. HBsAg 携带者男性多于女性
E. 家庭集聚现象少见
40. 戊型肝炎病毒为
A. 杯状病毒
B. 嗜肝 DNA 病毒
C. 黄病毒
D. 单股正链 RNA
E. 缺陷的负链 RNA 病毒
41. 下列有关脑膜炎奈瑟菌的叙述, 正确的是
A. 革兰阴性杆菌, 在体外存活力强 B.
革兰阴性双球菌, 在体外存活力低C.
革兰阴性球菌, 在体外存活力强 D.
革兰阳性双球菌, 在体外存活力低E.
革兰阳性双球菌, 在体外存活力强
42. 下列各项除哪项外均是丙型肝炎的传播途径
A. 静脉药瘾者
B. 性接触
C. 血液透析者
D. 肾移植者 E.
粪-口
43. 下列有关流脑传染源的叙述, 不正确的是
A. 人不是唯一宿主
B. 带菌者是重要的传染源
C. 患者是本病的传染源 D.
流行期间以 A 群为主
E. B 和 C 群以散发为主
44. 下列有关消毒方法的描述, 不正确的是
A. 高效消毒法能杀灭一切细菌繁殖体
B. 中效消毒法能杀灭除细菌芽孢以外的各种微生物
C. 低效消毒法只能消灭细菌繁殖体. 部分真菌和亲脂性病毒
D. 灭菌法可以杀灭包括细菌芽孢的一切微生物
E. 超声波消毒法属于低效消毒法
45. 属于随时消毒的是
A. 传染病患者的尸体处理

- B. 传染病室日常消毒
- C. 传染病患者转科后病室的消毒
- D. SARS 患者入院后对其原居住地的消毒
- E. 传染病患者出院后对其所用物品的消毒
46. 下列肝功能检查指标中, 对诊断重型肝炎有重要意义的是
- A. 胆碱酯酶下降 B. 血清胆红素升高 C. 胆酶分离
- D. 凝血酶原活动度 (PTA) $\leq 40\%$
- E. 血清白/球比值倒置
47. 下列有关霍乱补液治疗的叙述, 错误的是
- A. 轻、中型患者可予以口服补液
- B. 重型患者按常规浓度积极补充氯化钾 C. 静脉补液多采用 5:4:1 溶液
- D. 最初 24 小时重型患者的补液量为 8000~12000ml
- E. 补液原则是早期、快速、足量, 先盐后糖, 先快后慢, 见尿补钾
48. 预防肺结核的最主要措施是
- A. 禁止随地吐痰
- B. 隔离和有效治疗排菌患者
- C. 健全防痨组织
- D. 加强登记管理
- E. 接种卡介苗, 化疗
49. 发生传染病暴发时, 要求有关单位向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告的时限为
- A. 1 小时内
- B. 2 小时内
- C. 3 小时内
- D. 4 小时内
- E. 5 小时内
50. 中医诊断开办错误的是
- A. 中医诊所应当将本诊所的诊疗范围在诊所的明显位置公示
- B. 中医医师的姓名在诊所的明显位置公示
- C. 中医诊所的执业范围在诊所的明显位置公示
- D. 设备完善的情况下可进行外科手术治疗 E. 需将诊所的名称、地址、诊疗范围、人员配备情况等报所在地县级人民政府中医药主管部门备案
51. 未经批准擅自开办医疗机构行医应承担的行政责任主要是
- A. 经济补偿
- B. 赔礼道歉
- C. 赔偿责任
- D. 行政处分
- E. 行政处罚
52. 属于医技人员行为规范的是
- A. 使用适宜诊疗技术和药物
- B. 不违规进行试验性医疗
- C. 竭诚协助医生诊治, 密切观察
- D. 严格遵循临床诊疗规范和技术操作规范 E. 指导和帮助患者配合检查, 耐心帮助患者查询结果
53. 以下属于二级医疗负责指导医疗纠纷人民调解工作的部门是
- A. 县级以上人民政府
- B. 卫生主管部门
- C. 司法行政部门
- D. 公安机关
- E. 财政、民政、保险监督管理部门
54. 以下各项, 属于药学技术人员行为规范的是
- A. 规范书写, 妥善保存病历材料
- B. 不违规签署医学证明文件
- C. 使用适宜诊疗技术和药物 D. 认真履行处方审核调配职责
- E. 严格执行医嘱

【正确答案】 D

【答案解析】 药学技术人员行为规范: 第三十六条认真履行处方审核调配职责, 坚持查对制度, 不得对方所列药品擅自更改或

代用。

二、A₂型选择题（55 ~ 87题）

答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

55. 患者月经周期延后，量少，色暗淡，质清稀，平时带下清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，面色晦暗；舌淡，苔薄白，脉沉细。其证候是

- A. 虚寒证
- B. 肾虚证
- C. 气滞证
- D. 血瘀证
- E. 血虚证

56. 患者月经先后无定期，经量或多或少，色黯红或经行不畅；胸胁、乳房、少腹胀痛，腕闷不舒，时叹息，暖气食少；苔薄白，脉弦。其证候是

- A. 肝郁证
- B. 肾虚证
- C. 脾虚证
- D. 肝郁肾虚证
- E. 以上均非

57. 患者经血过期不净，量多，色淡，质稀；倦怠乏力，气短懒言，小腹空坠。面色（白光）白；舌淡，苔薄，脉缓弱。其治法是A. 补气摄血，固冲调经

- B. 健脾养血，调经止血
- C. 补益脾肾，摄血固冲
- D. 健脾益气，调经止血
- E. 健脾固冲，养血止血

58. 患者下腹部肿块，疼痛月余，伴低热，经血量多，带下量多，色黄如脓；身热口渴，心烦不宁，大便秘结，小便黄赤。妇检盆腔右侧触及鸭卵大包块，形不整，触压痛阳性；舌红苔黄，有瘀斑，脉弦滑数。其治法是

- A. 清热利湿，缓急止痛

- B. 清热解毒，利湿止带
- C. 清热利湿，化瘀消癥
- D. 清热利湿，消癥止血
- E. 清热利湿，止血调经

59. 患者，女性，30岁，已婚。患崩漏1余年，经血非时而至，经量甚多，色淡，质稀，面色苍白，气短懒言，纳呆便溏，舌淡苔薄白，脉沉弱。其证候是

- A. 血瘀证 B. 脾虚证 C. 肾阴虚 D. 肾阳虚 E. 以上均非

60. 陈某，女，婚后5年未怀孕，月经多推后几天，经来小腹胀痛，经色紫黯，有血块，块下痛减，有时经行不畅；伴见肛门坠痛，性交痛；舌质紫黯，脉弦细涩。治疗选用

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 苍附导痰丸
- C. 百灵调肝汤
- D. 养精种玉汤
- E. 以上均非

61. 已婚女性，26岁。月经延后2周，量少，色淡，质稀，心悸少寐，小腹绵绵作痛，面色苍白，舌淡苔薄白，脉细弱。治疗应首选A. 大补元煎

- B. 十全大补汤
- C. 人参养营汤
- D. 补中益气汤
- E. 四君子汤

62. 患者张某，经期烦躁易怒，头晕目眩，口苦咽干，胸肋胀满，不思饮食，月经量多，色深红，舌红，苔黄，脉弦数。其治法是 A. 清肝泄热，解郁安神

- B. 清热化痰，宁心安神
- C. 补血养心，安神定志
- D. 祛痰通络，安神定志
- E. 以上均非

63. 患者每值月经前后，大便泄泻，或五更泄泻，经色淡，质清稀；腰膝酸软，头晕耳鸣，畏寒肢冷；舌淡，苔白，脉沉迟。中医治法可采用

- A. 健脾和胃，益气和血
- B. 疏肝健脾，燥湿止泻
- C. 温阳补肾，健脾止泻
- D. 健脾渗湿，理气调经
- E. 以上均非

64. 患者带下量多，色黄，如豆渣状，阴部瘙痒；腕闷纳差，舌红，苔黄腻，脉滑数。其治法是

- A. 健脾益气，升阳除湿
- B. 温肾培元，固涩止带
- C. 滋肾益阴，清热利湿
- D. 清热利湿，疏风化浊
- E. 清利湿热，佐以解毒杀虫

65. 患者，女，25岁，未婚。近半年经前，经期小腹胀痛，经血量少，行而不畅，血色黯有块，块下痛减，伴经行情志抑郁，乳房胀痛，舌紫暗，有瘀斑，脉弦涩。治疗应首选的方剂是

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 当归芍药散
- C. 调肝汤
- D. 圣愈汤
- E. 膈下逐瘀汤

66. 患儿，3岁。平素饮食肥甘厚味，现症见汗出，以自汗为主，以额、心胸为甚，汗出肤热，汗渍色黄，口臭，口渴不欲饮，小便色黄，舌质红，苔黄腻，脉滑数。诊断为汗证，其治法为

- A. 益气养阴
- B. 调和营卫
- C. 益气固表
- D. 清热泻脾
- E. 清热固表

67. 患儿，5岁。诊断为猩红热，现壮热不解，烦躁口渴，咽喉肿痛，伴有糜烂白腐，皮疹密布，色红如丹，疹由颈、胸开始，继而弥漫全身，压之退色，舌面光红起刺，状如草莓，脉数有力。治疗首选的方剂是

- A. 益胃汤
- B. 沙参麦冬汤
- C. 竹叶石膏汤
- D. 增液承气汤
- E. 凉营清气汤

68. 患儿，3岁，诊断为肺炎喘嗽，证见咳嗽日久不愈，伴有低热盗汗，手足心热，干咳少痰，面色潮红，口干便结，舌红少津，脉细数。其中医辨证为

- A. 肺脾气虚证
- B. 阴虚肺热证
- C. 气阴两虚证
- D. 风热郁肺证
- E. 毒热闭肺证

69. 患儿，4岁。突然出现神昏惊厥，伴发热头痛，咳嗽流涕，咽红，舌苔薄黄，脉象浮数。治疗应首选的方剂是

- A. 桑菊饮
- B. 紫雪丹
- C. 柴葛解肌汤
- D. 银翘散
- E. 银翘散合羚角钩藤汤

70. 患儿，2岁。患有痫证，起病前常有惊吓史。每次发作时惊叫，吐舌，急啼，面色时红时白，惊惕不安，四肢抽搐，大便黏稠，舌淡红，舌苔白，指纹色青。治疗应首选的方剂是

- A. 镇惊丸
- B. 涤痰汤
- C. 定痫丸
- D. 远志丸
- E. 定魄丸

71. 患儿，7岁，男。症见多动难静，急躁易怒，冲动任性，难以自控，神思涣散，注意力不集中，难以静坐，伴有遗尿、腰酸乏力。舌质红，舌苔薄，脉细弦。治疗应首选方剂是

- A. 清心涤痰汤
- B. 黄连温胆汤
- C. 龙胆泻肝汤
- D. 泻心导赤散
- E. 杞菊地黄丸

72. 患儿，8个月。晨起啼哭不安，阵阵捧腹啼叫，已解清稀大便3次，便多泡沫，臭气轻，可闻肠鸣，恶寒发热，鼻流清涕，指纹淡红。其证候是

- A. 脾虚泻
- B. 脾肾阳虚泻
- C. 湿热泻
- D. 风寒泻
- E. 伤食泻

73. 患儿，1岁。形体消瘦显著，面色萎黄，食欲不振，肚腹膨胀，青筋暴露，毛发稀疏结穗，精神烦躁，夜卧不宁，舌淡苔腻，脉沉细而滑。诊断为疳证，治疗宜用

- A. 健脾丸
- B. 资生健脾丸
- C. 消食导滞丸
- D. 肥儿丸
- E. 八珍汤

74. 患儿流涕、咳嗽4天后，高热不退咳嗽喘促，鼻扇，喉中痰声漉漉，口唇发绀。其证A. 痰热咳嗽

- B. 心阳虚衰
- C. 风寒闭肺
- D. 风热闭肺
- E. 痰热闭肺

75. 患儿，3岁。面色苍白，神疲乏力，发黄稀疏，消瘦3个月，诊断为营养性缺铁性贫血。选用铁剂治疗时，正确的停药时间为A. 血红蛋白恢复至正常后4个月左右

B. 血红蛋白恢复至正常后6个月左右

C. 血红蛋白开始升高时

D. 血红蛋白恢复正常时

E. 血红蛋白恢复至正常后2个月左右

76. 患儿，1岁，患有奶麻，现身热已退，肌肤出现玫瑰红色小丘疹，皮疹始见于躯干部，很快延及全身，约经1~2天皮疹消退，肤无痒感，舌质偏红，苔薄少津，指纹淡紫。其治法为

- A. 辛凉解表，清宣肺卫
- B. 清热解毒，解表透疹
- C. 疏风清热，解表透疹
- D. 清热解毒，凉血透疹
- E. 清热生津，以助康复

77. 患者，女性，28岁，产后乳房胀痛，位于乳房外上方皮肤嫩红，肿块形似鸡卵，压痛明显，按之中软，有波动感，伴壮热口渴。切开引流的部位及切口是

- A. 以乳头为中心的弧形切口
- B. 脓肿波动明显处做切口
- C. 循乳络方向做放射状切口
- D. 乳晕旁弧形切口
- E. 脓肿处做任意切口

78. 患者，男，40岁。急性子痛2天，左侧附睾肿大疼痛，阴囊皮肤红肿，焮热疼痛，少腹抽痛，舌红苔黄腻，脉滑数，治疗方剂为

- A. 橘核丸
- B. 枸橘汤
- C. 透脓散
- D. 滋阴除湿汤
- E. 萆薢化毒汤

79. 患者，男，65岁。颈部肿块溃破年余，长期渗流脓血，不能愈合，疮面苍白水肿，肉芽高低不平，赘肉翻花。伴低热，乏力，消瘦等。舌质淡，苔白或无苔，脉沉细。治疗应首选

- A. 归脾汤
- B. 香贝养荣汤

C. 和营散坚丸

D. 开郁散

E. 八珍汤合四妙勇安汤

80. 患者王某，患有筋瘤，久站久行或劳累时瘤体增大，下坠不适感加重；常伴气短乏力，脘腹坠胀，腰酸；舌淡，苔薄白，脉细缓无力。辨证为

A. 寒湿凝筋证

B. 外伤瘀滞证

C. 湿热下注证

D. 劳倦伤气证

E. 血瘀阻滞证

81. 患者，右足怕冷，麻木、疼痛，间歇性跛行年余。近两个月来足痛加剧，夜难入寐，步履艰难，足背动脉搏动消失。应诊断为 A. 痹证

B. 脱疽

C. 糖尿病足

D. 下肢静脉炎

E. 雷诺综合征

82. 患者王某，便时肛内常有肿物脱出，色紫黯，甚则表面溃破、糜烂，肛门坠痛，肛内指检有灼热感。舌红，苔黄腻，脉弦数。治疗宜选用

A. 萆薢渗湿汤

B. 补中益气汤

C. 马勃散

D. 升麻葛根汤

E. 以上均非

83. 患者外生殖器出现疣状赘生物，色灰，质软，表面秽浊潮湿，触之易出血，恶臭；伴小便黄或不畅；苔黄腻，脉滑或弦数。其证候是

A. 血脉瘀阻证

B. 湿热壅盛证

C. 营血两伤证

D. 邪毒内陷证

E. 湿毒下注证

84. 患者，被毒蜂叮咬后引发皮炎，皮疹较多，成片红肿，水疱较大，瘀斑明显，皮疹附近髂核肿大；伴畏寒，发热，头痛，恶心，胸闷；舌红，苔黄，脉数。治疗方剂为

A. 龙胆泻肝汤

B. 五味消毒饮合黄连解毒汤

C. 萆薢化毒汤合黄连解毒汤

D. 萆薢渗湿汤合龙胆泻肝汤

E. 清瘟败毒饮合黄连解毒汤

85. 患者，女，46岁。肛门部突然剧烈疼痛，肛缘皮下有一触痛性肿物，排便、坐下、行走，甚至咳嗽等动作均可使疼痛加剧。其诊断是 A. 静脉曲张性外痔

B. 结缔组织性外痔

C. 血栓性外痔

D. 混合痔 E. 内痔脱出

86. 患者尿路结石，发病急骤，腰腹疼痛，尿流突然中断，尿频，尿急，尿赤，血尿，舌红，苔黄腻，脉弦数。治疗应首选的方剂是

A. 济生肾气丸

B. 龙胆泻肝汤

C. 化坚二陈丸合石韦散

D. 三金排石汤

E. 金铃子散合石韦散

87. 患者，男，38岁。左足大趾剧痛，日轻夜重，局部肿胀，皮肤紫暗，溃破腐烂，身热口干，舌红，苔黄腻，脉弦数。其辨证是

A. 寒湿阻络证

B. 血脉瘀阻证

C. 湿热毒盛证

D. 热毒伤阴证

E. 气阴两虚证

三、A₃型选择题（88～114题）

答题说明：以下提供若干个案例，每个案例下设3道考题。请根据题干所提供的信息，在每一道考题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答

题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

患者，女，35岁。经前小腹冷痛拒按，得热痛减，月经推后，量少，经色黯而有瘀块，面色青白，肢冷畏寒，舌黯，苔白，脉沉紧。88. 根据患者症状此病辨证为

- A. 肾阳虚证
- B. 虚寒证
- C. 气血虚弱证
- D. 阳虚内寒证
- E. 寒凝血瘀证

89. 此病治疗时的治法是

- A. 温经扶阳，暖宫止痛
- B. 温经散寒，化瘀止痛
- C. 温经散寒，活血调经
- D. 温肾益气，固冲调经
- E. 活血化瘀，暖宫止痛

90. 治疗采用的代表方为

- A. 清热固经汤
- B. 逐瘀止血汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 温经汤
- E. 固冲汤

患者，女，27岁，未婚。月经周期33天，经期持续8~10余日，量少，色红，质稠，手足心热；舌红，少苔，脉细数。伴行经腹痛隐隐。平时乳房胀痛。

91. 应首先考虑的是

- A. 行经乳房胀痛
- B. 月经后期
- C. 经期延长
- D. 痛经
- E. 崩漏

92. 辨证为

- A. 虚热证
- B. 血瘀证
- C. 气虚证
- D. 气郁证

E. 肾虚证

93. 首选治法为A.

- 养阴清热止血B.
- 补气摄血调经C.
- 养血益气调经D.
- 活血祛瘀止血E.
- 补肾益精止血

患者，女，33岁，已婚。经血非时而下，淋漓不尽，色紫暗，有块，小腹胀痛，舌紫苔薄白，脉涩。

94. 辨病为

- A. 崩漏
- B. 经间期出血
- C. 经期延长
- D. 月经先后无定期
- E. 痛经

95. 辨证为

- A. 血瘀证
- B. 脾虚证
- C. 虚热证
- D. 肾虚证
- E. 气虚证

96. 治疗首选

- A. 固冲汤
- B. 固本止崩汤
- C. 右归丸
- D. 清热固经汤
- E. 逐瘀止血汤

患儿，2岁。发热咳嗽2天，高热烦躁，咳嗽喘促，气急鼻煽，呼吸困难，突见面色苍白，口唇紫绀，精神萎靡，肋下痞块，舌质紫，苔薄白，指纹紫滞。

97. 根据患者症状此病辨证为

- A. 风热闭肺
- B. 毒热闭肺
- C. 邪陷厥阴

D. 心阳虚衰

E. 痰热闭肺

98. 治疗宜采用的治法为

A. 辛温宣肺，化痰止咳。

B. 温补心阳，救逆固脱C.

清心开窍，平肝息风D.

补肺益气，健脾化痰

E. 清热涤痰，开肺定喘

99. 治疗采用的代表方为

A. 麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤

B. 人参五味子汤

C. 参附龙牡救逆汤

D. 羚角钩藤汤合牛黄清心丸

E. 麻杏石甘汤

患儿，1岁。昨起舌上溃破，舌红疼痛，进食哭闹，心烦不安，口干欲饮，小便短赤。舌尖红，苔薄黄，脉数，指纹紫。

100. 诊断为

A. 口疮

B. 厌食

C. 积滞

D. 夜啼

E. 鹅口疮

101. 辨证为

A. 风热乘脾证

B. 心火上炎证

C. 虚火上浮证

D. 心脾积热证

E. 脾胃气虚证

102. 治疗首选

A. 泻心导赤散

B. 凉膈散

C. 清胃散

D. 泻心汤

E. 六味地黄丸

患儿，7岁。咳嗽喘促3小时。证见恶寒发热，咳嗽，喘促气急，喉间痰鸣，鼻塞，流清涕，咯痰黄稠，烦躁，口渴，大便干，舌红，苔白，脉浮紧。

103. 根据患者症状此病辨证为

A. 风寒束肺证

B. 外寒内热证

C. 肺实肾虚证

D. 肺肾阴虚证

E. 肺脾气虚证

104. 治疗宜采用的治法为

A. 补肺固表，健脾益气

B. 温补脾肾，固摄纳气

C. 解表清里，止咳定喘

D. 养阴清热，敛肺补肾

E. 温肺散寒，涤痰定喘

105. 治疗采用的代表方为

A. 麻黄汤

B. 华盖散

C. 麻杏石甘汤

D. 大青龙汤

E. 小青龙汤

患者肉瘦，急躁易怒，汗出心悸，失眠多梦，消谷善饥，形体消瘦，手部震颤。舌红，苔薄，脉弦。

106. 辨证为

A. 肝郁气滞证

B. 气滞痰凝证

C. 气阴两虚证

D. 肝肾不足证

E. 冲任失调证

107. 治法为

A. 理气解郁，化痰散结

B. 益气养阴，软坚散结

C. 疏肝解郁，化痰软坚

D. 调摄冲任，理气散结

E. 调补气血，清热解毒

108. 治疗应选代表方剂为

- A. 生脉散合海藻玉壶汤
- B. 逍遥散合海藻玉壶汤
- C. 二仙汤合开郁散
- D. 逍遥萎贝散
- E. 人生养荣汤

患者，女，52岁。肉瘿病史3年，近来颈前肿块突然增大，质地坚硬如石，推之不动。109. 应首先考虑的是

- A. 失荣
- B. 瘰疬
- C. 癭瘤
- D. 气瘿
- E. 石瘿

110. 以下不属于此病病因病机的是

- A. 情志不畅
 - B. 气滞血瘀
 - C. 肉瘿日久转化而来
 - D. 痰瘀互结
 - E. 外感风邪
111. 首选治疗方法为

- A. 手术切除
- B. 化疗
- C. 理疗
- D. 化疗配理疗
- E. 阳和膏外涂

患者，女，27岁。手背部有5到6枚表面光滑的扁平丘疹。如针头到米粒大，呈淡褐色，偶有瘙痒感。

112. 其诊断是

- A. 传染性软疣
- B. 寻常疣
- C. 掌跖疣
- D. 丝状疣
- E. 扁平疣

113. 此疣风热蕴结证的治法是

- A. 疏风清热，解毒散结

- B. 活血化瘀，清热散结
- C. 养血活血，清热解毒
- D. 清化湿热，活血化瘀
- E. 活血化瘀，消肿散结 114.

此疣最常用的外治法是

- A. 洗涤法. 涂法
- B. 推疣法
- C. 摩擦法
- D. 敷贴法
- E. 针挑法

四、B₁型选择题（115 ~ 150 题）

答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某一个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- A. 小产肾阳亏虚证
- B. 滑胎血热证
- C. 小产肾气不足证
- D. 滑胎气血虚弱证
- E. 滑胎血瘀证

115. 屡孕屡堕；头晕目眩，神疲乏力，面色（白光）白，心悸气短；舌质淡，苔薄白，脉细弱。辨证为

116. 屡孕屡堕，孕后阴道出血，色深红质稠；腰酸腹痛，面赤唇红，口干咽燥，便结尿黄，舌红苔黄，脉弦滑数。辨证为

- A. 补气摄血固冲
- B. 养血益气调经
- C. 补肾益气，调理冲任
- D. 补气摄血，固冲调经
- E. 补肾益精，养血调经

117. 月经过少肾虚证的治法是

118. 月经过少血虚证的治法是

- A. 疏肝理气，散瘀除热
- B. 滋养肝肾，育阴清热
- C. 补益血气，甘温除热
- D. 补益肾气，清热调经
- E. 活血化瘀，清热凉血

119. 经行发热肝肾阴虚证的治法是

120. 经行发热血气虚弱证的治法是

- A. 小儿化湿汤
- B. 消风散
- C. 消风导赤汤
- D. 龙胆泻肝汤合化斑解毒汤
- E. 当归饮子合消风散

117. 接触性皮炎风热蕴肤证最佳选方为

118. 接触性皮炎湿热毒蕴证最佳选方为

- A. 防风通圣散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 当归饮子 D.

消风散

E. 麻黄桂枝各半汤

119. 治疗瘾疹风寒束表证，采用的治疗方药为

120. 治疗瘾疹风热犯表证，采用的治疗方药为

- A. 血热证
- B. 血虚证
- C. 气虚证
- D. 血瘀证
- E. 气滞证

121. 恶露量多，色紫红，有块，腹痛拒按，其辨证是

122. 恶露量多，色红有臭气，其辨证是

A. 热. 烦. 渴. 饮，疹稠色暗，神昏抽搐B.

热. 咳. 喘. 痰，疹稠色暗

C. 热. 咳. 涕. 泪，麻疹黏膜斑

D. 热. 烦. 汗出，皮疹透发 E.

疹没脱屑，低热不退

123. 麻疹邪犯肺卫证的主要证候是

124. 麻疹邪入肺胃证的主要证候是

- A. 透疹凉解汤
- B. 银翘散合养阴清肺汤
- C. 桑菊饮
- D. 麻杏石甘汤
- E. 银翘散

125. 奶麻邪郁肌表首选的方剂是

126. 奶麻毒透肌肤首选的方剂是

- A. 清心泻火，滋阴生津
- B. 温阳健脾，利水消肿
- C. 调脾健运
- D. 消积理脾
- E. 补益气血

127. 疳积证的主要治法是

128. 口疳证的主要治法是

- A. 乌梅丸
- B. 鹤虱丸
- C. 驱蛔承气汤
- D. 使君子散 E.

驱虫粉

129. 治疗蛔虫病肠虫证首选

130. 治疗蛔虫病蛔厥证首选

- A. 防风通圣散
- B. 龙胆泻肝汤
- C. 当归饮子 D.

消风散

E. 麻黄桂枝各半汤

131. 治疗瘾疹风寒束表证，采用的治疗方药为

132. 治疗瘾疹风热犯表证，采用的治疗方药为

- A. 清热凉血，解毒消斑
- B. 清利湿热，解毒通络
- C. 养血滋阴，润肤息风
- D. 清热泻火，凉血解毒
- E. 活血化瘀，解毒通络

133. 治疗白疔湿毒蕴阻证，采用的治疗方法为

134. 治疗白疔火毒炽盛证，采用的治疗方法为

- A. 7%，深Ⅱ度
- B. 7%，浅Ⅱ度
- C. 9%，深Ⅱ度
- D. 9%，浅Ⅱ度
- E. 12%，深Ⅱ度

135. 患者，男，25岁。左上肢完全被开水烫伤，红斑、水疱，剧烈疼痛，患者被烫伤的面积和深度是

136. 患者，男，65岁。双足完全被开水烫伤，水疱，基底苍白，疼痛迟钝，患者被烫伤的面积和深度是

- A. 血癭
- B. 癭痈
- C. 肉癭
- D. 石癭
- E. 气癭

137. 患者颈前区弥漫性肿大，按之肿块柔软，皮色如常，并不疼痛。其诊断是

138. 患者颈前肿块，表面高低不平，质地坚硬如石，随吞咽动作移动减少。其诊断是

- A. 土壤
- B. 体液
- C. 吸血节肢动物
- D. 消化道
- E. 呼吸道

139. 甲型肝炎的主要传播途径是

140. 丙型肝炎的主要传播途径是

A. 被诊断为疑似病例，且与其有共同暴露史的人被诊断为确诊病例者

B. 被诊断为疑似病例，出现 ARDS 者
 周内有接触史，出现流感样症状D.

有发热、咳嗽等典型流感样症状
E. 有流行病学史和临床表现，呼吸道分泌物标本甲型流感病毒和 H5 单克隆抗体抗原检测阳性

141. 属人禽流感医学观察病例的是

142. 属人禽流感临床诊断病例的是

A. 鲍氏志贺菌 B.

舒氏痢疾杆菌C.

宋内志贺菌 D.

痢疾志贺菌 E.

福氏志贺菌

143. 抵抗力最强的痢疾杆菌是

144. 感染后易转为慢性的痢疾杆菌是

- A. 鼠疫、霍乱
- B. 狂犬病、流行性乙型脑炎
- C. 登革热、炭疽
- D. 阿米巴性痢疾、肺结核
- E. 黑热病、包虫病

145. 丙类传染病是

146. 甲类传染病是

A. 肥达反应

B. 临床表现

C. 尿培养 D.

粪便培养E.

血培养

147. 流脑确诊的依据是

148. 伤寒确诊的依据是

- A. 医师的社会地位
- B. 医师的执业条件
- C. 医师的职责
- D. 医师的权利
- E. 医师的义务

149. 医师在执业活动中遵守法律规定和技术操作规范体现了

150. 医师在执业活动中，人格尊严、人身安全不受侵犯体现了