

1. 抗甲状腺药物的副作用最常见的是

- A. 皮肤瘙痒
- B. 剥脱性皮炎
- C. 中毒性肝炎
- D. 心绞痛
- E. 粒细胞减少

1. 答案：A

解析：抗甲状腺药物常用的有硫脲类、碘和碘化物、放射性碘和β受体阻断药等四类。不良反应主要有：①过敏反应，如皮肤瘙痒、药疹，少数伴有发热，最常见；②消化道反应，有厌食、呕吐、腹痛、腹泻等；③粒细胞缺乏症（又名白细胞减少症），为最严重不良反应，应定期检查血象，注意与甲亢本身引起的白细胞数偏低相区别；④甲状腺肿及甲状腺功能减退。故排除B、C、D、E答案，A正确。

2. 使用抑抗酸药治疗消化性溃疡时要注意

- A. 要长期服用
- B. 在饭前30min服药
- C. 疗程一般为2周
- D. 片剂效果最为理想
- E. 在餐后1h及睡前服药

2. 答案：E

解析：抗酸药应在餐后1小时及睡前服用，避免与牛奶同时服用。

3. 溃疡病穿孔非手术治疗期间哪项护理措施最重要

- A. 半卧位
- B. 输液
- C. 胃肠减压
- D. 应用抗生素
- E. 做术前准备

3. 答案：C

解析：溃疡病急性穿孔，胃液漏入腹腔，可引起急性弥漫性腹膜炎，所以应施行胃肠减压，抽吸胃内容物，减轻胃肠压力，防止外溢腹腔继续污染，以减少其并发症的发生。故选C。

4. 十二指肠球部溃疡的疼痛规律为

- A. 无一定规律
- B. 疼痛—进食—缓解
- C. 进食—疼痛—无缓解
- D. 进食—疼痛—缓解
- E. 疼痛—进食—疼痛

4. 答案：B

解析：溃疡病以疼痛为主要症状，可由气候寒冷或饮食不节而诱发，其疼痛多为周期发作，秋季至春季是发作季节，十二指肠溃疡疼痛，多发于餐后3~4小时，有时可在半夜发生，表现为空腹痛，进食可缓解。故选B。

5. 雷尼替丁抑制胃酸分泌的作用机制是

- A. 与溃疡面结合形成保护屏障
- B. 抑制壁细胞分泌 H^+K^+-ATP 酶

- C. 与盐酸作用形成盐和水
- D. 通过选择性竞争结合 H₂ 受体，使壁细胞分泌胃酸减少
- E. 可刺激局部内源性前列腺素的合成

5. 答案：D

解析：雷尼替丁为组胺 H₂ 受体拮抗剂，能抑制基础胃酸和刺激引起的胃酸分泌，可使胃酸减少，胃蛋白酶活性降低，而且具有速效和长效的特点。故选 D。

6. 下面防治类风湿关节炎的要点中哪项是错误的

- A. 使用阿司匹林等非甾体类抗炎药
- B. 缓解晨僵和疼痛等关节症状
- C. 长期持续坚持使用肾上腺糖皮质激素
- D. 适当选用免疫抑制剂
- E. 注意锻炼关节功能

6. 答案：C

解析：类风湿关节炎的治疗使用阿司匹林等非甾体类抗炎药，适当选用免疫抑制剂，使用肾上腺糖皮质激素时应小剂量，短期应用；治疗的目的：①控制关节及其它组织的炎症，缓解晨僵和疼痛等关节症状；②保持关节功能和防止畸形；③修复受损关节以减轻疼痛和恢复功能。故选 C。

7. 类风湿关节炎缓解期最重要的护理措施是

- A. 观察病情变化
- B. 避免疲劳
- C. 指导患者功能锻炼
- D. 给予营养丰富的饮食
- E. 避免精神刺激

7. 答案：C

解析：类风湿关节炎急性期后应预防关节失用：为保持关节功能，防止关节畸形和肌肉萎缩，护士应指导病人锻炼，在症状基本控制后，鼓励病人及早下床活动，指导病人及家属正确使用辅助性器材，避免长时间不活动。

8. 类风湿关节炎最基本的病理损害是关节的

- A. 滑膜炎症
- B. 软骨炎症
- C. 骨质疏松
- D. 腔隙增大
- E. 腔隙变窄

8. 答案：A

解析：类风湿是以关节滑膜炎为病理特征的慢性全身性自身免疫性疾病，故 A 正确。骨质疏松是类风湿关节 I 期的表现，故不选 C。腔隙变窄是类风湿关节 II 期的表现，故不选 E。腔隙增大、软骨炎症不是类风湿关节炎的临床表现，故不选 B、D。

9. 肺结核化疗时可出现耳聋和肾功能损害的药物是

- A. 乙胺丁醇
- B. 链霉素
- C. 对氨基水杨酸
- D. 异烟肼
- E. 利福平

9. 答案：B

解析：链霉素主要用于治疗各系统的各种结核病，其慢性毒性反应：①对第八对脑神经的毒性主要损害前庭和耳蜗神经；主要表现眩晕、头痛、经常指误、运动性共济失调、耳鸣和耳聋；②对局部的刺激；③对肾脏的损害：链霉素对肾脏的损害较轻，表现为蛋白尿和管型尿，部分出现肾功能暂时减退；④对骨髓的抑制：表现为白细胞、血小板减少，再生障碍性贫血及血细胞全少症等；⑤还有多毛症、结膜炎、关节痛、心肌炎、中毒性脑病等。故选 B。

10. 确诊甲状腺功能亢进的化验是

- A. 三脂酰甘油（甘油三酯）增高
- B. 三碘甲状腺原氨酸增高
- C. $\beta 1$ 微球蛋白增高
- D. 磷酸肌酸激酶减少
- E. 谷丙转氨酶减少

10. 答案：B

解析：临床上把三碘甲状腺原氨酸总量称之为 T₃，甲亢时血清总 T₃ 可升高 4 倍左右，是诊断甲亢最敏感的指标，B 正确，本题选 B。甘油三酯是血脂检查中比较重要的一项指标，其增高只能反映出病人的高脂肪的身体状况，不能作为确诊甲状腺功能亢进的化验，故不选 A。临床检测血和尿中的 $\beta 1$ 微球蛋白，为肾功能测定、糖尿病肾病及肿瘤临床诊断提供较早，较可靠的指标，不能作为确诊甲状腺功能亢进的化验，故不选 C。磷酸肌酸激酶增高是诊断急性心肌梗死的主要依据，减少在临床没有特殊意义，故排除 D 答案。谷丙转氨酶的正常参考值是 0~40U/L，其偏高表明有肝细胞损伤，各类急性慢性病毒性肝炎次值均可升高。谷丙转氨酶偏低在临床没有特殊意义，故排除 E。

11. 临床糖尿病肾病最早期的表现是

- A. 高血压
- B. 低蛋白血症
- C. 水肿
- D. 血肌酐、尿素氮增高
- E. 微量蛋白尿

11. 答案：E

解析：临床糖尿病肾病早期惟一的表现是蛋白尿，蛋白尿从间歇性逐渐发展为持续性。微量蛋白尿是最早期的症状，故选 E。

12. 慢性粒细胞白血病最有特征性的体征是

- A. 胸骨压痛
- B. 浅表淋巴结肿大
- C. 巨脾
- D. 皮肤紫癜
- E. 贫血貌

12. 答案：C

解析：慢粒的临床表现：①起病缓慢；②乏力；低热、多汗或盗汗，体重减轻；③胸骨下部压痛；④急变期表现同急性白血病；⑤最突出体征为脾肿大，往往为巨脾，肝脏常有中度肿大，浅表淋巴结多不肿大。故选 C。

13. 下列哪项不可能是慢性粒细胞白血病患者的护理诊断

- A. 活动无耐力

- B. 营养失调：低于机体需要量
- C. 有感染的危险
- D. 疼痛：脾胀痛
- E. 潜在并发症：周围循环衰竭

13. 答案：E

解析：慢粒患者的护理诊断有：活动无耐力（与虚弱或贫血有关）、营养失调：低于机体需要量（与机体代谢亢进有关）、有感染的危险、疼痛：脾胀痛（与脾大、脾梗死有关）。周围循环衰竭指由于不能足够给予组织和器官养分会出现组织和器官的衰竭，表现是四肢厥冷，脉搏细速或者摸不到，出冷汗，心跳加快，与 CML 无关。故选 E。

14. 慢性肺源性心脏病的 X 线表现，哪项错误

- A. 常有肺、胸基础疾病表现
- B. 可有急性肺部感染的表现
- C. 肺动脉段明显突出或其高度 $\geq 3\text{mm}$
- D. 右心室肥大征
- E. 右下肺动脉干扩张，其横径 $\geq 10\text{mm}$ ，其横径与血管横径之比 ≥ 1.07

14. 答案：E

解析：慢性肺心病 X 线检查：①肺部变化；②心脏变化：心脏呈垂直位，早期心脏都不见增大。右心室流出道增大时，表现为肺动脉圆锥部显著凸出。此后右心室流入道也肥厚增大，心尖上翘；③肺动脉高压表现：右肺动脉第一下分支横径 $\geq 15\text{mm}$ ，或右下肺动脉横径与气管横径比值 ≥ 0.17 ，或动态观察较原右肺下动脉干增宽 2mm 以上，可认为有该支扩张。故选 E。

15. 导致慢性肺心病的最常见病因是

- A. 支气管哮喘
- B. 慢性纤维空洞型肺结核
- C. 尘肺
- D. 慢性支气管炎
- E. 弥漫性支气管扩张

15. 答案：D

解析：慢性肺源性心脏病是指由肺部胸廓或肺动脉的慢性病变引起的肺循环阻力增高，致肺动脉高压和右心室肥大，伴或不伴有右心衰竭的一类心脏病，其通常经历一个从慢性支气管炎到肺气肿到 COPD 到肺心病的过程，所以慢性支气管炎是其最常见的病因，故选 D。

16. 我国引起肺心病最常见病因是

- A. 肺结核
- B. 慢性支气管炎、肺气肿
- C. 支气管扩张
- D. 肺间质纤维化
- E. 支气管哮喘

16. 答案：B

解析：慢性肺源性心脏病是指主要是由于支气管-肺组织或肺动脉血管病变所致肺动脉高压引起的心脏病。大多数肺心病是从慢性支气管炎、阻塞性肺气肿发展而来，少部分与支气管哮喘、肺结核、支气管扩张有关，故选 B。

17. II 型呼吸衰竭病人的主要诱因是

- A. 过度劳累
- B. 精神紧张
- C. 呼吸道感染
- D. 营养不良
- E. 长期吸烟

17. 答案: C

解析: 慢性呼吸衰竭, 是慢性肺部疾病发展到严重阶段的表现, 最主要的诱因是呼吸道感染或持续哮喘发作。故选 C。

18. 慢性呼吸衰竭的患者, 下列哪项处理不利于呼吸道通畅

- A. 糖皮质激素
- B. 采用快速利尿剂
- C. 口服或雾化祛痰剂
- D. 痰液黏稠者补液
- E. 无力排痰者翻身拍背

18. 答案: B

解析: 慢性呼吸衰竭患者在氧疗和改善通气之前, 必须使呼吸道保持通畅。处理方法如下: ①用多孔导管将分泌物或胃内反流物吸出; ②痰黏稠不易咳出, 用溴己新喷雾吸入; ③注入生理盐水稀释分泌物; ④用支气管解痉剂兴奋剂扩张支气管; ⑤给予肾上腺皮质激素吸入缓解支气管痉挛; ⑥纤支镜吸出分泌物; ⑦经鼻气管插管或气管切开, 建立人工气道。故选 B。

19. 关于慢性粒细胞白血病的叙述, 错误的是

- A. 大多由急性转化而来
- B. 慢粒急变大多预后不良
- C. 慢粒急变用原药化疗无效
- D. 国内以慢粒最多见
- E. 以中年发病多见

19. 答案: A

解析: 慢性粒细胞白血病, 简称慢粒, 是伴有获得性染色体异常的多能干细胞水平上的恶性变而引起的一种细胞株病。慢粒起病缓慢。国内以慢粒最多见, 患者年龄在 30~40 岁者居多, 以中年发病最多见。慢粒在临床上可分为慢性期, 加速期及急变期。病人出现急性白血病的临床及血液等表现, 称为慢粒急变。急变期的主要症状是无症状或发热、贫血、出血、骨关节肌肉疼痛, 脾脏进行性大, 与白细胞无相关, 原有的化疗药物即使增加剂量效果不佳。预后极差。故选 A。

20. 慢性肾功能衰竭最早出现的症状是

- A. 皮肤瘙痒
- B. 胸痛
- C. 呼吸深长
- D. 食欲不振
- E. 骨酸痛

20. 答案: D

解析: 慢性肾功能衰竭有全身出血的倾向, 食管粘膜也常常有弥漫性渗血, 食管粘膜溃疡可以形成食管假性憩室样改变, 尿毒症病人偶尔可以发生反流性食管炎。胃、十二指肠, 胃部表现是最早出现也是最突出的表现之一。常见的有多发性溃

疡与胃炎、十二指肠炎、出血性胃炎很少见。食欲不振是常见的最早期表现，故本题选 D。

21. 慢性肾功能衰竭初期以哪个系统症状最为突出

- A. 血液系统
- B. 生殖系统
- C. 消化系统
- D. 神经系统
- E. 循环系统

21. 答案：C

解析：慢性肾衰各系统症状体征：①心血管系统和呼吸系统表现：高血压和心室肥大、心力衰竭、心包炎、动脉粥样硬化、呼吸系统症状（尿毒症性支气管炎、肺炎、胸膜炎）；②血液系统表现：贫血、出血倾向、白细胞异常；③神经、肌肉系统表现：神经系统异常包括中枢和外周神经病变。外周神经病变多见于晚期病人；④胃肠道表现：食欲不振是常见的早期表现；⑤皮肤表现：尿毒症面容；⑥肾性骨营养不良症：纤维性骨炎、尿毒症骨软化症、骨质疏松症和骨硬化症；⑦内分泌失调；⑧感染：感染为主要死因之一，其发生与机体免疫功能低下、白细胞功能异常等有关；⑨代谢失调。

22. 对慢性肾衰竭病人纠正酸中毒，同时为防止手足抽搐应该

- A. 补钾
- B. 控制感染
- C. 纠正贫血
- D. 降压利尿
- E. 补钙

22. 答案：E

解析：慢性肾衰竭时由于肾功能障碍，磷排出减少，血磷增高导致血钙降低。此外，慢性肾衰竭时活性维生素 D3 缺乏，影响肠道钙的吸收，钙吸收的减少加重了低钙血症。肾衰竭时，常伴有低钙高磷血症、代谢性酸中毒等。因此，在对肾衰竭病人纠正酸中毒的同时，为防止手足抽搐应该补钙，故选 E。

23. 在我国导致慢性肾衰竭的主要原因为

- A. 梗阻性肾病
- B. 糖尿病肾病
- C. 原发性肾小球病
- D. 狼疮性肾炎
- E. 高血压肾疾病

23. 答案：C

解析：慢性肾衰竭由泌尿系统疾病能破坏肾的正常结构和功能者引起。如原发性和继发性肾小球病、梗阻性肾病、慢性间质性肾病、肾血管疾病、先天性和遗传性肾病等。其中最主要的原因原发性肾小球病，故选 C。

24. 慢性肾小球肾炎的主要致病因素是

- A. 链球菌直接感染
- B. 病毒直接感染
- C. 免疫介导炎症
- D. 感染后毒素作用
- E. 代谢产物滞留

24. 答案：C

解析：慢性肾小球肾炎的发病机制主要是免疫介导性炎症，免疫复合物沉积于肾小球，通过激活补体引起一系列炎症反应。慢性肾小球肾炎起始因素多为免疫介导炎症。故选C。

25. 慢性肾炎长期低优质蛋白饮食还需补充的是

- A. 球蛋白
- B. 白蛋白
- C. 高密度脂蛋白
- D. 低密度脂蛋白
- E. 碳水化合物

25. 答案：E

解析：慢性肾小球肾炎肾功能减退者，应给优质低蛋白、低磷饮食，以减轻肾小球毛细血管高灌注，高压力和高滤过状态，延缓肾小球硬化和肾功能减退。低蛋白饮食时应适当增加碳水化合物，以满足机体生理代谢所需要的热量，避免发生负氮平衡，故选E。

26. 慢性肾炎病人给予低蛋白、低磷饮食的目的是

- A. 控制高血压
- B. 预防低钙血症
- C. 预防高钠血症
- D. 减轻肾小球内高压、高灌注及高滤过状态
- E. 减轻肾性水肿

26. 答案：D

解析：慢性肾小球肾炎应给予优质低蛋白、低磷饮食，以减轻肾小球毛细血管高灌注、高压力和高滤过状态，延缓肾小球硬化和肾功能减退。有明显水肿和高血压时需低盐饮食。

27. 慢性胃炎患者的实验室检查异常，错误的是

- A. 胃液分析时多灶萎缩性胃炎患者胃酸正常或增多
- B. 自身免疫性胃炎患者胃酸缺乏
- C. 自身免疫性胃炎患者血清促胃泌素水平常明显升高，伴恶性贫血时更甚
- D. 慢性胃炎患者血清中可测得抗壁细胞抗体和抗内因子抗体
- E. 多灶萎缩性胃炎患者血清促胃泌素水平升高

27. 答案：E

解析：慢性萎缩性胃炎又可再分为多灶萎缩性胃炎和自身免疫性胃炎，自身免疫性胃炎时，抗壁细胞抗体和抗内因子抗体可呈阳性，血清促胃液素水平明显升高。多灶萎缩性胃炎时，血清促胃液素水平正常或偏低。

28. 慢性胃炎的预防原则下列哪项不妥

- A. 戒烟戒酒
- B. 长期服用抑制胃酸分泌的药物
- C. 彻底治疗幽门螺杆菌
- D. 避免服用刺激性药物和食物
- E. 进食要有规律

28. 答案：B

解析：慢性胃炎的预防：①患者应保持精神愉快，避免精神刺激，注意生活起居要有规律；②避免食生冷辛辣之物，不酗酒，不暴饮暴食，多吃易消化营养价值

的软食，多吃新鲜蔬菜及水果；③由于幽门螺杆菌是慢性胃炎的主要致病菌，所以必须彻底治疗幽门螺杆菌。故选 B。

29. 咳大量脓痰的是

- A. 支气管哮喘
- B. 肺炎球菌性肺炎
- C. 肺结核
- D. 慢性支气管炎
- E. 慢性支气管扩张

29. 答案：E

解析：慢性支气管扩张主要表现为慢性咳嗽、咳大量脓痰，与体位有关，常在晨起和夜间卧床时加重，痰量每日可达数百毫升。

30. 下列哪项不符合慢性支气管炎咳痰特点

- A. 多为白色黏痰
- B. 急性发作期可出现黏液脓痰
- C. 可为浆液泡沫痰
- D. 夜间痰量较多
- E. 偶有痰中带血

30. 答案：D

解析：慢性支气管炎患者常在寒冷季节发病，出现咳嗽、咯痰，尤以晨起为重，痰呈白色黏液泡沫状，黏稠不易咳出。在急性呼吸道感染时，症状迅速加剧，痰量增多，黏稠度增加或为黄色脓性，偶有痰中带血。故选 D。

31. 关于慢性支气管炎的描述，哪项错误

- A. 指气管、支气管黏膜的慢性感染性炎症
- B. 主要表现为咳嗽、咳痰或伴喘息
- C. 常并发阻塞性肺气肿
- D. 吸烟是其主要病因
- E. 临床可分为单纯型、喘息型

31. 答案：A

解析：慢性支气管炎简称慢支，是气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症。可由感染或非感染因素（如理化刺激）引起，故 A 选项表述有误。

32. 慢性支气管炎最突出的症状是

- A. 长期反复咳嗽
- B. 长期反复咳浓痰
- C. 间歇少量咯血
- D. 逐渐加重的呼吸困难
- E. 活动后心悸气急

32. 答案：A

解析：慢性支气管炎主要为长期咳嗽、咳痰，或伴有喘息。但是并不咳浓痰。因此，A 正确。

33. 下列最适用于慢性阻塞性肺气肿患者缓解期的措施是

- A. 口服抗生素预防感染
- B. 应用止喘药
- C. 间断吸氧
- D. 增强体质和进行缩唇腹式呼吸

E. 使用支气管扩张剂

33. 答案：D

解析：慢性阻塞性肺气肿病人缓解期的护理措施：①戒烟；②增强体质，改善营养状况；③坚持全身运动和呼吸训练；④长期氧疗；⑤坚持进行腹式呼吸及缩唇呼气训练。故选D。

34. 目前 SLE 的急性发作期首选治疗药物是

- A. 非甾体类抗炎药
- B. 免疫抑制剂
- C. 免疫增强剂
- D. 抗疟药
- E. 肾上腺皮质激素

34. 答案：E

解析：目前 SLE 仍无根治方法，治疗目的在于控制病情及维持临床缓解。主要的治疗药物包括：非甾体类抗炎药、抗疟药、肾上腺皮质激素、免疫抑制剂。其中，肾上腺皮质激素是目前治疗重症自身免疫疾病的首选药物，可显著抑制炎症反应，抑制抗原抗体反应的作用。

35. 下列与原发性高血压发病的相关因素中，不包括

- A. 遗传因素
- B. 精神长期过度紧张
- C. 自身免疫缺陷
- D. 高盐的饮食习惯
- E. 年龄增大及体重超重

35. 答案：C

解析：目前认为原发性高血压是在一定的遗传背景下由于多种后天环境因素作用，使正常血压调节机制失代偿所致。遗传因素占 40%，环境因素约占 60%。环境因素包括：①饮食因素：食盐摄入量与高血压的发生和血压水平呈正相关；②精神应激：人在长期精神紧张、压力、焦虑或长期环境噪声、视觉刺激下也可引起高血压；③其他因素：肥胖、服用避孕药、阻塞性睡眠呼吸暂停综合征均与高血压的发生有关。

36. 关于急性胆囊炎的临床特点的描述错误的是

- A. 进油腻饮食后，容易发病
- B. 右上腹持续性疼痛，阵发性加重
- C. 疼痛常放射至右肩背部
- D. 墨菲征阳性
- E. 多数病人伴有黄疸

36. 答案：E

解析：不少患者在进油腻食物后发病，主要表现为右上腹持续性疼痛、阵发性加剧，可向右肩背放射；常伴发热、恶心、呕吐，但寒战少见，黄疸轻。腹部检查发现右上腹饱满，胆囊区腹肌紧张、明显压痛、反跳痛，墨菲征阳性。故选E。

37. 正常体温时，脑细胞对缺氧耐受的时间是

- A. 30min
- B. 60min
- C. 1~2h
- D. 4~6min

E. 45min

37. 答案：D

解析：参考 16 题解析

38. 心脏骤停最容易发生病理变化的器官是

- A. 肺
- B. 肾脏
- C. 肝脏
- D. 脑
- E. 心脏

38. 答案：D

解析：参考 16 题解析。心脏停搏到细胞死亡的时间，脑细胞最短。肺肾肝心脏器的缺氧耐受力较脑组织强。故选 D。

39. 心肺复苏时，胸外心脏按压操作哪项不正确

- A. 按压部位在胸骨下段
- B. 双手相叠挤压
- C. 每次按压胸骨下陷 4cm
- D. 每分钟 80~100 次
- E. 与人工呼吸配合的比率为 2: 1

39. 答案：E

解析：参考 20 题解析。按压部位在胸骨下段，双手相叠按压，每次按压胸骨下陷 4cm，每分钟 80~100 次。

40.

26 岁男性患者，6d 前因“弥漫性腹膜炎，胃、十二指肠破裂”行剖腹探查术，术中行胃十二指肠修补、十二指肠造瘘减压术，空肠造瘘置营养管、放置腹腔引流管。1d 前患者诉腹痛，T39.7℃，见网膜孔附：丘引流管引出含胆汁样液体，量约 1700ml。

该患者最可能出现哪项术后并发症

- A. 肠动力异常
- B. 腹腔脓肿
- C. 胆囊穿孔
- D. 吻合口瘘
- E. 引流不畅

40. 答案：D

解析：肠动力异常一般会有腹胀、腹痛、停止排气、排便等症状，根据题意排除 A。患者也没有有里急后重，黏液便等症状，排除腹腔脓肿，B 错。胆囊穿孔会有急性胆囊炎的表现，如黄疸、故 C 错。引流液的量少且时胆汁样，是发生了吻合口瘘，因此 D 是正确答案。有引流液排除引流不畅，E 错。

41.

患者，男性，40 岁，2h 前吃完午饭后打篮球时出现腹部剧烈疼痛，呈持续性，腹胀，呕吐宿食，含少量血性液体，口渴，烦躁不安，中腹部可扪及压痛包块，移动性浊音阳性，肠鸣音减弱，血常规：WBC $15.4 \times 10^9/L$ ，发病以来未排便排气。

以下哪项并发症不是肠梗阻患者围手术期常见的

- A. 倾倒综合征
- B. 腹腔感染
- C. 肠痿

- D. 肠粘连
- E. 吸入性肺炎

41. 答案：A

解析：肠梗阻患者围手术期常见的并发症有吸入性肺炎、腹腔感染及肠痿、肠粘连，因此 A 项内容不对，故本题的正确答案为 A。

42. 肠梗阻解除的标志是

- A. 腹痛减轻
- B. 呕吐减少
- C. 腹胀消失
- D. 肛门排气排便
- E. 无气过水声

42. 答案：D

解析：肠梗阻解除的主要指标就是肠鸣音恢复或正常排便、排气。故选 D。

43. 下列哪项是单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻的主要区别

- A. 肠管壁有无血运障碍
- B. 有无并发症
- C. 梗阻的病因
- D. 梗阻的严重程度
- E. 梗阻的时间

43. 答案：A

解析：肠梗阻依据肠壁血运有无障碍分为单纯性肠梗阻和绞窄性肠梗阻，也是两者之间的主要区别，因此 A 是正确答案。根据有无并发症、原因、梗阻程度、时间分别有相应分类。

44.

患者，男性，40 岁，2h 前吃完午饭后打篮球时出现腹部剧烈疼痛，呈持续性，腹胀，呕吐宿食，含少量血性液体，口渴，烦躁不安，中腹部可扪及压痛包块，移动性浊音阳性，肠鸣音减弱，血常规：WBC $15.4 \times 10^9/L$ ，发病以来未排便排气。

该患者目前主要的护理问题是

- A. 排便困难
- B. 活动无耐力
- C. 皮肤完整性受损
- D. 个人应对无效
- E. 体液不足

44. 答案：E

解析：肠扭转的护理诊断有疼痛、活动无耐力、体液不足：与呕吐有关，排除 A、C、D，根据题意患者目前最主要的是护理问题是体液不足，不及时纠正容易造成休克，因此 E 是正确答案。

45. 患者，女性，50 岁，因胰腺癌入院，经中心静脉导管接受胃肠外营养支持，下列对导管护理正确的是

- A. 可经中心静脉导管抽血
- B. 每周消毒穿刺部位一次
- C. 可经中心静脉途径应用抗生素
- D. 输液结束后用肝素稀释液封管
- E. 可经中心静脉途径输血

45. 答案：D

解析：肠外营养的中心静脉导管护理应每天消毒穿刺部位，为专用的进行 TPN 通道，禁止在中心静脉导管抽血、输血和输注其他药液等，输液结束后可用肝素稀释封管，保持管路通畅。故正确答案为 D。

46. 下列哪一项不是肠外营养的并发症

- A. 切口难以愈合
- B. 低血糖
- C. 电解质紊乱
- D. 微量元素缺乏
- E. 气胸

46. 答案：A

解析：肠外营养支持并发症：（技术性）穿刺可导致气胸，（代谢性）补充不足可导致电解质紊乱和微量元素缺乏；由于外源性胰岛素用量过大或突然停用高浓度葡萄糖可导致低血糖；而 A 一般指术后手术切口愈合障碍。故选 A。

47. 女性，48 岁，膀胱癌行全膀胱切除术 3 天后饮食应是

- A. 禁食
- B. 流食
- C. 半流
- D. 无渣软饭
- E. 以上全不对

47. 答案：C

解析：常规护理 即去枕平卧 6h，以免过早抬高头部致使脑脊液自穿刺处渗出至脊髓腔外，造成脑压过低，牵张颅内静脉窦和脑膜等组织而引起头痛。观察排尿情况、及早活动、饮食护理：肛门排气后即可少量进食流质食物，一般术后 3~5 天开始排气；排气后第二天可进食半量流质饮食，如无胃肠反应，次日可进食流质全量并逐渐恢复半流质及正常饮食。及时观察阴道出血情况及会阴护理。

48.

男性，患者，40 岁，下肢酸胀、沉重 7 年，活动或休息后减轻。体检可见小腿内侧有蚓状团块，足靴区有色素沉着。

目前该患者最主要的护理诊断是

- A. 活动无耐力
- B. 知识缺乏
- C. 疼痛
- D. 潜在并发症：出血
- E. 潜在的皮肤完整性受损

48. 答案：A

解析：常见护理诊断/问题①活动无耐力 与下肢静脉回流障碍有关。②皮肤完整性受损 与皮肤营养障碍、慢性溃疡有关。③潜在并发症：深静脉血栓形成、小腿曲张静脉破裂出血。此题患者还没有发生皮肤营养障碍和破裂出血，首先最主要的是活动后出现症状，休息后缓解，即活动耐力下降。故正确答案为 A。

49. 颅内压增高产生脑水肿多数为

- A. 细胞毒性脑水肿
- B. 血管源性脑水肿
- C. 混合性脑水肿
- D. 白质性脑水肿

E. 灰质性脑水肿

49. 答案：C

解析：常见脑水肿的类型为：①血管源性脑水肿：常见于脑外伤、脑肿瘤、脑血管意外，脑炎和脑膜炎等病变的脑水肿早期；②细胞毒性脑水肿：多由于脑缺血缺氧或各种中毒引起的脑水肿；③间质性脑水肿：见于阻塞性脑积水；④渗透压性脑水肿。当血浆渗透压急剧下降时，为了维持渗透压平衡，水分子由细胞外液进入细胞内，引起脑水肿。颅内压增高产生脑水肿多数为混合性脑水肿，不是单一类型的，早期是细胞毒性的；当血肿形成以后大脑半球移位时，以血管源性为主；当脑积水时又合并间质性水肿；后期由于 Na^+ 离子降低，又可引起渗透压性脑水肿。故选 C。

50. 改善成人急性呼吸窘迫综合征病人缺氧的最佳措施是

- A. 持续高流量吸氧
- B. 按时使用有效抗生素
- C. 呼气终末正压通气
- D. 避免输液过量过快
- E. 鼓励深呼吸和排痰

50. 答案：C

解析：成人急性呼吸窘迫综合征最佳的呼吸治疗为呼气终末正压通气，其目的在于使肺泡在整个呼吸周期保持开放，使塌陷的肺泡重新通气，将水肿液从肺泡内移向间质，从而改善肺泡弥散功能和通气/血流比例，减少分流，达到改善氧合功能和肺顺应性的目的。本题选择 C。

51. 麻醉前禁食、禁水最主要的目的是

- A. 便于术中操作
- B. 防止术后便秘
- C. 防止术后腹胀
- D. 防止术后尿潴留
- E. 预防术中呕吐误吸

51. 答案：E

解析：成人择期手术前常规禁食 12 小时、禁饮 4 小时以保证胃排空，避免术中发生胃内容物反流、呕吐或误吸。故正确答案为 E。

52. 预防全麻患者发生误吸的主要措施是

- A. 术前放置胃管
- B. 术前禁食禁水
- C. 选择静脉麻醉
- D. 术前行阿托品
- E. 术前行止吐药

52. 答案：B

解析：成人择期手术前常规禁食 12 小时、禁饮 4 小时以保证胃排空，避免术中发生胃内容物反流、呕吐或误吸。术前行阿托品抑制腺体分泌，可减少涎液和呼吸道分泌物，保持术中呼吸道通畅。故正确答案为 B。

53. 患者，女性，56 岁，用普鲁卡因行局部浸润麻醉后，出现不安、呼吸和心率增快、血压升高等局麻药毒性反应，为了预防此种情况，正确的措施是

- A. 药物直接注入血管
- B. 一次性给足量麻醉药
- C. 普鲁卡因中加少量肾上腺素

- D. 发生毒性反应时应减少用量
- E. 虚弱病人对药物反应较弱，应增加药量

53. 答案：C

解析：出现毒性反应的处理：避免局麻药注入血管内；控制药物用量：对体质衰弱者及血液循环丰富的注药部位予以酌减用量；加强观察和积极处理毒性反应：药液内加入适量肾上腺素：局麻药内加入肾上腺素能使局部血管收缩，延缓局麻药的吸收，既能延长其作用时间，又能减轻局麻药的毒性反应，还能消除普鲁卡因和利多卡因等扩张血管的作用，减少创面渗血。故正确答案为C。

54.

患者女，42岁。主诉：因无意中发现左乳肿物半年、无疼痛，近日逐渐增大而来院就诊。体检：触及：左乳外上象限3cm肿物4质硬、边界不清，腋下可触及多个淋巴结
术后患者出院指导哪一项是错误的

- A. 术后3~5年内避免妊娠，因妊娠常使乳癌复发
- B. 出院时帮助患者戴上暂时性无重量假乳房
- C. 遵医嘱坚持放疗化疗，并定期到医院复查
- D. 出院后不用患侧上肢测血压、静脉穿刺，避免皮肤破损，减少感染发生
- E. 注意功能锻炼，患肢作爬墙运动、举杠运动、转绳运动、提拉搬动重物

54. 答案：E

解析：出院指导：①告知患者勿在患侧上肢测血压及行静脉穿刺；②不宜用患肢提重物，患肢放于低位置时间不宜过长；③有生育要求者，告诉患者5年内要避孕；④饮食宜低脂肪、高维生素饮食；⑤继续进行手臂功能锻炼；⑥告诉患者保持良好的心态面对生活；⑦教会患者自我检查乳房的方法；⑧每3~4个月复查1次；⑨如果需化疗，要按期进行，如需要内分泌治疗，每年要查子宫内膜厚度。故选E。

55. 患者，男性，55岁。车祸造成多发性损伤，急救车首先要处理的情况是

- A. 开放性骨折
- B. 腹部外伤后肠管脱出
- C. 外伤性大出血
- D. 颅脑外伤
- E. 膀胱破裂

55. 答案：C

解析：处理复杂伤情时，优先抢救生命；待生命体征稳定后再实施其他治疗措施，该患者为车祸后造成多发性损伤，外伤性大出血是首先处理的，以免大出血出现休克危及生命。故答案为C。

56. 治疗代谢性酸中毒最根本的方法是

- A. 输入5%碳酸氢钠
- B. 2%乳酸钠
- C. 输入三羟甲基氨基甲烷 (THAM)
- D. 吸氧
- E. 去除产生酸中毒的病因

56. 答案：E

解析：处理原则：①积极处理原发疾病，消除病因。②逐步纠正代谢性酸中毒。③维持Ca²⁺、K⁺平衡。

57. 开放性腹部损伤有肠管脱出时，原则上应

- A. 立即向腹腔还纳

- B. 及早行清创术
- C. 止痛处理
- D. 抗感染
- E. 暂不向腹腔回纳

57. 答案: E

解析: 穿透性开放损伤如伴腹内脏器或组织自腹壁伤口突出, 可用消毒纱布覆盖保护, 切勿在毫无准备的情况下强行回纳。这样不仅达不到回纳的目的, 反而加重腹腔污染。回纳应在手术室经麻醉后。故选 E。

58. 患者男, 68 岁, 脊柱手术后 3 日伤口轻度发红, 体温 37.8℃。下列哪项处理较为合适

- A. 考虑伤口感染, 即换广谱抗菌药物
- B. 考虑伤口感染, 加大抗菌药物剂量
- C. 无特殊处理, 密切观察病情变化
- D. 做血液细菌培养
- E. 伤口探查冲洗

58. 答案: C

解析: 此患者的脊柱手术后虽然伤口轻度发红, 但体温不高, 应该是正常情况下伤口的轻度炎症, 所以无需特殊处理, 只要密切观察病情变化即可。故选 C。

59. 与大肠癌的发生有密切关系的因素是

- A. 高脂肪饮食
- B. 高纤维素饮食
- C. 大肠息肉
- D. 溃疡性结肠炎
- E. 高维生素饮食

59. 答案: A

解析: 大肠癌病因未明, 高危因素有: 过多的动物脂肪及动物蛋白质饮食; 缺乏新鲜蔬菜及纤维素食品; 缺乏适度的体力活动等。此外, 还有遗传易感性, 以及一些疾病, 如结肠腺瘤、溃疡性结肠炎、结肠血吸虫病肉芽肿等都与结肠癌的发生有着密切的关系。故选 A。

60. 患者, 女性, 48 岁。左肾结石 1.0cm×1.1cm 大小, 并伴有左肾轻度积水, 经 4 个月非手术治疗后复查结石位置无变动, 其治疗措施首选

- A. 行左肾切开取石术
- B. 嘱患者多喝水, 多运动
- C. 行体外震波碎石
- D. 应用解痉止痛药
- E. 应用抗生素

60. 答案: C

解析: 大量饮水配合利尿, 解痉药物及用抗生素控制感染有利于小结石的排出, 一般适用于直径小于 0.6cm 的结石, 故 B、D、E 错误, 体外震波碎石适宜于结石直径小于 2.5cm、结石以下输尿管通畅、肾功能良好、未发生感染的上尿路结石病人。肾积水一般有尿路梗阻导致, 因此治疗好结石为积水去除了病因。轻度肾积水不构成体外冲击波碎石的禁忌症。肾切开取石术适用于结石远端存在梗阻、部分泌尿系畸形、结石嵌顿紧密、既往非手术治疗失败、肾积水感染严重或病肾无功能等尿路结石病人。由于手术带来的创伤比较大, 先已经很少采用开放性手术治疗上尿路结石。A 错误。故正确答案为 C。

61. 单纯性机械性肠梗阻的临床特点是

- A. 阵发性腹痛伴肠鸣音亢进

- B. 持续性绞痛，频繁呕吐
- C. 持续性剧痛，腹胀不对称
- D. 持续性胀痛，肠鸣音消失
- E. 腹胀明显，肛门停止排气

61. 答案：A

解析：单纯性机械性肠梗阻只有肠内容物通过受阻，而无肠壁血运障碍。多表现为阵发性绞痛，如腹痛发展为剧烈持续性腹痛，应警惕绞窄性肠梗阻的可能；肠鸣音亢进，有气过水声或金属音。麻痹性肠梗阻时表现为持续性胀痛或不适，肠鸣音减弱或消失。故本题选 A。

62. 单纯性甲状腺肿的病因是

- A. 碘量不足
- B. 碘量过多
- C. 甲状腺分泌过度
- D. 甲状腺分泌不足
- E. 甲状旁腺分泌不足

62. 答案：A

解析：单纯性甲状腺肿是机体缺碘、存在致甲状腺肿物质，以及甲状腺激素合成酶缺陷而引起代偿性甲状腺增生肿大，一般无甲状腺功能异常。甲亢可引起甲状腺分泌过度。甲状腺素分泌不足可引起粘液性水肿。甲状旁腺分泌不足多继发于甲状腺全切除术或甲状旁腺切除术后，或为损伤所致。故本题应选 A。

63. 胆固醇结石形成的最主要原因是

- A. 胆汁中胆固醇增高、胆盐及卵磷脂减少所致
- B. 胆汁中胆固醇减少、胆盐及卵磷脂增高所致
- C. 胆汁中胆固醇、胆盐及卵磷脂均增高所致
- D. 胆道感染
- E. 胆道梗阻

63. 答案：A

解析：胆固醇含量过多或胆汁酸含量减少，出现三种脂类比例失调，胆汁中的胆固醇含量超过了胆汁酸和磷脂溶解胆固醇的能力，胆汁中部分胆固醇就不能溶解在胆汁中，就会析出胆固醇结晶而发生沉淀。析出的胆固醇结晶相互聚结，久而久之便会形成胆固醇结石。

64. 肝内胆管结石多为

- A. 胆固醇
- B. 胆色素结石
- C. 泥沙样结石
- D. 以胆色素为主的混合结石
- E. 以胆固醇为主的混合结石

64. 答案：B

解析：胆结石分类：①胆囊结石：多为胆固醇结石或以胆固醇为主的混合性结石，占全部结石的 50%左右；②肝外胆管结石：大多数是胆色素结石或以胆色素为主的混合性结石，约占全部结石的 20%~30%；③肝内胆管结石：是原发性胆管结石，较多见，占全部结石的 20%~30%，多为胆色素结石。左肝管多于右肝管，故选 B。

65. 胆囊结石一般呈

- A. 慢性胆囊炎表现
- B. 急性胆囊炎表现
- C. 夏柯三联征表现

D. 腹膜刺激征表现

E. 以上都不对

65. 答案：A

解析：胆囊结石中 20%~40% 的患者终身无症状，而在其他检查。手术或尸检解剖时被偶然发现，称为静止性胆囊结石，另一些胆囊结石一般可表现为胆绞痛或慢性胆囊炎，少见急性胆囊炎的，故选 A。

66. 胆囊结石最易嵌顿的部位是

A. 胆囊底

B. 胆囊体

C. 胆囊颈

D. 胆囊管

E. 胆总管

66. 答案：C

解析：胆囊颈是一个相对狭窄的地方，结石从胆囊出来容易卡在颈部，发生嵌顿，故排除 A、B、D、E 答案，选 C。

67. 急性胰腺炎非手术治疗中，在腹痛、呕吐未得到缓解前，饮食的要求是

A. 低脂饮食

B. 低糖流食

C. 低脂，低糖流食

D. 禁食

E. 禁食禁水

67. 答案：E

解析：胆汁、十二指肠液、肠酶、乳化脂肪、溶血卵磷脂等返流于胰管，则使胰管内的各种酶原活化，活化的酶对胰腺组织自我消化而发生胰腺炎，为抑制胰液分泌减轻患者疼痛、呕吐等症状加重，急性胰腺炎患者应禁食水、鼻胃管减压。

68. 患者，女性，36 岁，行胆总管切开取石、T 管引流术。术后第 3 天，护士查房时发现 T 管无胆汁流出，患者诉腹部胀痛。应采取的护理措施是

A. 用无菌生理盐水冲洗 T 管

B. 继续观察，暂不处理

C. 用注射器抽吸 T 管

D. 准备 T 管造影

E. 检查 T 管是否受压扭曲

68. 答案：E

解析：胆总管切开术的术后要定期观察并记录引流管引出胆汁的量、颜色及性质。正常成人每日分泌胆汁的量约为 800~1200ml，呈黄绿色、清亮、无沉渣、有一定黏性。术后 24 小时内引流量约为 300~500ml，恢复进食后，每日可有 600~700ml，以后逐渐减少至每日 200ml 左右。术后 1~2 日胆汁的颜色可呈淡黄色混浊状，以后逐渐加深、清亮。若胆汁突然减少甚至无胆汁引出，提示引流管阻塞、受压、扭曲、折叠或脱出，应及时查找原因和处理；若引出胆汁量过多，常提示胆管下端梗阻，应进一步检查，并采取相应的处理措施。故 E 为正确答案。

69. 胆总管下端结石易发生

A. 梗阻

B. 梗阻合并急性胆管炎

C. 急性胆管炎

- D. 胆管出血
- E. 胆管穿孔

69. 答案: B

解析: 胆总管下端结石, 易引起胆道梗阻, 常伴有胆汁淤滞, 易致继发感染。感染发生后, 胆管组织充血水肿, 可加重胆管梗阻程度, 使不完全性梗阻变为完全性梗阻, 可导致急性梗阻性化脓性胆管炎, 故选 B。

70. 患者男, 18 岁, 饭后剧烈运动后突然出现剧烈腹痛, 向腰背部放射, 呕吐, 应考虑为

- A. 肠扭转
- B. 肠套叠
- C. 肠粘连
- D. 肠肿瘤
- E. 肠系膜动脉栓塞

70. 答案: A

解析: 当肠管运动异常时或肠内容物增多及突然改变体位后易发生肠扭转。青壮年及儿童多见, 发病突然, 腹痛剧烈, 脐周绞痛常涉及腰背部, 伴呕吐, 常为持续阵发性加重。该患者发病特点与此相符, 故选 A。

71. 胎膜早破采用期待疗法的孕妇, 为促进胎儿肺成熟应用的药物是

- A. 雌激素
- B. 孕激素
- C. 雄激素
- D. 盐皮质激素
- E. 糖皮质激素

71. 答案: E

解析: 期待疗法适应于孕 28~35 周不伴随感染、羊水池深度大于或等于 2cm 的胎膜早破孕妇。促进胎儿肺成熟应使用糖皮质激素, 常常给予肌肉注射地塞米松 5mg, 每 6 小时 1 次, 共 8 次。故本题选 E。

72. 子宫肌瘤发病可能的相关因素是

- A. 体内雌激素水平过高
- B. 饮食因素
- C. 高血压、肥胖
- D. 早婚早育
- E. 环境因素

72. 答案: A

解析: 其确切的发病因素尚不清楚, 一般认为其发生和生长与雌激素长期刺激有关, 因此 A 是正确答案。与饮食、高血压、肥胖、婚育时间、环境等无必然联系, 因此 B、C、D、E 错误。

73. 正常骨盆入口平面前后径平均值是

- A. 10cm
- B. 11cm
- C. 12cm
- D. 13cm
- E. 5cm

73. 答案: B

解析：前后径为耻骨联合上缘至骶岬前缘中点距离，又称骶耻内径，平均长约 11cm，B 正确。中骨盆横径平均值为 10cm，故不选 A。M 经是入口平面最大径线，为两髂耻线间的最宽距离，平均约 13cm，故不选 D。

74. 前庭大腺（巴氏腺）位于

- A. 阴蒂上端两侧
- B. 小阴唇两侧
- C. 阴阜下方，阴唇两侧
- D. 会阴上方，两侧缘
- E. 大阴唇后部，阴道口两侧

74. 答案：E

解析：前庭大腺又称巴氏腺，位于大阴唇后部，左右各一，如黄豆大小，腺管细长，开口于小阴唇与处女膜之间的沟内。感染时，腺管口闭塞，可形成脓肿或囊肿。本题中 A、B、C、D 均不符合题意，只有 E 正确。

75. 前置胎盘患者进行产科检查，错误的是

- A. 胎方位清楚
- B. 先露高浮
- C. 胎心正常
- D. 子宫大小与停经月份一致
- E. 宫颈抬举痛明显

75. 答案：E

解析：前置胎盘腹部检查子宫软，无压痛。胎盘早剥是妊娠晚期突然发生腹部持续性疼痛，伴有或不伴有阴道流血。无宫颈抬举痛明显。

76. 侵蚀性葡萄胎及绒癌最好的治疗方法是

- A. 单纯化疗
- B. 单纯放疗
- C. 手术+放疗
- D. 化疗为主，手术为辅
- E. 免疫治疗

76. 答案：D

解析：侵蚀性葡萄胎，多在葡萄胎清除后 6 个月内发生，可穿破子宫肌层或转移至肺、阴道、外阴等器官，造成局部破坏出血，具有恶性肿瘤特点，但治疗效果、预后均较绒癌为好，两者的治疗以化疗为主，辅以手术治疗。故本题选 D。

77. 下述哪项不是放置节育环的禁忌证

- A. 轻度贫血
- B. 急性盆腔炎
- C. 月经过频
- D. 生殖道肿瘤
- E. 宫颈口过松

77. 答案：A

解析：轻度贫血可以放置节育环。故本题选 A。生殖器官急、慢性炎症需治疗后再放置节育器，宫内节育器的主要副反应是异常的子宫出血，特别是最初 3 个月内，几乎全部妇女都会出现月经过频、经量过多或不规则阴道流血，有这种表现是不宜放置节育环，故不选 C。患生殖器官肿瘤者常见为子宫肌瘤，其主要症状是月经量多，因此不适合放节育器，以免加重

月经量多的症状，故不选 D。宫颈口过松放置节育环后，因口松节育环很容易就脱落出来，故不选 E。

78. 为改善胎儿窘迫的缺氧状态，错误的护理措施是

- A. 嘱孕产妇取左侧卧位
- B. 给予孕产妇氧气吸入
- C. 继续静脉滴注缩宫素(催产素)
- D. 严密监测胎心音变化
- E. 给予碱性药纠正酸中毒

78. 答案：C

解析：取左侧卧位可以改善胎盘供血，酌情予以 β 受体兴奋剂如舒喘宁，减低子宫肌张力，增加子宫血流量，尽可能延长孕周。缺氧可引起酸中毒，所以可给予碱性药纠正酸中毒。应抑制宫缩，因此 C 说法错误。

79. 最早听到胎心音的时间约是

- A. 孕 8 周末
- B. 孕 12 周末
- C. 孕 16 周末
- D. 孕 20 周末
- E. 孕 24 周末

79. 答案：D

解析：妊娠 18~20 周经孕妇腹部可听到胎儿心音，呈双音，似钟表“滴答”声。正常胎心音应为每分钟 120~160 次，超过 160 次应当警惕缺氧等，低于 120 次更危险，因为如果胎儿缺氧，先是心跳加快，后慢慢变慢，所以胎心监护很重要。可见，本题的正确答案是 D。

80. 流产最主要的临床症状为

- A. 停经、腹痛及阴道出血
- B. 停经、大出血
- C. 腹痛、大出血
- D. 停经、腰痛及阴道出血
- E. 阵发性腹痛

80. 答案：A

解析：妊娠不足 28 周、胎儿体重不足 1000g 而终止者称流产，为妇产科常见疾病，流产发生于妊娠 12 周前者称早期流产，发生在妊娠 12 周至不足 28 周者称晚期流产。其主要症状为停经、出血与腹痛。如处理不当或处理不及时，可能遗留生殖器官炎症，或因大出血而危害孕妇健康，甚至威胁生命；故选 A。

81. 关于妊娠期妇女的健康指导，正确的是

- A. 妊娠初 3 个月及末 3 个月出现尿频不必处理
- B. 妊娠期如果出现便秘时，可随便使用轻泻剂
- C. 需要补充铁剂的孕妇，应在餐前半小时服用
- D. 早孕反应明显的孕妇，应经常保持空腹状态
- E. 妊娠期间白带增多，孕妇应每日行阴道冲洗

81. 答案：A

解析：妊娠初 3 个月或末 3 个月，常出现尿频尿急，一般不必处理，故 A 正确。妊娠期便秘者未经医生允许不可随便使用大便软化剂或轻泻剂，故 B 错误。铁剂补充要在两餐之间服用，避免对胃肠道刺激，故 C 错误。早孕反应是在妊娠 6 周左右出现，12 周左右消失，在此期间应避免空腹，故 D 错误。妊娠初 3 个月及末 3 个月白带增多明显，是妊娠期正常的生理变

化，应排除假丝酵母菌、滴虫、淋病、衣原体等感染。嘱孕妇每天清洁外阴，但严禁阴道冲洗，故 E 错误。本题选 A。

82. 糖尿病对孕妇的影响不正确的是

- A. 受孕率相对高
- B. 流产率相对高
- C. 妊娠期高血压疾病发生率相对高
- D. 手术产率相对高
- E. 羊水过多发生率高

82. 答案：A

解析：妊娠合并糖尿病对母体的影响有：糖尿病妇女的受孕率低，流产相对增高，妊娠期高血压疾病发生率相对高，羊水过多发生率增高，故排除 B、C、D、E 答案，选 A。

83. 妊娠期母体生殖系统的生理变化是

- A. 外阴变薄，弹性增加
- B. 阴道皱裂减少
- C. 子宫颈分泌物减少
- D. 子宫体明显变软
- E. 足月时子宫容积可达 1000ml

83. 答案：D

解析：妊娠期母体早期子宫增大变软，D 正确。妊娠期母体外阴局部充血，皮肤增厚，大阴唇延展性增加，故 A 不正确。阴道皱襞增加，B 不正确。妊娠期母体子宫颈粘液分泌物增多，C 不正确。宫腔容积足月时约 5000ml，E 不正确。

84. 下列物质不属于羊水的是

- A. 毛发
- B. 胎脂
- C. 激素和酶
- D. 上皮细胞
- E. 绒毛

84. 答案：E

解析：妊娠早期，羊水主要是母体血清经胎膜或脐带，胎儿皮肤进入羊膜腔的透析液，含有胎儿尿液，胎脂，胎儿脱落上皮细胞，毛发，白蛋白，大量激素和酶类。绒毛是胎盘的结构组成。故选 E

85. 造成乳头皲裂的主要原因是

- A. 婴儿含接姿势不良
- B. 分娩后开奶晚
- C. 未做到按需哺乳
- D. 乳房肿胀
- E. 乳头凹陷

85. 答案：A

解析：乳头皲裂是哺乳期常见病之一，轻者仅乳头表面出现裂口，甚者局部渗液渗血，日久不愈反复发作易形成小溃疡，处理不当又极易引起乳痛。哺喂不正确，婴儿吸吮姿势不正确，未把乳头及大部分乳晕送入婴儿口中是造成乳头痛和乳头裂口的主要原因。B、C、D、E 不是造成乳头皲裂的原因，故不选。

86. 患儿，女，半岁。高热、拒乳、抽搐，前囟饱满，血常规正常，初步诊断为病毒性脑膜炎，首要的护理措施为

- A. 维持正常体温
- B. 降低颅内压
- C. 加强安全保护
- D. 密切观察病情
- E. 做好健康指导

86. 答案: B

解析: 本例患儿高热、抽搐, 前囟饱满, 提示脑水肿和颅内压增高, 应及时应用高渗脱水剂, 降低颅内压, 减轻脑水肿, 避免发生脑疝, 故选 B。

87. 男孩, 10 岁, 患急性肾炎, 近 2 天来尿量减少, 气急, 不能平卧。查体: 呼吸 48 次/分, 心率 110 次/分, 两肺底可闻及少许中小水泡音, 肝右肋下 2cm, 对该患儿的护理主要是

- A. 吸氧
- B. 遵医嘱用碳酸氢钠
- C. 遵医嘱用强心、利尿药
- D. 遵医嘱用镇静剂
- E. 遵医嘱用降压药

87. 答案: C

解析: 本例患儿根据症状和体征, 诊断为急性肾炎并发严重循环充血, 应严格限制水、钠摄入量, 用强利尿剂(如呋塞米)促进液体排出; 发生肺水肿可用硝普钠扩张血管降压; 适当使用快速强心药(如毛花苷丙), 故选 C。

88. 患儿, 女性, 3 岁。高热 5 天, 昏迷、抽搐 2 天。查体: 呼吸节律不齐, 瞳孔缩小, 脑膜刺激征阳性。血常规: 白细胞 $22 \times 10^6/L$, 中性粒细胞 0.10, 血小板 $100 \times 10^6/L$, 初步诊断为休克型细菌性痢疾。该患儿的护理措施中不妥的是

- A. 应用强心剂, 预防心力衰竭
- B. 迅速建立静脉通道
- C. 严密监测生命体征
- D. 降温、解痉
- E. 给氧

88. 答案: A

解析: 本例患儿为休克型菌痢, 应积极抗休克治疗, 密切监测生命体征, 降温、解痉、吸氧, 快速建立静脉通道扩充血容量, 纠正酸中毒, 正确使用血管活性药物, 使用肾上腺皮质激素, 防治 DIC, 对重要器官进行保护, 不宜使用强心剂, 故选 A。

89. 足月臀位产儿, 产后即不安, 前囟饱满, 唇微发绀, 双肺呼吸音清, R128 次/分, 血清钙 2.5 mmol/L , 最可能的诊断是

- A. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 新生儿败血症
- D. 新生儿颅内出血
- E. 感染性肺炎

89. 答案: D

解析: 产后即不安, 前囟饱满, 微发绀, 心率 128 次/分, 提示新生儿颅内出血。

90. 患儿, 男性, 1 岁。出生时接种过卡介苗, 经常出现低热、盗汗, 医师嘱先做结核菌素试验, 请问结核菌素试验做皮内注射的部位为

- A. 右前臂掌侧中下 1/3 交界处
- B. 右前臂掌侧中下 2/3 交界处

- C. 左前臂掌侧中下 1/3 交界处
- D. 左前臂掌侧中下 2/3 交界处
- E. 左前臂背侧中下 1/3 交界处

90. 答案: C

解析: 常用的结核菌素试验为皮内注射 0.1ml 含结核菌素 5 个单位的纯蛋白衍生物(PPD), 一般在左前臂掌侧中下 1/3 交界处作皮内注射, 使之形成 6~10mm 的皮丘, 故选 C。

91. 患儿, 女性, 4 岁, 发热 4 天后耳后、颈部出现大片淡红色充血性斑丘疹, 大小不等, 体温 39.5℃, 护士可采取以下哪项护理措施

- A. 乙醇擦浴
- B. 冰枕降温
- C. 阿司匹林口服
- D. 冰盐水降温灌肠
- E. 卧床休息, 多饮温开水

91. 答案: E

解析: 处理麻疹高热时不宜用药物及物理方法强行降温, 尤其禁用冷敷及酒精擦浴, 因体温骤降可引起末梢循环障碍而使皮疹突然隐退, 应嘱患儿卧床休息, 多饮温开水, 故选 E。

92. 患儿, 男, 4 岁, 人工喂养, 为保证其生长发育, 每日蛋白质 40g, 其中优质蛋白供给是总蛋白的

- A. 1/3~1/2
- B. 1/3~1/4
- C. 1/4~1/5
- D. 2/3~3/4
- E. 1/3~3/4

92. 答案: A

解析: 蛋白质由 20 种基本氨基酸组成, 其中作为优质蛋白质的 8 种必需氨基酸, 在体内不能合成或合成的速度不能满足机体需要, 所以需直接由食物供给 1/2 的优质蛋白质, 故选 A。

93. 患儿, 8 个月, 腹泻、呕吐频繁, 医嘱禁食, 护士告诉家长患儿需要禁食的时间为

- A. 1~2h
- B. 2~4h
- C. 4~6h
- D. 6~8h
- E. 8~10h

93. 答案: C

解析: 当发生急性腹泻时, 有严重呕吐者, 可以暂时禁食 4~6 小时, 不必禁水。故而 C 正确。

94. 新生儿患败血症, 其体温 38.4℃, 应采取的护理措施是

- A. 冷盐水灌肠
- B. 打开包被
- C. 给退热药
- D. 加被发汗
- E. 酒精擦浴

94. 答案: B

解析: 当体温过高时, 予物理降温及多喂开水, 一般不予降温药物。故而 A、C、D 不选, 新生儿的皮肤娇嫩, 酒精对皮肤有刺激, 因不作为婴儿降温首选方式, 故而选 B。

95. 新生儿，胎龄 35 周，出生体重 2000g，按新生儿分类应属于

- A. 足月儿
- B. 足月小样儿
- C. 正常体重儿
- D. 低出生体重儿
- E. 很低出生体重儿

95. 答案：D

解析：低出生体重儿：出生体重不足 2500g 的新生儿，D 正确。足月儿：指胎龄满 37 周为满 42 周的新生儿，体重为 2500~4000g 的新生儿，故 A 不正确。正常体重儿：指出生体重为 2500~4000g 的新生儿，故 C 不正确。新生儿体重分类标准：①按胎龄分类：足月儿、早产儿、过期产；②根据出生体重分类：正常出生体重儿、低出生体重儿（极低出生体重儿、超低出生体重儿）；③根据出生体重分类：适于胎龄儿、小于胎龄儿、大于高龄儿。(4) 高危儿。故排除 B、E 答案。

96. 患儿，男，1 岁，腹泻、呕吐 4~5 天，经补液脱水基本纠正，但其四肢无力、腹胀、心音低钝、精神萎靡、腱反射减弱。考虑该患儿可能是

- A. 酸中毒
- B. 低钾血症
- C. 低钙血症
- D. 低镁血症
- E. 低血糖

96. 答案：B

解析：低钾时常见症状为肌无力和发作性软瘫，可使心肌应激性减低、出现各种心律失常和传导阻滞等。

97. 患儿，男性，3 岁，发热 1 天后胸背部出现大片淡红色斑疹，继而迅速发展为透明的椭圆形小水泡，周围伴有红晕，体温 39.6℃，此时护士不宜采取的措施是

- A. 温水洗浴
- B. 冰枕降温
- C. 阿司匹林口服
- D. 冰盐水降温灌肠
- E. 卧床休息，多饮温开水

97. 答案：C

解析：典型水痘前驱期仅 1 天左右，表现为低热、不适、厌食、流涕、咳嗽等，常在起病当天或次日出现皮疹，本例患儿的症状符合水痘的诊断，水痘患儿多有中低度发热，不必用药物降温，如有高热，可用物理降温或适量退热剂，忌用阿司匹林，以免增加 Reye 综合征的危险，故选 C。

98. 患儿，男，孕 35 周早产分娩于家中，生后 2 天体温 35℃，哭声较低，拒奶，全身及四肢冷，两小腿外侧轻度水肿，皮肤光滑呈暗红色。血白细胞 $6.0 \times 10^9/L$ ，血糖 2.4mmol/L。其诊断最有可能的是

- A. 低血糖
- B. 败血症
- C. 硬肿症
- D. 心肌炎
- E. 肺炎

98. 答案：C

解析：读题提取患儿病情为早产儿、低体温、水肿、白细胞低、血糖正常。结合新生儿寒冷损伤综合征又名硬肿症的主要诊断要点：低体温、硬肿（由皮脂硬化和水肿所形成）、多器官功能损害，可确定 C 为正确答案。

99. 女婴，10 个月，母乳喂养，6 个月开始添加辅食，生长发育良好，家长咨询其断奶最佳月龄，正确的是

- A. 4~5 个月
- B. 6~7 个月
- C. 8~9 个月
- D. 10~12 个月
- E. 14~16 个月

99. 答案：D

解析：断奶是一个自然的过程，从 4~6 个月开始正确地添加辅食，12 个月左右可以断奶。故而是 D。

100. 患儿男，生后第 10 天发现口腔粘膜出现小片状白色乳凝块样物，不易擦拭，周围粘膜正常。进食、精神尚可。引起该病的病原微生物是

- A. 单纯疱疹病毒
- B. 链球菌
- C. 金黄色葡萄球菌
- D. 肺炎链球菌
- E. 白色念珠菌

100. 答案：E

解析：鹅口疮多发生于新生儿，主要病因是产道感染或乳头不洁，乳具污染等。口腔黏膜覆盖白色乳凝块样片状物，一般无全身症状，患处不痛、不流涎、不影响吃奶。根据患儿的临床表现即可诊断该患儿是鹅口疮，致病菌是白色念珠菌。E 正确。单纯疱疹病毒是疱疹性口炎的致病菌，A 不正确。链球菌、金黄色葡萄球菌是溃疡性口炎的致病菌，故 B、C 不正确。肺炎球菌是肺炎球菌肺炎的致病菌，E 不正确。