

有机磷杀虫剂的主要毒理作用是

- A.抑制胆碱酯酶活性
- B.抑制胆碱能神经
- C.抑制乙酰胆碱
- D.抑制交感神经
- E.抑制副交感神经

答案:A

确诊心瓣膜病变最常用的辅助检查是

- A.X线检查
- B.心电图
- C.心脏导管检查
- D.超声心动图
- E.心室造影

答案:D

伤寒最主要的传播途径是

- A.水源传播入
- B.蚊蝇
- C.血源传播
- D.鼠类传播
- E.器官移植传播

答案:A

肺心病肺动脉高压形成的最主要因素是

- A.继发性红细胞增多
- B.血液黏稠度增加
- C.血容量增加:
- D.肺部毛细血管微小栓子形成
- E.缺氧及二氧化碳潴留引起肺小血管收缩痉挛

答案:E

患者，女，36岁。高血压病史14年，口齿不清，口角歪斜，左侧肢体活动障碍就诊，目前最合适的检查是

- A.脑血管造影
- B.脑电图检查
- C.头部CT扫描
- D.腰穿脑脊液检查
- E.脑超声波检查

答案:C

患者，男，65岁。因诊断甲亢一直坚持服用他巴唑1年，目前无任何不适,下列哪项指标提示仍需坚持服药



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- 
- A.甲状腺扫描示弥漫性.甲状腺肿大  
B.血清总 T3、总 T4 增高  
C.贫血、血沉加快  
D.T3 抑制性试验可疑阳性  
E.C 反应蛋白增高  
答案:C

患者，男性，75 岁，因呕吐入院。诊断幽门梗阻。患者可发生

- A.代谢性酸中毒  
B.代谢性碱中毒  
C.呼吸性酸中毒  
D.呼吸性碱中毒  
E.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒  
答案:

患者，男，42 岁。腹痛伴呕吐 4 天，怀疑为急性胰腺炎，最有价值的检查是

- A.血清淀粉酶  
B.尿淀粉酶  
C.血清脂肪酶  
D.X 线  
E.血常规  
答案:C

解析:4 天后血清淀粉酶下降

护士叮嘱肺心病人陪护，不可调高吸氧流量。肺心病人不能高浓度吸氧，其机制为

- A 缺氧不是上因素  
B 会引起氧中毒  
C 促进 CO<sub>2</sub> 排出过应  
D.能解除缺氧对外周化学感受器的刺激  
E 诱发代谢性酸中省  
答案:D

正常 1 岁 8 个月的小儿乳牙:

- A 8-10 个  
B 10-12 个  
C 18—20 个  
D 14-16 个  
E 20-22 个  
答案:D

2:3:1 液组成是 ( )

- 
- A、2份0.9%NaCl,3份5%GS,1份1.4%NaCO<sub>3</sub>
  - B、3份0.9%NaCl,2份5%GS,1份1.4%NaCO<sub>3</sub>
  - C、2份10%NaCl,3份5%GS,1份5%NaCO<sub>3</sub>
  - D、2份10%NaCl,3份5%GS,1份1.4%NaCO<sub>3</sub>
  - E、2份0.9%NaCl,1份5%GS,3份1.4%NaCO<sub>3</sub>

答案:D

我国卫生部规定, 婴儿必须在生后1年内完成预防接种疫苗是 ( )

- A、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百、白、破混合疫苗、麻疹疫苗、乙肝
- B、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百、白破混合疫苗、腮腺炎疫苗, 流感
- C、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百、白、破混合疫苗、甲肝疫苗, 风疹
- D、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百、白、破混合疫苗、麻、腮、风疫苗
- E、卡介苗、脊髓灰质炎疫苗、百、白、破混合疫苗、流脑疫苗、乙脑

答案:A

早产儿寒冷损伤综合征的最主要原因是

- A.早产
- B.窒息
- C.缺乏肺泡表面活性物质
- D.保暖不足
- E.缺乏棕色脂肪

答案:E

有关异位妊娠, 正确的是

- A.异位妊娠以输卵管峡部的发生率最高
- B.输卵管壶腹部的破裂症状一般比输卵管峡部严重
- C.异位妊娠发生在卵巢比发生在输卵管多
- D.异位妊娠时, 子宫内膜也发生蜕膜变化
- E.子宫直肠陷凹穿刺未能抽出血液, 则肯定可除外异位妊娠

答案:D

---

15. 维持子宫在盆腔正中位置的韧带是:

- A. 圆韧带
  - B. 阔韧带
  - C. 主韧带
  - D. 宫骶韧带
  - E. 骶棘韧带
- 答案:B

妊娠 24 周后听胎心部位错误的是

- A. 骶右前位, 在母体脐上右侧听
  - B. 枕左前位, 胎心在母体右下腹听
  - C. 肩先露在母体脐附近听
  - D. 枕右前位在母体右侧听最响
  - E. 骶左前在母体脐上左侧
- 答案:B

男性, 50 岁。夜间上腹烧灼痛发作 2 个月余, 进食或服阿托品后迅速缓解, 诊断为十二指肠溃疡。进食后疼痛缓解的机制是

- A. 交感神经兴奋
  - B. 胃酸被中和
  - C. 胃酸增多
  - D. 平滑肌松弛
  - E. 迷走神经张力增加
- 答案:B

低渗性脱水时, 体液容量的变化特点为

- A. 细胞外液正常, 细胞内液减少
- B. 细胞外液减少, 细胞内液正常
- C. 细胞外液显著减少, 细胞内液轻度减少

---

D、细胞外液轻度减少，细胞内液显著减少

E、细胞外液、内液按比例减少

答案: C

反映腔静脉及右心房的压力

A.BP

B.CVP

C.PAP

D.CO

E.PAWP

答案: B

术后疼痛对于病人的影响不包括

A、肺通气功能增加，二氧化碳排出过多

B、血压升高，心动过速

C、胃肠道蠕动能力下降

D、免疫系统受到抑制

E、产生不良情绪

答案: A

急性胰腺炎病人，最能提示出血坏死型的实验室检查结果是

A、低血钙

B、血清淀粉酶明显增高

C、低血磷

D、白细胞计数明显升高

E、高血糖

答案: A

关于肾结核的血尿特点，正确的是

- A、全血尿
- B、终末血尿
- C、无痛性血尿
- D、运动后血尿
- E、初血尿

答案: B

女性, 69 岁, 跌倒后造成左股骨颈骨折, 行走困难, 被收入院。若其 x 线片显示其远端骨折线与两髂嵴连线的夹角(Pauwells 角)为  $60^\circ$ , 说明此骨折属于

- A、头下型骨折
- B、经颈型骨折
- C、基底部骨折
- D、内收型骨折
- E、外展型骨折

答案: D

颅内压增高时颅内压的调节主要通过

- A、脑组织从高压区向低压区部分移位
- B、脑静脉血被排挤到颅腔外
- C、颅腔内脑脊液量的减少
- D、脑血管的自动调节
- E、脑组织被压缩

答案: C

男性病人, 45 岁, 牧民。有吸烟及饮酒习惯 20 年, 咳嗽少痰 4 个多月, 半月来声音嘶哑, 检查提示左肺门病变, 但未能确诊, 为了确诊应采取下列措施, 除了

- A、痰查癌细胞
- B、胸部正侧位 X 线摄片
- C、经皮穿刺取活检
- D、胸部 CT
- E、支气管镜检查

答案: C

---

下列叙述体现系统原理的管理思想的是（）

- A.管理活动中以做好人的工作为根本
- B.管理活动中重视处理人际关系
- C.管理活动要把握全局，总体规划
- D.管理活动要注意讲求实效
- E.管理活动要强调成本控制

答案:C

解析:1. AB 为人本原理，DE 为效益原理，故选 C  
(考点:第二章 第二节现代管理原理与原则)

首先根据公平的原则，迅速找到双方的共同点，然后找出他们之间最大的可容点和心理接受点，从而使双方都退让一步。达成彼此可以暂时接受的协议，这种方式属于（）

- A.推延
- B.妥协
- C.和平共处
- D.教育
- E.转移目标

答案:B

解析:A.推延:拖延时间，以期待环境的变化来解决分歧。

C.和平共处:对于一些无原则的纠纷:大事讲原则，小事讲风格（大小和）

D.教育:了解冲突所带来的后果，帮助他们改变思想和行为。

E.转移目标:引进一个外部竞争者，故选 B

(考点:第八章 第一节冲突)

属于时间管理策略的是（）

- A.每件事都亲力亲为
- B.学会合作
- C.列出目标，及时完成
- D.充分利用自己的最佳工作时间
- E.排列顺序，分配时间

答案:D

解析:3. A:学会授权；B 纯干扰；CE:为 ABC 时间管理步骤，不是策略  
故选 D (考点:第三章 第四节时间管理)

根据决策的主体不同可划分为 ( )

- A.确定型决策及不确定型决策
- B.常规决策与非常规决策
- C.个人决策与团体决策
- D.战略决策与战术决策
- E.程序化决策与非程序化决策

答案:C

解析:4. A:按确定性划分; B:干扰; D:按重要性; E:按重复性, 故选 C  
(考点:第三章 第五节决策)

某三级甲等综合医院有床位 3500 张, 病区 65 个, 科护士长 3 名, 每位科护士长分管 20 余个病区, 因此每人都感到身心疲惫, 力不从心, 该院在组织设计中忽略了 ( )

- A.目标统一原则
- B.分工协作原则
- C.有效管理幅度原则
- D.最少层次原则
- E.集权与分权原则

答案:C

解析:5. 每位科护士长分管 20 余个病区:管理幅度太大, 故选 C  
(考点:第四章 第二节组织设计)

某医院有 600 张病床, 根据编制原则, 其护理人员的编设最少约为 ( )

- A.336-357
- B.336~380
- C.480~510
- D.400~450
- E.450~500

答案:A

解析: > 500 张床:床位与工作人员之比:1:1.6~1:1.7

所以: $600 \times (1.6 \sim 1.7) = 960 \sim 1020$

卫技人员:  $(960 \sim 1020) \times 70\% = 672 \sim 714$  (题目让算最少, 所以按 70%)

护理:  $(672 \sim 714) \times 50\% = 336 \sim 357$ , 故选 A

(考点:第五章 第二节护理人力资源配置与排班)



---

领导对初步成熟的下属充分给予说明、指导体现了 ( )

- A.高工作，低关系
- B.高才能，高效率
- C.低工作，低关系
- D.低工作，高关系
- E.高工作，高关系

答案:E

解析:A.高工作，低关系:不成熟; B.高才能，高效率:干扰; C.低工作，低关系:成熟 D.低工作，高关系:比较成熟; 故选 E

(考点:第六章 第一节领导工作概述)

护士告诉某新入院患者到放射科去做检查,但是忘了给申请单,也未告诉患者在哪里做检查,导致患者在门诊耽误了很长时间,该护士的行为属于沟通障碍中的 ( )

- A.目的不明，导致信息内容不准确
- B.表达模糊，导致信息传递错误
- C.选择失误，导致信息误解的可能性增大
- D.言行不当，导致信息理解错误
- E.过度加工，导致信息的模糊或失真

答案:A

解析:属于目的不明:未给申请单,也未告诉患者在哪里做检查,排除 BCD;

E 为接收者的问题,题目并未体现出,故选 A

(考点:第七章 第二节沟通障碍)

使组织实际活动与计划活动相一致,保证完成组织在计划中提出的任务和目标,体现的控制特征是 ( )

- A.信息的准确性
- B.反馈的及时性
- C.标准合理性
- D.适用性
- E.明确的目的性

答案:E

解析:A.信息的准确性:信数据准确可靠;

B.反馈的及时性:及时反馈,及时解决;

C.标准合理性:标准要先进合理能达到;

D.适用性:检查方式、方法,故选 E

(考点:第九章 第一节控制工作概述)

在 PDCA 循环中, 按照拟定的质量计划、目标、措施及分工要求付诸行的阶段称为 ( )

- A.计划阶段
- B.执行阶段
- C.检查阶段
- D.反馈阶段
- E.提高阶段

答案:B

解析:A.计划阶段:制定质量方针、目标、措施和管理项目,

C.检查阶段:把执行结果与预定目标进行对比

处理阶段:总结经验教训

没有 DE, 故选 B (考点:第十章 第三节护理质量管理模式)

不属于高度危险性物品的是

- A . 腹腔镜
- B . 穿刺针
- C . 脏器移植物
- D . 麻醉机管道
- E . 活体组织检查钳

答案:D

患者刘某, 男性, 19 岁, 因发热、呕吐 3 天, 伴巩膜黄染, 查血丙氨酸氨基转移酶, 诊断为肝炎收入院, 他的学生证、月票、钱币应使用的消毒方法是

- A.高压蒸汽灭菌
- B.熏蒸法
- C.喷雾法
- D.光照法
- E.擦拭法

答案:B

---

患者刘某，患二期梅毒。出院后，护士对其床单、被褥消毒方法为

- A、含氯消毒剂浸泡(250 ~ 500mg/L)
- B、含氯消毒剂浸泡(500 ~ 1000mg/L)
- C、含氯消毒剂浸泡(1000 ~ 1500mg/L)
- D、含氯消毒剂浸泡(2000 ~ 2500mg/L)
- E、含氯消毒剂浸泡(2500 ~ 3000mg/L)

答案:A

解析:对居室的家具表面、病人的内衣、内裤、被褥、床单、浴巾、毛巾等的消毒,可用煮沸、含氯消毒剂浸泡(250 ~ 500mg/L)方法进行

患者, 男性, 40 岁, 乙型肝炎住院治疗。下列处理措施错误的是

- A、被褥用含氯消毒剂浸泡 30 分钟
- B、病室的地板门窗可使用含氯消毒剂等中水平以上的消毒剂消毒
- C、工作人员接触病人前后应用 0.5%氯己定等消毒剂涂擦双手和皮肤
- D、病人的血液不慎洒在地上, 应就地用含氯消毒剂消毒后再做清洁处理
- E、被污染的医疗用具用含有效氯 500mg/L 的消毒剂浸泡消毒

答案:E

抗菌药物的选择及其合理使用是控制和治疗院内感染的关键和重要措施。不符合合理使用抗生素的原则的是:( )

- A. 病毒性感染者不用
- B. 尽量避免皮肤粘膜局部使用抗生素
- C. 联合使用必须有严格指征
- D. 发热原因不明者若无明显感染的征象可少量应用
- E. 应做药敏试验, 针对性选用抗生素,

答案:D

受到肝炎患者排泄物、分泌物、血液等污染的器材和物品应

- A. 先消毒, 再清洗
- B. 先消毒, 再清洗, 再消毒
- C. 先消毒, 再清洗, 使用前再按物品污染后危险性的种类进行消毒或灭菌
- D. 先清洗, 再消毒, 使用前再按物品污染后危险性的种类进行消毒或灭菌

---

E. 使用前按物品污染后危险性的种类, 选择消毒灭菌方法

答案:C

人体微生态平衡的影响因素不包括下列哪一项

A. 机体的疾病状态

B. 应用潜入性器械

C. 免疫调节受抑制

D. 手术治疗

E. 使用大量广谱抗生素

答案:C

关于医院感染监测错误的是

A. 医院感染监测可分为全面综合性监测和目标监测两大类

B. 全面综合性监测是感染控制的先行, 是医院感染工作的基础

C. 目标检测是在全面综合性监测的基础上, 针对高危人群、高发感染部位等开展的医院感染及其危险因素的监测

D. 医院感染监测的最终目标: 减少医院感染及其造成的损失, 保证医疗安全

E. 医院感染每项目标监测持续时间应连续 1 个月以上

答案:E

解析: 6 个月以上

贝贝刚刚五岁, 总是不停地问妈妈“为什么”的问题, 对周围的东西充满了好奇, 喜欢表现自己。贝贝正处在人生发展的

A. 被动发展阶段

B. 主动发展阶段

C. 自主发展阶段

D. 巩固发展阶段

E. 晚年发展阶段

答案:B

---

下列哪项不属于倾向因素（ ）

- A.知识
  - B.态度
  - C.榜样
  - D.价值观
  - E.信念
- 答案:C

下列哪项不是社会环境的内容（ ）

- A.人均国民生产总值、人均年收入水平、人均住房面积、人均绿化面积
  - B.入学率、文盲率、风俗习惯
  - C.卫生法规、政策的建立、执行情况。
  - D.健康教育机构的专业人员组成、设备条件
  - E.目标人群生活环境的物理、经济、文化和疾病等状况
- 答案:E

某社区居民的吸烟率比较高，计划通过健康教育，3年后将该社区居民吸烟率下降20%，在制定戒烟健康教育计划的总体目标时，不需要考虑的内容是（ ）

- A.Who - 对象
  - B.What - 实现什么变化
  - C.How much - 变化的程度
  - D.How to measure - 测量的方法
  - E.where - 地点
- 答案:E

患者健康教育的实施程序中不包括下列哪一项

- A.确定教育目标
- B.确定干预方案
- C.制订教育计划
- D.实施教育计划
- E.评价教育效果

---

答案:B

根据“知信行模式”，帮助个体成功戒烟的基础是

- A.寻找戒烟同伴
- B.说明吸烟的危害
- C.产生自愿戒烟的决心
- D.形成吸烟危害健康的信念
- E.产生戒烟行为

答案:B

健康教育与卫生宣教的区别在于

- A . 注重知识灌输
- B . 注重环境改善
- C . 注重教育效果评价
- D . 不仅注重知识的改变而且注重行为的改变
- E . 注重计划教育

答案:D

某女性，停经 2 月余，突然下腹部剧烈疼痛，阴道少量出血，晕厥一次，查体:血压 70/40mmHg，脉率 110 次/分，下腹部压痛，移动性浊音(+);妇科检查示:宫颈抬举痛(+)，右侧附件可触及 3cm×4cm 的囊性肿物，后穹隆穿刺抽出 2ml 暗红色不凝血。此时应立即做

- A、 升压药物
- B、 剖腹探查止血
- C、 输血补液
- D、 宫腔镜检查
- E、 待休克纠正后手术

答案:B

初产妇，因第二产程延长，胎吸分娩，胎儿体重 4000g，胎儿娩出后阴道持续出血，色鲜红，

---

有凝血块。阴道出血原因最可能是

- A、产后宫缩乏力
- B、软产道裂伤
- C、胎盘剥离不全
- D、凝血功能障碍
- E、子宫破裂

答案:B

某初产妇足月临产，羊膜已破，羊水呈淡绿色，稍黏稠，检查示:宫口开全，头先露 S+2，LOA，胎心 162 次/分，此时的处理应是

- A、静脉滴注缩宫素
- B、剖宫产
- C、产钳助产
- D、等待自然分娩
- E、头皮牵引

答案:C

45 岁已婚妇女，有糖尿病史，近日发现外阴痒，白带多。检查:白带黏稠，典型豆腐渣样，阴道壁充血，宫颈光滑。

可能诊断为

- A、滴虫性阴道炎
- B、霉菌性阴道炎
- C、老年性阴道炎
- D、宫颈糜烂
- E、非特异性阴道炎

答案:B

为确定诊断，进一步应检查

- A、双合诊
- B、尿常规

- 
- C、阴道窥器检查
  - D、阴道分泌物悬滴检查
  - E、宫颈黏液检查
- 答案:D

女，8个月。因发热，咳嗽咳痰2天，气急伴发绀2小时入院。体检:体温38.9℃，呼吸80次/分，双肺闻及细湿啰音，心率180次/分，心音低钝，肝肋下4cm。该患儿的临床诊断可能是

- A、毛细支气管炎
  - B、腺病毒肺炎
  - C、支原体肺炎
  - D、支气管肺炎并心衰
  - E、肺炎并中毒性脑炎
- 答案:D



先天性心脏病右向左分流型最明显的外观特征是

- A、心脏杂音
  - B、发育迟缓
  - C、持续发绀(青紫)
  - D、心前区隆起
  - E、活动耐力下降
- 答案:C

下列哪项不是小儿肾病综合征的临床表现

- A、明显的水肿
  - B、高胆固醇血症
  - C、大量蛋白尿
  - D、尿中大量细菌
  - E、低蛋白血症
- 答案:D



---

成人脉压 55mmHg, 可见于

- A.心包积液
- B.主动脉瓣狭窄
- C.严重二尖瓣狭窄
- D.甲状腺功能减退
- E.主动脉瓣关闭不全

答案:E

肾病综合征患者尿中蛋白含量为.

- A. >150mg/d
- B.1~2g/d
- C.2~3g/d
- D.3~3.5g
- E.>3.5g/d

答案:E

不属于肝硬化门脉高压表现的是

- A.脾大
- B.肝大
- C.腹水
- D.痔静脉扩张
- E:食道下段静脉曲张。

答案:A

患者, 女, 冠心病, 心衰。缓慢行走即出现心悸、气短症状, 休息后可缓解。其心功能分级应为

- A.正常心功能
  - B.心功能 I 级
  - C.心功能 II 级.
  - D.心功能 III 级..
  - E.心功能 IV 级
- 答案:D

符合中枢性瘫痪的临床特征是

- A.肌肉萎缩
- B.肌张力增高
- C.腱反射减低
- D.无病理反射
- E.以肌群瘫痪为主

答案:B

解析:大脑皮质运动区或锥体束损害引起对侧肌体单瘫或偏瘫, 称上运动神经元瘫痪、中枢性瘫痪或痉挛性瘫痪。

主要特点:瘫痪肌肉肌张力增高, 腱反射亢进, 浅反射消失, 出现病理反射, 瘫痪肌肉无萎缩, 肌电图显示神经传导正常, 无失神经支配电位。

患者, 男, 45 岁, 聚餐后出现腹部疼痛, 诊断急性胰腺炎。最能提示出血坏死型胰腺炎的表现是

- A.上腹痛向腰背部放射
- B.两侧肋腹部皮肤呈暗灰蓝色瘀斑
- C.上腹部压痛、反跳痛
- D.频繁呕吐
- E.黄疸

答案:B

关于 HIV 感染临床 II 期的叙述, 错误的是

- A.没有任何临床症状
- B.血中检测不出 HIV
- C.血中可检出 HIV 抗体
- D.血中检出 pF4

E.有传染性

答案:B

格列吡嗪的服药时间是

A.餐前半小时

B.进餐时或餐后

C.第一口饭同时嚼服

D.空腹

E.餐后半小时

答案:E

解析:胰岛素促泌剂应在饭前半小时口服,易发生低血糖反应。

属于全杀菌剂的抗结核药是

A.异烟肼+利福平

B.利福平+链霉素

C.链霉素+对氨基水杨酸钠

D.乙胺丁醇+吡嗪酰胺

E.对氨基水杨酸钠+乙胺丁醇

答案:A

解析:对氨基水杨酸钠+乙胺丁醇—抑菌

链霉素+吡嗪酰胺—半杀菌剂

林先生, 35岁, 体重 70 kg。左上肢、双下肢(不含臀部)被开水烫伤, 创面可见大水疱, 疱壁薄, 部分水疱破裂, 基底潮红, 水肿明显, 疼痛剧烈。第 1 个 24h 胶体补液量为

A、2625 ml

B、3250 ml

C、5000 ml

D、5252 ml

E、7250 ml

答案:A

---

甲状腺功能亢进(甲亢)术后出现误咽、呛咳是由于

- A、喉返神经损伤
- B、喉上神经外支损伤
- C、喉上神经内支损伤
- D、副神经损伤
- E、舌咽神经损伤

答案: C

病人大面积烧伤已 6 天, 体温突然下降至常温以下, 白细胞减少、脉速、血压下降, 全身情况恶化, 应考虑发生

- A、毒血症
- B、菌血症
- C、脓毒血症
- D、革兰阴性杆菌败血症
- E、革兰阳性球菌败血症

答案: D

患者腹部外伤, 致伤外力于右上腹, 伤后突感上腹疼痛, 2 h 后疼痛加剧, 疼痛主要位于右上腹, 且有时对应部位的背部疼痛, 曾有血性呕吐物。X 线检查腹膜后有气体, 应考虑的诊断是

- A、肝破裂
- B、胆囊破裂
- C、右肾破裂
- D、十二指肠破裂
- E、腹膜后血管破裂

答案: D

下列哪项是神经根型颈椎病的临床表现

- A、颈部疼痛向后背放射
- B、神经系统检查定位体征不明确
- C、上肢牵拉试验阴性

- D、压头试验阳性  
E、Hoffmann 征阳性  
答案:D

男性，60岁，肝癌切除术后7天，用力排便后站起时突然晕倒，大便呈柏油样，检查发现血压为10/6 kPa(75/45 mmHg)，心率为120次/分，最可能的诊断是什么

- A、肝昏迷  
B、应激性溃疡  
C、手术面渗血  
D、感染性休克  
E、肺梗死  
答案:B

男性病人，67岁。间歇性跛行6年，弯腰及下蹲时疼痛减轻，腰椎压痛(-)，后伸痛明显。X线平片显示腰椎骨质增生明显。最可能的诊断是

- A、腰椎管狭窄症  
B、腰椎间盘突出症  
C、慢性腰肌劳损  
D、马尾肿瘤  
E、棘间韧带损伤  
答案:A

女性，60岁，剑突下持续性疼痛6h，寒颤、高热伴黄疸。既往有类似发作史。体检：神志淡漠，体温39℃，血压10.7/8 kPa(80/60 mmHg)，脉搏120次/分，剑突下压痛，肌紧张，白细胞 $26 \times 10^9/L$ 中性0.95。肝区叩击痛，血清胰淀粉240索氏单位。若此病人采用手术治疗，预计病人术后引流管至少留置

- A、24h  
B、1个月  
C、7天  
D、14天  
E、3天  
答案:D

---

有关孕期检查的四步触诊法，下列错误的是

- A、可以了解子宫的大小、胎先露、胎方位
- B、第一步是双手置于宫底部了解宫底高度，并判断是胎头还是胎臀
- C、第二步是双手分别置于腹部两侧，辨别胎背及胎肢的方向
- D、第三步是双手置于耻骨联合上方，判断先露部为头还是臀
- E、第四步是双手向骨盆入口方向插入，进一步检查先露部，并确定入盆程度

答案:D

妊娠高血压征妇女使用硫酸镁解痉时，应停用药物的情况是

- A、尿量 30ml/h
- B、呼吸 15 次/分
- C、膝反射亢进
- D、血压 130/90mmHg
- E、自觉症状消失或减轻

答案:B

有关破膜的处理，错误的是

- A、破膜后即听胎心音
- B、记录破膜时间
- C、观察羊水性状
- D、胎头高浮者，须抬高床尾
- E、破膜超过 10 小时，需给予抗生素

答案:E

某女士流产两次，早产一次，足月产一次，现有一女，其生育史可简写为

- A、1-1-2-1
- B、1-2-1-1

---

C、2-1-1-1

D、1-1-1-2

E、1-0-1-1

答案:A

患儿女,5个月。因高热伴有喷射性呕吐入院,现患儿烦躁不安,哭闹不止,前凶隆起,下列护理措施中不妥的

A.保持室内安静

B 让患儿平卧

C 护理操作应集中进行

D 严密观察生命体征

E 静脉用降颅内压药应先快后慢

答案:B

腹泻脱水患儿补液后排尿,此时输液瓶中尚有不含钾液体300ml,此液体中最多可加入10%氯化钾

A、6ml

B、9ml

C、10ml

D、12ml

E、16ml

答案:B

患儿,男,2岁,体格瘦小,平日口唇、甲床青紫,活动、哭闹时加重。活动时喜下蹲,经查,诊断为法洛四联症。

护理此患儿要注意保证液体入量原因是

A、避免发生休克

B、避免发生便秘

C、避免发生血栓栓塞

D、避免发生心力衰竭

E、避免发生肾衰

答案:C

患儿如突然出现呼吸困难、青紫加重,应首先采取的体位是

A、平卧位

- B、端坐位
- C、中凹卧位
- D、膝胸卧位
- E、头低脚高位

答案:D

指导肺气肿患者腹式呼吸锻炼, 不正确的方法是

- A.呼与吸时间比为 2:1 或 3:1
- B.呼气时腹部内陷, 尽量将气呼出.
- C. 每分钟呼吸 16 ~ 20 次
- D.用鼻吸气, 用口呼气, 要求深吸缓呼, 不可用力
- E.每日锻炼 2 次, 每次 10~20min

答案:D

解析:每分钟呼吸 7~8 次

一小细胞肺癌病人接受放疗, 针对病人皮肤的护理不妥的是

- A.皮肤放射部位涂的标志在照射后切勿擦去
- B. 忌贴胶布, 不用碘酊、汞溴红涂擦
- C. 洗澡不用肥皂或搓擦, 亦不用化妆品涂擦
- D. 暴露放疗部位, 防止摩擦,
- E. 避免阳光照射、冷热刺激

答案:D

解析:穿宽松柔软的衣服, 防止摩擦。

患者, 男性, 58 岁, 突然心悸, 气促, 咯粉红色泡沫样痰, 血压 19 5/9 0 mmHg, 心率 136 次/分, 应首先备好下列哪组药物

- A .毛花苷 C 硝酸甘油 异丙肾上腺素
- B .硝普钠 毛花苷 C 多巴胺
- C. 胍乙啶 酚妥拉明 毛花苷 C
- D.毒毛旋花子素K 硝普钠 普萘洛尔
- E 硝普钠 毛花苷 C 呋塞米

答案:E

心悸的描述中不正确的是

- A.各种器质性心血管病可致心悸
- B.心律失常可致心悸
- C.情绪激动可致心悸
- D.心悸的严重程度和病情成正比
- E.心悸一般无危险性

答案:D

心绞痛发作处理不正确的是

- A.立即停止活动卧床休息



- 
- B.给予氧气吸入，维持血氧饱和度 90%以上
  - C.给予硝酸甘油舌下含服，可多次给药，直至症状缓解
  - D.24 小时心电监护
  - E.避免情绪紧张激动

答案:C

指导病人服用枸橼酸铋钾(CBS)时，错误的叙述是

- A.可有恶心、一过性血清转氨酶升高
- B.可用吸管直接吸入
- C.可出现便秘和黑色大便
- D.最好在餐后半小时服用
- E.极少数病人可出现急性肾衰竭

答案:D

病人询问护士，慢性肾衰竭伴发心力衰竭的原因，护士的回复不正确的是

- A.高血压
- B.水钠潴留
- C.消化道出血
- D.尿毒症性心肌病变
- E.严重贫血

答案:C

急性肾小球肾炎的治疗措施中不正确的是

- A.1~2 年内避免重体力活动和劳累
- B.有水肿及高血压者每日盐摄入量 2~3g/d
- C.鼓励病人摄入优质蛋白，摄入量约 1 g/d
- D.应用激素及免疫抑制剂
- E.可用中药辅助治疗

答案:D

关于结核菌素试验检查的意义，不正确的是

- A.阴性提示肯定没有结核分枝杆菌感染
- B.阳性仅表示感染，不一定患病
- C.结核分枝杆菌感染的 4~8 周内，结核菌素试验可为阴性
- D.应用免疫抑制剂者可为阴性
- E.严重结核病病人对结核菌素试验可无反应

答案:A

男性病人。79 岁。老年痴呆症，行前列腺电切术后 3h，强烈要求上厕所解大便。下列护理措施哪项正确

- A、满足病人要求
- B、协助病人在床上排便
- C、开塞露塞肛，促进排便
- D、向病人家属说明便秘是由于导尿管气囊压迫前列腺窝引起，可适当给予镇静剂

---

E、放出导尿管气囊内的气体或液体

答案:D

男性, 23 岁, 车祸造成脊柱骨折和脊髓损伤, 现其双上肢迟缓性瘫痪, 双下肢痉挛性瘫痪, 躯干和四肢感觉消失。对该病人受伤后 2 周内的泌尿系护理措施可采用

- A、自行排尿
- B、间歇导尿
- C、持续开放导尿
- D、出现尿潴留时插导尿管
- E、导尿管每 4~6 小时开放一次

答案:C

患者, 男, 54 岁。头部外伤后即昏迷, 持续 10h, 呕吐数次。体检: 体温 38°C, 脉搏 50 次/分, 呼吸 14 次/分, 血压 22.7/12.0kPa(170/90mmHg), 神经系统检查有阳性体征。

该病人最可能的诊断是

- A、颅内血肿
- B、小脑幕切迹疝
- C、脑挫裂伤
- D、枕骨大孔疝
- E、硬膜外血肿

答案:C

目前给予非手术治疗, 早期治疗护理的重点是

- A、抗感染
- B、纠正水、电解质紊乱
- C、使用营养脑组织药物
- D、降低颅内压
- E、防治肺部并发症

答案:D

此阶段最主要的护理诊断是

- A、有窒息的危险
- B、有感染的危险
- C、体温过高
- D、自理缺陷
- E、营养失调: 低于机体需要量

答案:A

老年男性, 发现右侧腹股沟可复性肿物 3 年。8 小时前, 用力咳嗽后突感疝块明显增大, 腹痛剧烈, 伴呕吐、发热、全身不适。查体: 右腹股沟及阴囊可扪及肿块, 张力高明显触痛。全腹有压痛、肌紧张。白细胞计数  $12 \times 10^9/L$ , 目前准备急诊手术治疗。

该病人的临床诊断为

- A、腹股沟直疝, 嵌顿性疝

- 
- B、腹股沟斜疝，嵌顿性疝
  - C、腹股沟直疝，绞窄性疝
  - D、腹股沟斜疝，绞窄性疝
  - E、股疝，绞窄性疝

答案: D

此病人的术前护理措施中不正确的是

- A、禁食、禁水
- B、备皮
- C、排空膀胱
- D、灌肠
- E、给麻醉前药物

答案: D

术后护理措施中不正确的是

- A、仰卧位
- B、术后 6 ~ 12 小时开始进流食
- C、用"丁"字带托起阴囊
- D、及时处理尿潴留
- E、鼓励病人早期下床活动

答案: E



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM