

1. (A1 型题) 界定急性呼吸衰竭是指动脉血氧分压(PaO₂)

- A. ≤ 3
- B. ≤ 4
- C. ≤ 5
- D. ≤ 6
- E. ≤ 7

1. 答案: D

解析: 6. 65kPa 即就是 50mmHg, 同上题

2. (A1 型题) 下列哪种辅食可用于 7 个月小儿

- A. 碎肉和菜汤
- B. 烂面和鸡蛋
- C. 面条和青菜汤
- D. 带馅的食品
- E. 碎肉和饼干

2. 答案: B

解析: 7 个月~8 个月小儿添加新鲜瘦肉, 肝, 鸡肉等(做成肉泥)以供给蛋白质, 维生素及矿物质, 故选择 B

3. (A1 型题) 小婴儿急性心力衰竭最常见的诱因是

- A. 过度的体力活动
- B. 情绪激动
- C. 输液量过多
- D. 输液速度过快
- E. 支气管肺炎

3. 答案: E

解析: A、B 明显错误, C、D 一般不会出现于小婴儿输液时。

4. (A1 型题) 轻度新生儿窒息错误的抢救方法是

- A. 保暖
- B. 清理呼吸道
- C. 气管插管
- D. 吸氧
- E. 刺激呼吸

4. 答案: C

解析: Apgar 评分是一种简易的临床评价新生儿窒息程度的方法。内容包括皮肤颜色、心搏速率、呼吸、肌张力及运动、反射五项体征, 每项 0~2 分, 满 10 分者为正常新生儿, 大部分新生儿的评分多在 7~10 分之间, 评分 7 分以下的新生儿考虑患有轻度窒息, 评分在 4 分以下考虑患有重度窒息。一般新生儿出生后, 分别做 1 分钟、5 分钟及 10 分钟的 Apgar 评分, 以便观察新生儿窒息情况的有无及其变化, 以此决定是否需要做处理, 以及做相应处理后, 评价新生儿的恢复情况。轻度窒息的新生儿一般经清理呼吸道、吸氧等措施后会很快好转, 不用气管插管, 预后良好; 若评分在 4 分以下或疑有分泌物堵塞气道时要进行气管插管。所以选项 C 是错误的抢救方法; 故选 C。

5. (A1 型题) 常用 OT 试验皮试液的浓度是

- A. 1: 100
- B. 1: 200
- C. 1: 1000

D. 1: 2000

E. 1: 10000

5. 答案: D

解析: OT 试验皮试第一次的皮试液浓度为 0.1 毫升含 1 个单位的结核菌素, 具体作法是: 用 1: 2000 稀释液 0.1 毫升 (5 单位) 注入前臂掌侧中、下 1/3 交界处皮内, 使之为直径 6~10 毫米的皮丘。若小儿患疱疹性结膜炎, 宜从 1:10000 稀释液开始, 以防过敏反应以及可能的内部病灶反应。每毫升原液含 10 万结核菌素单位, 稀释配制为浓度为 1: 2000。T 试验 (即旧结核菌素试验), 皮试液浓度应为 1: 2000。故本题已选择 D 项。

6. (A1 型题) 下列各类结核患儿中, 不应该出现 PPD 阴性的是

A. 初次感染 4~8 周内

B. 严重结核病

C. 1 岁以内婴儿

D. 合并麻疹

E. 合并重度营养不良

6. 答案: C

解析: PPD 阴性见于未感染过结核者、结核变态反应前期 (初次感染 4~8 周内)、假阴性反应如重症结核病、重度营养不良、麻疹患者。3 岁以下尤其 1 岁以内未接种过卡介苗者, PPD 阳性时表示体内有新的结核灶。故本题答案为 C。

7. (A1 型题) 川崎病最具特征性临床表现是

A. 发热

B. 心律不齐

C. 淋巴结非化脓性肿大

D. 指趾膜状脱皮

E. 荨麻疹样皮疹

7. 答案: D

解析: 川崎病最具特征性的临床表现是指趾膜状脱皮。发热、皮疹、心律不齐、淋巴结非化脓性肿大等表现均可出现, 但均非特异, 故本题选 D。

8. (A1 型题) 小儿断奶时间最迟不超过

A. 10 个月

B. 12 个月

C. 16 个月

D. 18 个月

E. 20 个月

8. 答案: D

解析: 当母乳的质量不能完全满足小儿生长发育的需要, 同时婴儿消化吸收功能也逐步适应非流质食物, 可自 4~5 个月添加辅助, 以补充小儿营养所需, 又为断乳做准备。要逐渐减少次数, 使母子双方在生理、心理做好准备, 10~12 个月完全断乳。若遇夏季或婴儿体弱多病时, 也可推迟断乳时间。但最迟不得超过 1 岁半。故本题应选 D。

9. (A1 型题) 低渗性脱水的特点, 下列哪项是错误的

A. 失钠的比例大于失水

B. 血清钠低于 130mmol/L

C. 易发生休克

D. 尿比重高、烦渴

E. 严重者发生惊厥和昏迷

9. 答案: D

解析: 低渗性脱水以失盐为主, 常见于病程较长, 营养不良者, 尿比重低, 血清钠低于 130mmol/L, 口渴不明显, 皮肤弹性极差, 站立位易晕倒, 可呈嗜睡或昏迷。

10. (A1 型题) 有关鹅口疮的治疗, 错误的是

- A. 2%碳酸氢钠液清洗口腔
- B. 积极治疗原发病
- C. 局部涂龙胆紫
- D. 加大抗生素剂量
- E. 局部涂制霉菌素液

10. 答案: D

解析: 鹅口疮是由于真菌感染引起的, 碳酸氢钠溶液是碱性的, 碱性的环境可以抑制真菌的生长, 对治疗鹅口疮有一定的作用, A 正确。甲紫也称龙胆紫, 主要用于皮肤和粘膜的化脓性感染、白色念珠菌引起的口腔炎, 如鹅口疮, 能够起到杀灭念珠菌的作用, C 正确。鹅口疮治疗主要以局部涂药为主, 有继发感染时可用抗生素, 抗生素剂量不宜过大, 容易杀死肠道正常菌群, 引起菌群失调, D 不正确。制霉菌素是多烯族抗真菌药, 对白色念珠菌有很好的抑制作用, E 正确。

11. (A1 型题) 儿科护理学的任务是

- A. 减少儿童发病率
- B. 增强儿童体质
- C. 降低儿童死亡率
- D. 提高儿童保健和疾病防治质量
- E. 以上都是

11. 答案: E

解析: 儿科护理学的任务是从体格、智能、行为和社会等各方面来研究和保护儿童, 对儿童提供综合性、广泛性的护理, 以增强儿童体质、降低发病率和死亡率, 保障和促进儿童健康。故本题选 E。

12. (A1 型题) 不属于儿科护士的角色的是

- A. 护理活动执行者
- B. 健康教育者
- C. 护理研究者
- D. 小儿及家庭代言人
- E. 疾病诊断者

12. 答案: E

解析: 儿科护士的角色: 专业照护者、护理计划者、健康教育者、健康协调者、健康咨询者、儿童及其家庭的代言者和护理研究者。故本题选 E。

13. (A1 型题) 法洛四联症患儿应供给充足的液体, 其主要目的是

- A. 加强营养
- B. 防止心力衰竭
- C. 防止休克
- D. 防止血栓栓塞
- E. 防止便秘

13. 答案: D

解析: 法洛四联症患儿要注意供给充足液体, 防止因血液浓缩、血液黏稠度增加导致血栓栓塞, 故选 D。

14. (A1 型题) 法洛四联症的主要临床特点组成不包括

- A. 肺动脉狭窄
- B. 室间隔缺损
- C. 主动脉骑跨
- D. 房间隔缺损
- E. 右心室肥厚

14. 答案: D

解析: 法洛四联症是右向左分流型先天性心脏病, 由以下 4 种畸形组成: ①肺动脉狭窄: 以漏斗部狭窄多见; ②室间隔缺损: 多属高位膜部缺损; ③主动脉骑跨: 主动脉骑跨于室间隔之上; ④右心室肥厚: 为肺动脉狭窄后右心室负荷增加的结果。故排除 A、B、C、E 答案, 选 D。

15. (A1 型题) 婴儿生后持续青紫, 最可能患有

- A. 房间隔缺损
- B. 室间隔缺损
- C. 肺动脉狭窄
- D. 法洛四联症
- E. 动脉导管未闭

15. 答案: D

解析: 法洛四联症最突出的表现是青紫, 多见于唇、指(趾)甲床, 眼结膜等处。因血氧含量下降, 活动耐力差, 稍稍活动即可出现气急和青紫加重。故排除 A、B、C、E 答案, 选 D。

16. (A1 型题) 腹泻患儿防臀红最有效的护理措施是

- A. 禁食
- B. 及时更换尿布
- C. 大便后及时清洗臀部
- D. 暴露臀部皮肤
- E. 臀部涂爽身粉

16. 答案: B

解析: 防臀红最有效方法是保持臀部皮肤干洁, 选用消毒软棉尿布及时更换。

17. (A1 型题) 按病理分类婴幼儿最常见的肺炎是

- A. 大叶性肺炎
- B. 支气管肺炎
- C. 间质性肺炎
- D. 干酪性肺炎
- E. 毛细支气管炎

17. 答案: B

解析: 肺炎按病理分类: 大叶性肺炎、支气管肺炎和间质性肺炎, 其中, 支气管肺炎是小儿时期最常见肺炎, 又称小叶性肺炎, 起病于支气管或细支气管, 尤其多见于 3 岁以下的婴幼儿。D、E 属病因分类, 并非病理分类。

18. (A1 型题) 确诊中毒型细菌性痢疾最有价值的检查是

- A. 粪便镜检
- B. 血白细胞计数
- C. 粪便细菌培养
- D. 嗜拭子细菌培养
- E. 血清特异性抗体检查

18. 答案: C

解析: 粪便细菌培养, 可分离志贺菌属痢疾杆菌, 是诊断中毒性细菌性痢疾最有价值的检查, C 正确。细菌性痢疾时, 粪便镜检可见大量与粘液相混的脓细胞, 常用于筛查细菌性痢疾, 故不选 A。外周血象血白细胞计数检查常作为细菌性痢疾辅助检查, 痢疾时白细胞总数增高, 故不选 B。咽部拭子细菌培养能分离出致病菌, 有助于白喉、化脓性扁桃体炎、急性咽喉炎等的诊断, 故不选 D。血清特异性抗体检查常用于梅毒的鉴别诊断, 故不选 E

19. (A1 型题) 给婴幼儿用强心苷时为预防中毒反应须做到

- A. 用药后测心率
- B. 心率 80 次/分应报告医生
- C. 可与其他药物混合注射
- D. 注射速度宜快
- E. 及时补充含钙食品

19. 答案: B

解析: 给婴幼儿用强心苷时须监测心率, 若心率 < 80 次/分应报告医生, 预防中毒反应。故本题选 B。

20. (A1 型题) 有关婴儿期辅食添加原则, 不正确的是

- A. 由少到多
- B. 由粗到细
- C. 由稀到稠
- D. 由单一到多种
- E. 循序渐进

20. 答案: B

解析: 根据小儿营养需要及消化能力循序渐进, 适应一种食品后再增加一种, 从少到多, 从稀到稠, 从细到粗, 逐步过渡到固体食物。所以只有选项 B 是错误的。

21. (A1 型题) 佝偻病活动初期的主要表现是

- A. 方颅
- B. 肋骨串珠
- C. 出牙延迟
- D. 肌张力低下
- E. 易激惹、多汗

21. 答案: E

解析: 佝偻病分期如下: ①初期(早期)以神经兴奋性增高为表现, 如易激惹、多汗, 烦闹等。因此该题选 E 答案。②活动期(激期): 主要表现为骨骼改变和运动功能及智力发育迟缓如方颅、肋骨串珠、出牙延迟、肌张力低下和肌力减弱等, A、B、C、D 均属于该期。③恢复期: 临床症状及体征消失, 精神活泼, 肌张力恢复。④后遗症期: 残留不同程度骨骼畸形, 但无临床症状, 生化检查正常。

22. (A1 型题) 典型的化脓性脑膜炎脑脊液改变是

- A. 细胞数增高、蛋白增高、糖增高
- B. 细胞数增高、蛋白增高、糖正常
- C. 细胞数增高、蛋白正常、糖增高
- D. 细胞数正常、蛋白增高、糖下降
- E. 细胞数增高、蛋白增高、糖下降

22. 答案: E

解析：化脓性脑膜炎脑脊液检查可见压力增高，外观混浊似米汤样，白细胞数显著增高，可超过 $1000/\text{mm}^3$ ，蛋白质含量增多，糖含量降低。

23. (A1 型题) 婴幼儿化脓性脑膜炎最常见的细菌是

- A. 肺炎链球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 葡萄球菌
- D. 溶血性链球菌
- E. 绿脓杆菌

23. 答案：A

解析：化脓性脑膜炎在小儿任何年龄均可发病，一年四季均有发生。一般以肺炎链球菌所致者多，其次为流感杆菌。故本题选 A。

24. (A1 型题) 急性肾炎患儿血液生化改变意义较大的是

- A. 抗“O”升高
- B. 血浆蛋白明显下降
- C. 血清补体下降
- D. 胆固醇升高
- E. 血沉增快

24. 答案：C

解析：急性肾小球肾炎时，C3 在发病初下降，8 周内恢复。诊断意义较大。

25. (A1 型题) 维生素 D 缺乏后，血钙降低刺激机体代偿分泌增加的激素是

- A. 肾素
- B. 胰岛素
- C. 甲状腺素
- D. 甲状旁腺素
- E. 肾上腺素

25. 答案：D

解析：甲状旁腺主细胞对血钙降低极为敏感，血钙轻微的降低，在 1 分钟之内即可引起甲状旁腺分泌增加，使血钙升高，血磷降低。

26. (A1 型题) 小儿结核性脑膜炎早期临床表现中主要的症状是

- A. 性情的改变
- B. 持续性头痛
- C. 喷射性呕吐
- D. 反复惊厥
- E. 明显的脑膜刺激征

26. 答案：A

解析：结核性脑膜炎临床分为前驱期（早期）、脑膜刺激期（中期）、晚期（昏迷期）。前驱期（早期）约 1~2 周，一般起病缓慢，主要症状为性情改变，精神呆滞，对周围事物不感兴趣，易疲倦或烦躁不安，可低热，厌食，盗汗，消瘦，便秘及不明原因的呕吐，年长儿可诉头痛，故 A 正确。持续性头痛、喷射性呕吐、惊厥、脑膜刺激征均是脑膜刺激期（中期）的临床表现，故不选 B、C、D、E。

27. (A1 型题) 结核性脑膜炎进入晚期的特征是

- A. 昏迷、半昏迷或强直性惊厥频繁发作
- B. 脑膜刺激征阳性
- C. 颅神经受损

- D. 腹壁反射消失
- E. 偏瘫或肢体瘫痪

27. 答案: A

解析: 结核性脑膜炎早期表现为性情改变, 同时有低热, 呕吐, 便秘年长儿可诉头痛; 中期出现剧烈头痛, 喷射性呕吐, 嗜睡或惊厥, 体温进一步升高; 晚期表现为上述症状加重, 意识朦胧, 半昏迷进入完全昏迷。故选择 A

28. (A1 型题) 维生素 D 缺乏性手足搐搦症惊厥发作时, 下列处理原则哪项是正确的

- A. 立即肌注维生素 D2 或 D3
- B. 迅速给服大剂量维生素 D
- C. 快速静脉推注 10%葡萄糖酸钙
- D. 缓慢静脉注射 10%葡萄糖酸钙
- E. 大量维生素 D 和钙剂同时使用

28. 答案: D

解析: 尽快给予 10%葡萄糖酸钙 5~10ml 加入 10%葡萄糖液稀释 1~3 倍后, 缓慢静脉注射(10 分钟以上)或滴注。惊厥停止后口服钙剂, 不可皮下或肌肉注射, 以免造成局部坏死。

29. (A1 型题) 惊厥持续状态时

- A. 惊厥持续>10 分钟
- B. 惊厥持续>20 分钟
- C. 惊厥持续>30 分钟
- D. 惊厥持续>40 分钟
- E. 惊厥持续>60 分钟

29. 答案: C

解析: 惊厥持续状态又叫癫痫持续状态, 凡一次惊厥发作(癫痫或发作)持续 30 分钟以上, 或反复发作而间歇期意识无好转超过 30 分钟者即为惊厥(或癫痫)持续状态。故选 C。

30. (A1 型题) 使用蓝光箱时, 灯管与患儿皮肤的距离应为

- A. 10~15cm
- B. 15~20cm
- C. 30~50cm
- D. 55~60cm
- E. 60~70cm

30. 答案: C

解析: 蓝光疗法灯管与患儿的距离应为 30~50cm, 故本题选 C。

31. (A1 型题) 患儿准备蓝光照身前, 以下哪项做法是错误的

- A. 患儿全身裸露
- B. 剪短指甲防止抓破皮肤
- C. 可在皮肤上涂油膏
- D. 患儿入光疗箱前需进行皮肤清洁
- E. 佩带眼罩、尿布以保护敏感器官

31. 答案: C

解析: 蓝光治疗时不能在婴儿身上涂油膏, 否则会影响治疗效果。ABDE 均正确。

32. (A1 型题) 对新生儿颅内出血的护理, 下列哪项不妥

- A. 保持安静, 避免各种刺激
- B. 注意保暖, 必要时吸氧
- C. 关肩部抬高 15°~30° 以减轻脑水肿

- D. 抱起喂乳，喂乳后拍背，以防溢乳
- E. 按医嘱应用止血剂等

32. 答案：D

解析：颅内出血患儿应保持安静，降低颅内压，不得随意搬动。

33. (A1 型题) 关于麻疹病毒的生物学特性，正确的是

- A. 是 DNA 病毒
- B. 血清型不稳定
- C. 加热易被破坏
- D. 不耐寒
- E. 对一般消毒剂不敏感

33. 答案：C

解析：麻疹病毒不耐热，56℃时 30 分钟即被破坏，C 正确。DNA 病毒的遗传物质就是 DNA。麻疹不属于遗传疾病，麻疹病毒属于粘病毒科麻疹病毒属，A 不正确。麻疹病毒抗原性较稳定，只有一个血清型，B 不正确。麻疹病毒能耐寒不怕冻，4℃可存活 5 个月，零下 15℃能存活 5 年，D 不正确。麻疹病毒对干燥、日光、高温和一般消毒剂均敏感，E 不正确。

34. (A1 型题) 麻疹的隔离期是

- A. 隔离到起病后 1 周
- B. 隔离到出疹后 1 周
- C. 无并发症隔离到出疹后 5 天，有并发症隔离到出疹后 10 天
- D. 隔离到疹退后 10 天
- E. 隔离到疹退后 15 天

34. 答案：C

解析：麻疹的潜伏期为 10~15 天，前驱期为 3~4 天，出疹 3~4 天，恢复 3~4 天。密切接触的易感儿，应隔离观察 3 周，若接触后接受过免疫抑制剂者则延长至 4 周。A 项起病后一周患者并未恢复至健康，故错误；出疹后一周，对于并发肺炎等患者仍有复发的危险，故 B 项错误；D 项片面强调出疹后 10 天的期限，对无并发症者不适用。

35. (A1 型题) 新生儿期应接种的疫苗是

- A. 麻疹减毒疫苗
- B. 破伤风抗毒素
- C. 卡介苗
- D. 乙脑疫苗
- E. 百、白、破三联疫苗

35. 答案：C

解析：麻疹减毒疫苗 8 个月以上易感患儿接种；3 个月以上小儿接种百白破三联疫苗；乙脑疫苗 1 岁以上小儿接种；卡介苗生后 2~3 天注射；破伤风抗毒素一般只在感染破伤风后使用。

36. (A1 型题) 麻疹病毒主要的传播途径是

- A. 消化道
- B. 血液
- C. 接触
- D. 呼吸道
- E. 虫媒

36. 答案：D

解析：麻疹是由麻疹病毒所致的急性传染性皮肤病，主要发生在儿童，以发热、流涕、眼结合膜炎、咳嗽、口腔粘膜斑及周身班丘疹为其临床特征。呼吸道吸入为主要的传播途径。本题选 D。

37. (A1 型题) 6 个月以内小儿最理想的食品是

- A. 母乳
- B. 牛乳
- C. 羊乳
- D. 全脂奶粉
- E. 乳儿糕

37. 答案：A

解析：母乳是婴儿最理想的天然食品，母乳中蛋白质、脂肪、糖、维生素、矿物质及水的比例适合且易于消化吸收，完全能够满足出生后 6 个月内婴儿生长发育的营养需求，不必添加任何代乳品和水；母乳中含有丰富的免疫物质，增加婴儿抗病能力；母乳中所含的氨基酸、不饱和脂肪酸和牛磺酸等，有益于婴儿大脑神经系统发育，可促进婴儿智力发育；母乳喂养不易引起婴儿过敏，且经济、方便、卫生；母乳喂养能增进母婴感情，有利于婴儿心理发育。故本题应选 A。

38. (A1 型题) III 度营养不良患儿腹壁皮下脂肪厚度应是

- A. 7~0
- B. 5~0
- C. 3~0
- D. 1~0
- E. 基本消失

38. 答案：E

解析：皮下脂肪层消耗顺序是先腹部，其次是躯干，臀部，四肢，最后为脸部，皮下脂肪层厚度是判断营养不良程度的重要指标之一。皮层脂肪厚度 0.8~0.4cm 属于 I 型营养不良(轻度)，A、B 答案属于该类型；小于 0.4cm 属于 II 型(中度)，C、D 属于该类型；基本消失属于 III 型(重度)。故本题应选 E。

39. (A1 型题) 正常小儿前卤闭合的时间最迟为

- A. 3~4 个月
- B. 5~6 个月
- C. 12 个月
- D. 18 个月
- E. 24 个月

39. 答案：D

解析：前囟为顶骨和额骨边缘形成的菱形间隙，其对边中点连线长度在出生时约 1.5~2.0cm，后随颅骨发育而增大，6 个月后逐渐骨化而变小，1~1.5 岁时闭合，故本题应选 D. 18 个月。颅骨骨缝出生时分离，约与 3~4 个月时闭合，排除 A。后囟出生时已很小或已闭合，至迟约生后 6~8 周闭合，排除其余个选项。

40. (A1 型题) 青春期最突出的标志是

- A. 体格生长速度加快
- B. 智力迅速发育成熟
- C. 生殖器官迅速发育成熟
- D. 神经系统迅速发育成熟
- E. 语言迅速发育成熟

40. 答案: C

解析: 青春期体格发育突然加速, 生殖系统迅速发育, 第二性征逐渐明显, 女性可出现月经初潮, 男性可出现遗精。

41. (A1 型题) 新生儿青紫窒息的临床表现, 错误的是

- A. 皮肤苍白, 口唇青紫
- B. 呼吸浅或不规则
- C. 心率 80~120 次/min
- D. 肌张力好
- E. 对外界刺激有反应

41. 答案: A

解析: 轻度窒息即青紫型表现为新生儿面部及全身皮肤青紫, 呼吸表浅不规则; 心率正常或可有加速, 心率 80~120 次/分; 对外界刺激有反应, 喉反射存在, 肌张力略低。重度窒息即苍白型表现为全身苍白, 无自主呼吸, 心跳不规则, 心率<80 次/min, 对外界刺激无反应, 肌张力几乎消失, 喉反射消失。本题中 B、C、D、E 都是正确的临床表现, 而 A 项是重度窒息(苍白型)的表现, 故选 A。

42. (A1 型题) 缺铁性贫血患儿为改善贫血症状最佳的食物是

- A. 牛奶和乳制品
- B. 鱼、虾及高热量饮食
- C. 动物肝脏及高蛋白饮食
- D. 海带、紫菜及高蛋白饮食
- E. 紫皮茄子及高蛋白饮食

42. 答案: C

解析: 缺铁性贫血系铁摄入量不足, 故应补铁, 动物肝脏等含铁丰富, 最佳。

43. (A1 型题) 引起小儿秋季腹泻常见的病原体是

- A. 空肠弯曲菌
- B. 大肠杆菌
- C. 埃可病毒
- D. 轮状病毒
- E. 柯萨奇病毒

43. 答案: D

解析: 人类轮状病毒是婴幼儿秋冬季腹泻最常见的病原; 其他如腺病毒、埃可病毒、柯萨奇病毒、冠状病毒、星状病毒等均可引起腹泻。主要表现为多次稀便及水和电解质紊乱。故本题选 D。

44. (A1 型题) 护理未成熟儿, 下列哪项措施不妥

- A. 母乳喂养
- B. 注意保暖, 防止烫伤
- C. 保持呼吸道通畅, 以防窒息
- D. 持续高浓度氧气吸入, 维持有效呼吸
- E. 严格执行消毒隔离制度, 防止交叉感染

44. 答案: D

解析: 若给早产儿高浓度吸氧, 可致视网膜病变而失明。A、B、C、E 均为正确的护理措施。

45. (A1 型题) 水痘患儿应避免使用的药物是

- A. 维生素 C
- B. 糖皮质激素

- C. 扑热息痛
- D. 阿昔洛韦
- E. 维生素 B12

45. 答案: B

解析: 糖皮质激素可致水痘病毒播散, 不宜使用, 故本题选 B。水痘抗病毒治疗首选无环鸟苷。阿昔洛韦只在水痘发病 24 小时内使用才有效。

46. (A1 型题) 维生素 D 缺乏性手足搐搦患儿使用钙剂时, 静脉推注时间应

- A. 小于 10 分钟
- B. 大于 10 分钟
- C. 小于 5 分钟
- D. 大于 5 分钟
- E. 大于 3 分钟

46. 答案: B

解析: 维生素 D 缺乏性手足搐搦患儿使用钙剂时, 可用 10% 葡萄糖酸钙 5~10ml 加入 10%~25% 葡萄糖液 10~20ml, 缓慢静脉注射 (10 分钟以上), 如注射过快, 致血钙骤升、发生呕吐, 甚至心跳骤停。故本题选 B。

47. (A1 型题) 婴幼儿上呼吸道感染易并发中耳炎的主要原因是

- A. 咽鼓管较宽、短、呈水平位
- B. 咽鼓管较宽、长、呈斜位
- C. 咽鼓管淋巴组织丰富
- D. 咽鼓管易充血水肿
- E. 咽鼓管缺少分泌型 IgA

47. 答案: A

解析: 小儿鼻泪管短, 咽鼓管较宽, 且直而短, 呈水平位, 鼻咽炎时易侵及中耳。

48. (A1 型题) 婴儿腹泻的病因, 下列哪项是错误的

- A. 肠道内感染
- B. 喂养不当
- C. 消化系统发育不成熟
- D. 血液中 IgG 偏低
- E. 肠道外感染

48. 答案: D

解析: 小儿腹泻的病因包括: 消化系统发育不完善, 胃酸较少、消化酶分泌较少、活性较低, 对食物变化的耐受性较差; 生长发育快, 所需营养物质相对较多, 消化道负担重, 容易发生功能紊乱; 机体防御功能较差, 胃酸低、血中免疫球蛋白和胃肠道 SIgA 均较低; 新生儿正常肠道菌群未建立; 人工喂养, 缺乏母乳中含有的体液因子、巨噬细胞等物质, 抗肠道感染能力差, 且食物与食具易污染。本题 IgG 偏低是发病机制, 不属于病因范畴。ABCE 均属腹泻病因。本题选 D。

49. (A1 型题) 小儿生长发育顺序的规律, 下列哪项正确

- A. 先下后上
- B. 由远到近
- C. 由细到粗
- D. 先慢后快
- E. 由简单到复杂

49. 答案: E

解析：小儿生长发育的规律为：由上到下，由近至远，由粗到细，由低级至高级，由简单至复杂的顺序。故选择 E。

50. (A1 型题) 先天性心脏病手术前最重要的确诊方法是

- A. 心三位 X 线照片
- B. 心电图检查
- C. 超声心动图检查
- D. 多普勒彩色血液像
- E. 心导管检查和心血管造影

50. 答案：E

解析：心导管检查和心血管造影为先天性心脏病手术前最重要的确诊方法，故本题选 E。