

1. 尿量少于 80ml 属于

- A. 少尿
- B. 尿潴留
- C. 排尿异常
- D. 尿闭
- E. 多尿

答案:D

解析:本题考查的是排泄护理。24 小时尿量 $<100\text{ml}$ 或 12 小时内无尿,称为无尿或尿闭。少尿是 24 小时 $<400\text{ml}$ 。多尿是 24 小时 $>2500\text{ml}$ 。

2. 贫血最常见的护理诊断

- A. 组织完整性受损
- B. 活动无耐力
- C. 组织灌注量改变
- D. 心输出量减少
- E. 有体液不足的危险

答案:B

解析:本题考查的是缺铁性贫血患者的护理。贫血患者最常见的护理诊断是活动无耐力,与贫血致组织器官缺氧有关。

3. 细菌性痢疾患者查体时, 腹部压痛部位最有可能是

- A. 右下腹
- B. 右上腹
- C. 左上腹
- D. 左下腹
- E. 脐周

答案:D

解析:本题考查的是细菌性痢疾患者的护理。细菌性痢疾病变部位最常出现在直肠和乙状结肠,所以腹部压痛部位最可能是左下腹。

4. 胰岛素注射部位是

- A. 肩胛区域
- B. 上臂外侧

- C. 大腿内侧
- D. 小腿内侧
- E. 上臂内侧

答案:B

解析:本题考查的是糖尿病患者的护理。胰岛素注射部位可选在股前部、腹壁、上臂外侧、臀部,每次注射必须更换部位,1个月内不要在同侧部位注射2次,以免皮下脂肪萎缩硬化。

5. 周三下午某护士在门诊接诊,发生一个流感患者,几小时上报

- A. 2 小时
- B. 12 小时
- C. 1 小时
- D. 24 小时
- E. 6 小时

答案:D

解析:本题考查的是与护士临床工作相关的法律法规。流感属于丙类传染病,责任报告人发现乙类、丙类传染病患者、病原携带者或疑似传染患者时,应在24小时内报告。

6. 患者男,46岁,支气管肺癌病理组织报告为鳞状细胞癌,按解剖学部分类常见的类型是

- A. 中央型
- B. 周围型
- C. 巨块型
- D. 混合型
- E. 边缘型

答案:A

解析:本题考查的是支气管肺癌患者的护理。支气管肺癌中以中央型肺癌最常见。

7. 患者男,46岁,该患者因脑出血处于昏迷状态,护士为其行口腔护理时,张口器放入的正确位置是

- A. 侧切牙
- B. 白齿
- C. 门齿
- D. 尖牙
- E. 正切牙

答案:B

解析:本题考查的是患者的清洁护理。昏迷患者张口器应该放在白齿处。

8. 以下微生物中, 较少引起直肠肛管周围囊肿的是

- A. 大肠杆菌
- B. 类杆菌
- C. 结核杆菌
- D. 葡萄球菌
- E. 梭状芽胞杆菌

答案:C

解析:本题考查的是直肠肛管周围脓肿患者的护理, 较少引起直肠肛管周围囊肿的是结核杆菌。

9. 治疗肺炎时, 首选的抗菌药物是

- A. 利复星
- B. 红霉素
- C. 青霉素
- D. 氟康唑
- E. 庆大霉素

答案:C

解析:本题考查的是肺炎患者的护理, 肺炎大多数是肺炎球菌感染疾病, 首选青霉素进行治疗。

10. 洋地黄类药物使用的禁忌证是

- A. 充血性心力衰竭
- B. 三度房室传导阻滞
- C. 心房颤动
- D. 室上性心动过速
- E. 心房扑动

答案:B

解析:本题考查的是心律失常患者的护理, 严重房室传导阻滞不可以用洋地黄类药物, 洋地黄会抑制传导, 加重病情导致心脏骤停。

11. 正常情况下, 产妇顺产后需继续留在产房观察的时间是.

- A. 1 小时
- B. 2 小时
- C. 3 小时
- D. 4 小时
- E. 5 小时

答案:B

解析:本题考查的是产褥期妇女的护理,产妇顺产后需继续留在产房观察 2 小时再送入休养室。

12. 根据乳腺癌淋巴转移的主要途径,护理评估应重点关注的部位是

- A. 腹股沟
- B. 颌下
- C. 颈后
- D. 颈前
- E. 腋窝

答案:E

解析:本题考查的是乳腺癌患者的护理,乳腺癌淋巴转移最常见的转移部位是同侧腋窝淋巴结,所以需要重点关注评估。

13. 表示肺癌已有全身转移的表现是

- A. 痰中带血
- B. 持续性胸痛
- C. 股骨局部破坏
- D. 间歇性高热
- E. 持续性胸水

答案:C

解析:本题考查的是支气管肺癌患者的护理,该患者已出现股骨局部破坏说明肺癌转移到全身。

14. 关于社区开展预防一氧化碳中毒的健康教育,正确的叙述是

- A. 关闭门窗
- B. 定期检查管道安全
- C. 使用不带有自动熄火装置的煤灶

- D. 通气开关可长期开
- E. 煤气淋浴器安装在浴室里

答案:B

解析:本题考查的是一氧化碳中毒患者的护理,社区的防护中可进行定期检查管道安全以及:为社区居民讲授相关防护知识。

15. 肝硬化失代偿期的患者最常见的并发症是

- A. 电解质紊乱
- B. 肝性脑病
- C. 原发性肝癌
- D. 肝肾综合征
- E. 上消化道出血

答案:E

解析:本题考查的是肝硬化患者的护理,肝硬化最常见的并发症是由于食管胃底静脉曲张破裂导致的上消化道出血,最严重的并发症是肝性脑病。

16. 为减少支气管扩张患者肺部继发性感染和全身中毒症状,最关键的措施是

- A. 加强痰液引流
- B. 选择广谱抗生素
- C. 使用呼吸兴奋剂
- D. 使用支气管扩张剂
- E. 注射流感疫苗

答案:A

解析:本题考查的是支气管扩张患者的护理。加强痰液引流,可保持气道通畅,减少继发感染和减轻全身中毒症状。

17. 慢性便秘患者最主要的临床表现是

- A. 缺乏便意、排便艰难
- B. 腹痛
- C. 里急后重感
- D. 恶心、呕吐
- E. 腹部下坠感

答案:A

解析:本题考查的是慢性便秘患者的护理。慢性便秘患者最主要的表现为缺乏便意、排便困难。

18. 心室颤动患者的脉搏特征是”

- A. 快而规则
- B. 慢而规则
- C. 快而不规则
- D. 慢而不规则
- E. 摸不到

答案:E

解析:本题考察的是心律失常患者的护理。心室颤动时心室内心肌纤维发生快而微弱的不协调的乱颤,查体:心音消失、脉搏触不到,血压测不到。

19. 老年患者随着年龄的增加,记忆能力逐步减退。在询问病史时最容易出现的是

- A. 表述不清
- B. 症状隐瞒
- C. 记忆不确切
- D. 反应迟钝
- E. 答非所问

答案:C

解析:本题考查的是老年保健。老年人记忆能力逐步减退,所以容易出现记忆不确切的问题。

20. 下列不属于肺炎球菌肺炎病理分期的是

- A. 充血期
- B. 溃疡期
- C. 红色肝变期
- D. 灰色肝变期
- E. 消散期

答案:B

解析:肺炎球菌肺炎的病理分期:①充血期;②红色肝样变期;③灰色肝样变期;④消散期。

21. 慢性肺源性心脏病患者肺、心功能失代偿期最突出的表现是

- A. 呼吸困难加重, 夜间更甚
- B. 疲倦乏力, 头晕心悸

- C. 贫血
- D. 多食、多饮
- E. 多尿

答案:A

解析:本题考查的是慢性肺源性心脏病患者的护理。肺心病患者在失代偿期会出现呼吸衰竭和心力衰竭,所以最突出的表现是呼吸困难加重,夜间更甚。

22. 胸部 X 线检查心影呈梨形提示

- A. 心包积液
- B. 三尖瓣关闭不全
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄
- E. 主动脉瓣狭窄

答案:D

解析:本题考查的是心脏瓣膜病患者的护理。梨形心提示是二尖瓣狭窄、靴型心是主动脉瓣关闭不全,烧瓶心是心包积液。

23. 慢性阻塞性肺疾病合并自发性气胸患者,经治疗后准备出院。为减少气胸复发,护士应告诉患者应特别注意的是

- A. 保持大便通畅
- B. 不能喝牛奶
- C. 不能快步行走
- D. 避免进食生冷食物
- E. 坚持低蛋白饮食

答案:A

解析:慢阻肺合并气胸出院患者,应特别注意保持大便通畅,防止用力排便而使气胸复发。

24. 为慢性心力衰竭患者进行输液治疗时,输液速度宜控制在

- A. 10—20 滴/分钟
- B. 20—30 滴/分钟
- C. 30—40 滴/分钟
- D. 40—50 滴/分钟
- E. 50—60 滴/分钟

答案:B

解析:本题考查的是心功能不全患者的护理。慢性心力衰竭患者输液时需要严格控制输液量和速度,保持在20~30滴/分钟。

25. 急性细菌性咽一扁扁桃体炎有别于其他上呼吸道感染的突出表现是

- A. 起病急
- B. 发热
- C. 咽痛明显
- D. 鼻黏膜充血肿胀.
- E. 颌下淋巴结肿大

答案:C

解析:本题考查的是急性感染性喉炎患者的护理。急性细菌性咽一扁扁桃体炎有别于其他上呼吸道感染的突出表现是咽痛明显,病变主要在咽喉处。

26. 患者,男性,45岁,因间断胸闷1周,1天前于夜间突然被迫坐起,频繁咳嗽,严重气急,咳大量粉红色泡沫痰,既往患冠心病10年,对该患者正确的护理是

- A. 多食蔬菜蔬果
- B. 端坐位,背部靠物支撑,双腿下垂
- C. 给温开水饮用
- D. 将硝酸甘油快速静脉推注
- E. 与麻醉科联系给予气管插管

答案:B

解析:患者有心脏病史,咳粉红色泡沫样痰,为左心衰竭。患者应取端坐位,背部靠物支撑,双腿下垂,以减少回心血量。

27. 患者女,26岁,半年前开始出现反复发作的腹泻、腹痛、排黏液脓便,疑诊溃疡性结肠炎,拟行肠镜检查,门诊护士告知患者在行肠镜检查前的注意事项,正确的是

- A. 前4小时可进食
- B. 前1天晚餐后禁食
- C. 前2天停药铁剂
- D. 前2天清洁灌肠
- E. 前3天停药阿司匹林类药物

答案:B

解析:本题考查的是溃疡性结肠炎患者的护理。前3天停止服用铁剂,前5~7天停用阿司匹林,前一晚做清洁灌肠并开始禁食。

28. 使用呼吸机的患者常常用手势和表情与护士传递交流信息,此时的非语言行为对语言具有

- A. 补充作用
- B. 替代作用
- C. 驳斥作用
- D. 调整作用
- E. 修饰作用

答案:B

解析:本题考查的是护理工作中的非语言沟通。使用呼吸机的患者无法经语言表达,用手势和表情与护士传递交流信息,是一种替代作用。

29. 猩红热患儿特有的体征是

- A. 口周苍白圈
- B. 躯干糠皮样脱屑
- C. 皮疹多在发热2天后出现
- D. 疹间无正常皮肤
- E. 多为持续性高热

答案:A

解析:本题考查的是猩红热患者的护理。猩红热患儿特有的体征是帕氏线、杨梅舌和口周苍白圈。

30. 治疗糖尿病药物拜糖平正确的服药时间是

- A. 空腹服用
- B. 餐时服用
- C. 睡前服用
- D. 饭前1小时服用
- E. 饭后1小时服用

答案:B

解析:本题考查的是糖尿病患者的护理。糖尿病患者服用拜糖平(阿卡波糖)可以降低餐后血糖,所以需要餐时服用。

31. 为患者叩背的基本顺序是

- A. 自上而下，由外向内
- B. 自下而上，由外向内
- C. 自上而下，由内向外
- D. 自下而上，由内向外
- E. 视患者病变部位而定

答案:B

解析:本题考查的是呼吸系统的基本护理。为患者扣背的顺序是自下而上，由外向内。

32. 昏迷患者进行漱口时不需要具备什么东西

- A. 漱口盘
- B. 手电筒
- C. 棉球
- D. 开口器
- E. 吸水管

答案:E

解析:本题考查的是患者的清洁护理。昏迷患者无法吸水，不需准备吸水管。

33. 急性阑尾炎发生坏死，穿孔的主要原因是

- A. 阑尾开口小
- B. 阑尾淋巴丰富
- C. 阑尾蠕动慢而弱
- D. 阑尾动脉为终末动脉
- E. 阑尾系膜短

答案:D

解析:本题考查的是急性阑尾炎患者的护理。急性阑尾炎发生坏死、穿孔的主要原因是阑尾动脉为终末动脉，血流不畅。

34. 护校学生小何 2017 年 7 月通过了护士注册资格考试，她的护士执业注册申请必须在

- A. 1 年内提出
- B. 2 年内提出
- C. 3 年内提出
- D. 4 年内提出

E. 5 年内提出

答案:C

解析:本题考查的是与护士执业注册相关的法律法规。护士首次注册应当自通过执业资格考试之日起 3 年内提出执业注册申请。

35. 某急性心肌梗死患者 2 小时后心电图随访显示 II、DI、avF 导联出现病理性 Q 波, 提示心肌梗死的部位可能是

- A. 后壁
- B. 前壁
- C. 下壁
- D. 右侧壁
- E. 左侧壁

答案:C

解析:本题考查的是冠状动脉粥样硬化性心脏病患者的护理。V1~V5 导联提示广泛前壁心肌梗死, V1、V2、V3 导联提示前间壁心肌梗死, V~V5 导联提示局限前壁心肌梗死, II、DI、avF 导联提示下壁心肌梗死, I、avF 导联提示高侧壁心肌梗死, V₇、V₈ 导联提示正后壁心肌梗死。

36. 与双胞胎无关的因素是

- A. 种族
- B. 遗传
- C. 饮食
- D. 年龄
- E. 胎次

答案:C

解析:本题考查的是多胎妊娠及巨大胎儿患者的护理。与多胎妊娠毫无关系的是饮食。

37. 杵状指出现在

- A. 法洛四联症
- B. 室间隔缺损
- C. 房间隔缺损
- D. 动脉导管未闭
- E. 肺动脉狭窄

答案:A

解析:本题考查的是先天性心脏病患者的护理。法洛四联症的患儿会有明显缺氧,出现青紫、杵状指、蹲踞现象和缺氧发作。

38. 大脑一侧肿瘤,患者剧烈咳嗽,引发小脑脑疝,瞳孔改变为

- A. 患侧瞳孔散大
- B. 患侧瞳孔缩小
- C. 双侧瞳孔散大
- D. 双侧瞳孔缩小
- E. 双侧瞳孔不等大

答案:B

解析:脑疝初期,由于患侧动眼神经受刺激导致患侧瞳孔缩小,对光反射迟钝。

39. 孕妇女,25岁,妊娠23周,妊娠早期早孕反应较重,现子宫明显大于孕周,体重剧增,胎动部位不固定且频繁,B超显示两个胎头光环,对评估该孕妇最有价值的资料是

- A. 早孕反应情况
- B. B超结果
- C. 子宫大小
- D. 体重
- E. 胎动

答案:B

解析:本题考查的是妊娠期妇女的护理。B超是最准确诊断孕妇情况的检查。

40. 提示左心衰竭的临床表现是

- A. 奇脉
- B. 平脉
- C. 水冲脉
- D. 脉搏短细
- E. 交替脉

答案:E

解析:本题考查的是心功能不全患者的护理。左心衰竭患者会有第一心音减弱、心前区舒张期奔马律,部分患者可出现交替脉。

41. 患者，男，22岁。消化性溃疡患者，给予胶体次枸橼酸铋+克拉霉素+呋喃西林三联治疗期间出现黑便，担心病情加重，行粪便隐血试验，报告呈阴性。此时应向患者解释其黑便的原因是

- A. 溃疡出血
- B. 溃疡癌变
- C. 呋喃西林不良反应
- D. 克拉霉素不良反应
- E. 胶体次枸橼酸铋不良反应

答案:E

解析:本题考查的是消化性溃疡患者的护理。胶体次枸橼酸铋服用过后粪便可呈无光泽的黑褐色,但无其他不适,属正常反应,停药后可恢复正常。

42. 急性呼吸窘迫综合征早期的病理变化不包括

- A. 肺间质水肿
- B. 肺泡萎陷
- C. 肺泡内透明膜形成
- D. 肺充血肺充血
- E. 肺泡纤维化

答案:E

解析:本题考查的是急性呼吸窘迫综合征患者的护理。急性呼吸窘迫综合征早期的病理改变为肺广泛充血、水肿和肺泡内透明膜形成,伴灶性或大面积肺泡萎陷。

43. 患儿,3个月,因哭闹时脐部突起就医,诊断为脐疝,患儿家长很是担心,护士对家长进行健康教育,不妥的是

- A. 解释脐疝的发病原因及临床特点,
- B. 嘱其保持患儿大便通畅,防止便秘
- C. 疝块还纳后局部可用大于脐环并外包纱布的硬币压迫
- D. 建议尽早手术治疗
- E. 定期来院复查

答案:D

解析:本题考查的是腹外疝患者的护理。小儿脐疝一般不需要手术治疗。

44. 一名16岁女生,个子矮,胸部未发育,应该多食用哪类食物

- A. 富含维生素 E
- B. 富含锌
- C. 富含硒
- D. 富含钙
- E. 富含铁

答案:D

解析:本题考查的是青春期保健。个子矮的女生适合多吃富含钙的食物。

45. 患者因食用不洁食物而导致甲型肝炎, 应该进行的隔离是.

- A. 空气隔离
- B. 消化道隔离
- C. 血液隔离
- D. 接触隔离
- E. 严密隔离

答案:B

解析:甲肝是粪口传播, 要进行消化道隔离。

46. 日光浴一般于婴儿早餐后

- A. 0.5 小时为宜
- B. 1-1.5 小时为宜
- C. 2—2.5 小时为宜
- D. 2.5~3 小时为宜
- E. 3~3.5 小时为宜

答案:B

解析:日光浴一般于婴儿早餐后 1~1.5 小时为宜。

47. 林女士, 足月自然产后 4 天, 出现下腹痛, 体温正常, 恶露多。有臭味, 子宫底脐上 1 指, 子宫体软, 应考虑为

- A. 子宫肌炎
- B. 盆腔结缔组织炎
- C. 子宫内膜炎
- D. 急性输卵管炎
- E. 腹膜炎

答案:C

解析:本题考查的是子宫内膜炎患者的护理。子宫内膜炎一般可发生在产褥感染,出现子宫增大变软、恶露多、疼痛等症状。

48. 患者,男,45岁。因胃癌行胃大部分切除术后13天,痊愈出院。正确的出院指导是

- A. 进流质饮食
- B. 绝对卧床休息
- C. 经常消毒伤口
- D. 定期回院复查
- E. 定期针灸理疗

答案:D

解析:胃癌行胃大部分切除术后13天,痊愈出院后要及时的定期回院复查。

49. 患者,男,45岁。因高热、牙龈出血及多处皮肤瘀点5天入院。医嘱开具下列检验单,护士采血时应优先取的标本是

- A. 血常规
- B. 血生化组合
- C. 凝血四项
- D. ABO血型
- E. 血培养

答案:E

解析:应先取血培养标本,用于查找血液中的病原菌。

50. 主动脉瓣关闭不全时会出现周围血管征,主要原因是

- A. 心率加快
- B. 回心血量增加
- C. 收缩压升高
- D. 收缩压升高,舒张压降低
- E. 以上都不是

答案:D

解析:主动脉瓣关闭不全,主动脉反流,使收缩压升高,舒张压降低,脉压增大,出现周围血管征。