

题型：A1 型题

题目：

护理程序的最后一个步骤是

选项：

- A. 评估
- B. 计划
- C. 诊断
- D. 评价
- E. 实施

答案：D

解析：护理程序包括评估、诊断、计划、实施和评价，其中评价是最后一个步骤。

题型：A1 型题

题目：

II 度羊水污染表现为

选项：

- A. 羊水呈浅绿色
- B. 羊水呈黄色
- C. 羊水呈黄绿色
- D. 羊水呈浑浊棕黄色
- E. 羊水呈浑浊黄绿色

答案：E

解析：羊水胎粪污染可分为 3 度：I 度为浅绿色，II 度为黄绿色并混浊，III 度为棕黄色，稠厚。

题型：A1 型题

题目：

发生重大医疗过失行为的，医疗机构应当在多长时间内向所在地卫生行政部门报告

选项：

- A. 4 小时
- B. 8 小时
- C. 12 小时
- D. 16 小时
- E. 20 小时

答案：C

解析：发生重大医疗过失行为的，医疗机构应当在 12 小时内向所在地卫生行政部门报告。记忆性题目，考察医疗事故的预防和处置，需掌握。

题型：A1 型题

题目：

预防小儿麻疹最有效的措施是

选项：

- A. 注射干扰素
- B. 输注丙种球蛋白

- C. 输注血浆
- D. 输注全血
- E. 接种疫苗

答案：E

解析：对8个月以上未患过麻疹的小儿应接种麻疹疫苗。7岁时进行复种。易感儿接触麻疹后5日内注射免疫球蛋白，可免于发病。

题型：A1型题

题目：

护士处理医嘱时，应首先执行的医嘱是

选项：

- A. 长期医嘱
- B. 临时医嘱
- C. 临时备用医嘱
- D. 长期备用医嘱
- E. 停止医嘱

答案：B

解析：医嘱的处理原则：先急后缓，先临时后长期，先执行后抄写。即先执行临时医嘱，再执行长期医嘱，最后转抄到医嘱单上，执行者签全名。

题型：A1型题

题目：

护士发现医嘱可能违反法律、法规、规章或者诊疗技术规范规定时，以下哪项处理是错误的选项：

- A. 暂时延缓医嘱执行，待问题澄清明确后再执行
- B. 及时向开具医嘱的医师提出
- C. 当开具医师不在时护士可代为纠正医嘱
- D. 必要时，应当向该医师所在科室的负责人报告
- E. 必要时，可向该医疗卫生机构负责医疗服务管理的人员报告

答案：C

解析：根据《护士条例》第十七条规定：一般情况下，护士应当一丝不苟的执行医嘱，随意改或无故不执行医嘱均属违规行为。对有疑问的医嘱，应确认无误方可给药，不可盲目执行。护士发现医嘱可能违反法律、法规、规章或者诊疗技术规范规定时，护士有权利拒绝执行，并向医师提出质疑。必要时应当向该医师所在科室的负责人或医疗卫生机构负责医疗服务管理的人员报告，这是出于保护病人的需要。

题型：A1型题

题目：

下列哪项不于围生期保健内容

选项：

- A. 孕前期保健
- B. 孕期保健
- C. 分娩期保健
- D. 产褥期保健

E. 月经期保健

答案：E

解析：胎龄满 28 周至出生后 7 天，称围生期（又称围产期）。围生期保健包括孕前、孕期、分娩、产褥保健。

题型：A1 型题

题目：

中医理论中，“具有防御作用而运行于脉外之气”被称为

选项：

- A. 元气
- B. 营气
- C. 肺气
- D. 卫气
- E. 真气

答案：D

解析：卫气是行于脉外而具有保卫作用的气。因其有卫护人体，避免外邪入侵的作用，故称之为卫气

题型：A1 型题

题目：

当中心静脉压小于 $2\sim 5\text{cmH}_2\text{O}$ 时常提示的是

选项：

- A. 右心功能不良
- B. 左心功能不良
- C. 右心房充盈不佳或血容量不足
- D. 左心房充盈不佳或血容不足
- E. 血容量过多

答案：C

解析：中心静脉压（CVP）代表了右心房或者胸腔段腔静脉内压力的变化，可反映全身血容量与右心功能之间的关系。CVP 的正常值为 $5\sim 10\text{cmH}_2\text{O}$ ，当 $\text{CVP}<5\text{cmH}_2\text{O}$ 时，表示血容量

不足或右心房充盈不佳，当 $\text{CVP}>15\text{cmH}_2\text{O}$ 时，则表示心功能不全静脉血管床过度收缩或肺

循环阻力增高；若 $\text{CVP}>20\text{cmH}_2\text{O}$ 时，则表示存在充血性心力衰竭。

题型：A1 型题

题目：

患者，男，34 岁、无痛性血尿 2 周，疑为膀胱癌，做膀胱镜检查。应协助其采用的体位为

选项：

- A. 仰卧位
- B. 侧卧位
- C. 半坐卧位
- D. 截石位

E. 胸卧位

答案：D

解析：膀胱镜检查时应采取截石位。

题型：A1 型题

题目：

以下现病史符合新生儿病理性黄疸的是

选项：

- A. 血总胆红素逐渐加重，每日上升 2mg/d
- B. 生后 24 小时内出现黄疸
- C. 黄疸持续时间足月儿>1 周
- D. 母亲血型 A 型，患儿血型 B 型
- E. 母亲血 A 型，患儿血型 O 型

答案：B

解析：新生儿生后 24 小时内出现黄疸为病理性黄疸的表现。

题型：A1 型题

题目：

肝性脑病患者伴有肾脏损害，口服抗生素应选

选项：

- A. 新霉素
- B. 卡那霉素
- C. 氨苄西林
- D. 庆大霉素
- E. 甲硝唑

答案：E

解析：肝性脑病患者使用抑制肠道产尿素酶的细菌的口服抗生素，减少氨的生产，常用的有新霉素、甲硝唑和利福昔明等。新霉素属于氨基糖苷类，对肾功能有损害，该患者有肾脏损害，应禁用，故选用甲硝唑。

题型：A1 型题

题目：

属于疫苗接种异常反应的是

选项：

- A. 心因性反应
- B. 偶合发病
- C. 原有疾病加重
- D. 一般反应
- E. 变态反应

答案：E

解析：异常反应包括：过敏性休克、晕针、过敏性皮疹、全身感染等，其中过敏反应属于变态反应。

题型：A1 型题

题目：

患儿女，6岁，患有先天性心脏病，需采用地高辛进行治疗护士在给药前应特别监护

选项：

- A. 心率
- B. 呼吸
- C. 血压
- D. 体温
- E. 瞳孔

答案：A

解析：洋地黄类是临床最常用的强心药物，具有正性肌力和减慢心率作用。此类药物治疗安全范围小，有效血药浓度接近中毒浓度，不良反应发生率较高。地高辛为洋地黄的口服制剂，故使用时应特别监护心率。该患儿6岁，当心率下降到60~70次/分时应暂停用药并通知医生。

题型：A1型题

题目：

中医中舌对应的器官是

选项：

- A. 心
- B. 肝
- C. 肺
- D. 肾
- E. 脾

答案：A

解析：眼对应肝、耳对应肾、口对应脾、鼻对应肺、舌对应心。

题型：A1型题

题目：

患者，女，60岁，因心慌、心前区不适前来就诊。护士在巡视候诊患者时发现该患者面色苍白、呼吸困难，前去询问无应答，脉搏52次/分，呼吸24次/分，对该患者应

选项：

- A. 协助医生检查
- B. 做疫情报告
- C. 到隔离门诊就诊
- D. 按挂号顺序就诊
- E. 立即送抢救室抢救

答案：E

解析：患者面色苍白、神志不清、脉率慢、病情危重应立即送抢救室抢救。

题型：A1型题

题目：

患者，女，69岁癌症晚期，晨起空腹采血检查，护士第一次静脉穿刺失败，患者问：是看我要死了就我练手了是吗？此时护士恰当的做法是

选项：

- A. 向患者道歉并争取谅解
- B. 暂时离开患者请其他护士前来处理
- C. 向患者解释穿刺失败是患者自身原因造成的
- D. 请患者给第二次机会，并保证这次穿刺一定成功
- E. 不做解释，先执行其他患者的治疗

答案：A

解析：暂无解析。

题型：A1 型题

题目：

对于献血者的叙述错误的是

选项：

- A. 献血者年龄 18~55 岁
- B. 献血一次不超过 400ml
- C. 献血两次间隔要大于 3 个月
- D. 献血者要身体健康，符合献血的条件
- E. 血站对献血者必须免费进行必要的健康检查

答案：C

解析：我国实行无偿献血制度，提倡 18 周岁至 55 周岁的健康公民自愿献血；两次献血间隔大于 6 个月；每次献血 200~400ml

题型：A1 型题

题目：

某血站违反有关操作规程和制度采集血液，由下列哪个部门令其改正

选项：

- A. 县级以上的地方人民政府卫生计生行政部门
- B. 县级以上的行业协会
- C. 县级以上的卫生防御机构
- D. 县级以上的医疗保健机构
- E. 县级以上的地税机构

答案：A

解析：《中华人民共和国献血法》规定，医疗机构的医务人员违反本法规定，将不符合国家规定标准的血液用于患者的，由县级以上地方人民政府卫生行政部门责令改正。

题型：A1 型题

题目：

患者，男，18 岁，支气管哮喘 2 年，同时使用几种气剂治疗。正确的使用顺序是

选项：

- A. 先用支气管扩张剂，再用激素类气雾剂
- B. 先用激素类气雾剂，再用支气管扩张剂
- C. 先用素类气雾剂，再用茶碱类气雾剂
- D. 先用支气管扩张剂，再用茶碱类气雾剂
- E. 先用茶碱类气雾剂，再用支气管扩张剂

答案：A

解析：哮喘病人使用吸入装置进行吸入治疗，一般先吸入支气管扩张剂，后吸入抗炎气雾剂。

题型：A1 型题

题目：

解除非尿路梗阻所致的尿潴留不适合首先采取

选项：

- A. 下腹部热敷
- B. 按摩下腹部
- C. 听流水声
- D. 温水洗外阴
- E. 导尿术

答案：E

解析：如属非机械性梗阻原因引起的尿潴留，可采用以下护理措施，以解除病人的痛苦：心理护理；调整体位和姿势；诱导排尿，如听流水声，或用温水冲洗会阴；按摩，热敷；药物或针灸；经上述措施处理无效时，可根据医嘱采用导尿术。

题型：A1 型题

题目：

急性上呼吸道感染最常见的病原体是

选项：

- A. 细菌
- B. 葡萄球菌
- C. 真菌
- D. 支原体
- E. 病毒

答案：E

解析：急性上呼吸道感染约有 70%~80% 由病毒引起。包括鼻病毒、冠状病毒、腺病毒、流感和副流感病毒、呼吸道合胞病毒、埃可病毒、柯萨奇病毒等。

题型：A1 型题

题目：

为乙肝患者更换伤口料时，患者血液溅入护士眼睛，这种损伤属于

选项：

- A. 物理性损伤
- B. 机械性损伤
- C. 心理性损伤
- D. 生物性损伤
- E. 化学性损伤

答案：D

解析：生物性因素主要是指细菌、病毒，支原体等微生物对机体的伤害，常见的致病菌为葡萄球、链球菌炎球和大肠杆菌等，常见的病毒为肝炎病毒，艾滋病病毒、冠状病毒等，其中最危险的最常见的是艾病病毒、乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒。

题型：A1 型题

题目:

出院患者床单位处理错误的是

选项:

- A. 污被服撤下送洗
- B. 被褥曝晒 6 小时
- C. 病床、床旁桌椅用洗涤剂擦洗
- D. 脸盆、痰杯用消毒液浸泡
- E. 铺备用床

答案: C

解析: 直接接触的物品应该用消毒液处理, 如病床、床旁桌椅用消毒液擦拭; 脸盆、痰杯用消毒液泡; 污被服撤下送洗衣房清洗消毒。床垫、棉胎等患者未直接接的物品可放于光下或用紫外线灯照射消毒, 将床单位消毒后应铺备用床为迎接新患者做好准备。

题型: A1 型题

题目:

肌肉注射选用连线法划分部位时, 其注射区域应选择髂前上棘与尾骨两点连线的

选项:

- A. 外上 1/3 处
- B. 外上 1/2 处
- C. 中 1/3 处
- D. 后 1/3 处
- E. 后 1/2 处

答案: A

解析: 肌肉注射注射区域应选择髂前上棘与尾骨两点连线的 外上 1/3 处。

题型: A1 型题

题目:

评估睡眠障碍最重要的检查方法是

选项:

- A. 头颅 CT
- B. 脑电图
- C. 头颅 DSA
- D. 头颅 MRI
- E. 头颅 X 线

答案: B

解析: 评估睡眠障碍的最重要方法是应用脑电图多导联描记装置进行全夜睡眠过程的监测。

题型: A1 型题

题目:

某女士正在口服避孕药进行避孕, 服药期间出现哪种情况应该到医院检查

选项:

- A. 体重增加
- B. 闭经
- C. 色素沉着

- D. 头晕乏力
- E. 经量减少

答案：B

解析：本题五个选项均为口服避孕药的不良反应，一般不良反应不需特殊处理，闭经发生率较低，常发生于月经不规则妇女，出现闭经情况应及时到医院检查。

题型：A1 型题

题目：

有关输血注意事项的叙述，错误的是
选项：

- A. 输血时须两人核对无误后方可
- B. 输入的血液内可根据需要加入药物
- C. 如用库存血，必须认真检查血液质量
- D. 如发生严重输血反应时，应立即停止输血
- E. 根据医嘱采集血标本，要求每次只为一位患者采集

答案：B

解析：血制品中不能随意加入其他药物，如钙剂、高渗或低渗溶液、酸性或碱性药物，以防血制品变质，出现血液凝集或溶解。

题型：A1 型题

题目：

关于原发性胃癌的叙述，错误的是
选项：

- A. 手术是治疗癌的首选方法
- B. 早期无明显症状及体征
- C. 血液转移为晚期胃癌最主要的转移途径
- D. 早期均出现恶心呕吐宿食及进食梗阻感
- E. 好发于胃部

答案：D

解析：胃癌早期无明显症状：半数病人较早出现上腹隐痛，一般服药后可暂时缓解。当幽门梗阻时有恶心、呕吐宿食，贲门部癌可有进食梗阻感。

题型：A1 型题

题目：

患者，女，34 岁。临床诊断破伤风，神志清楚，全身肌肉阵发性痉挛、抽搐，所住病室环境下列哪项不符病情要求

选项：

- A. 室温 18~20℃
- B. 相对湿度 50%~60%
- C. 门椅脚钉橡皮垫
- D. 保持病室光线充足
- E. 开门关门动作轻

答案：D

解析：伤风病人应安置于离病室保持安静，减少一切刺激，遮光防止噪声，温度 18~20℃，湿度约 50%~60%。治疗、护理等各项操作尽量集中，可在使用镇静剂 30 分钟内进行，以免刺激打扰病人而引起抽搐。

题型：A1 型题

题目：

患儿男，5 岁。因“高热、头疼伴烦不安 3 天，时有抽搐发生”入院查体：体温 41℃，呼吸 32 次/分，神志清、颈项强直。实验室检查血白细胞 15×10^9 ，中性粒细胞 0.82，脑脊液：有核细胞数 $100 \times 10^5/L$ ，蛋白 400mg/L，糖和氯化物正常，临床诊断为流行性乙型脑炎。目前首要的护理措施是

选项：

- A. 使用脱水剂预防抽搐
- B. 给氧以改善呼吸困难
- C. 应用抗病毒药物
- D. 静脉补液维持水和电解质平衡
- E. 采用物理降温和退热药降低体温

答案：E

解析：患儿体温 41℃，是急需解决的护理问题。

题型：A1 型题

题目：

人体消化吸收的主要部位在

选项：

- A. 食管
- B. 小肠
- C. 胃
- D. 直肠
- E. 大肠

答案：B

解析：小肠是食物消化和吸收的主要部位。

题型：A1 型题

题目：

下列有关生物学死亡期的说法不正确的是

选项：

- A. 生物学死亡期是死亡的最后阶段
- B. 中枢神经系统出现不可逆变化
- C. 若及时抢救，机体仍有可能复活
- D. 会出现尸冷、尸斑和尸僵
- E. 晚期可出现尸体腐败

答案：C

解析：生物学死亡期是死亡过程的最后阶段。此期整个中枢神经系统和机体各器官的新陈代谢相继终止，出现不可逆变化。此期整个机体已不可能复活。而且，随着此期的进展，会相继出现一些尸体现象，如尸冷、尸斑、尸僵、尸体腐败等。

题型：A1 型题

题目：

患者，男，50 岁，经检查发现口腔有感染溃烂、出血应选用

选项：

- A. 生理盐水
- B. 0.02% 呋喃西林溶液
- C. 1%~3% 过氧化氢溶液
- D. 复方硼酸溶液
- E. 1% 醋酸溶液

答案：C

解析：1%~3% 过氧化氢溶液具有防腐、防臭的作用，适用于口腔感染有溃烂，坏死组织者。

题型：A1 型题

题目：

患者，女，28 岁车祸后急诊入院，初步诊断为骨盆骨折合并腹膜后出血。静脉通路宜建立在

选项：

- A. 上肢或下肢
- B. 下肢或颈部
- C. 上肢或颈部
- D. 左下肢
- E. 右下肢

答案：C

解析：骨盆骨折合并腹膜后出血，静脉通路应建立在骨折部位和出血部位以上。

题型：A1 型题

题目：

颅前窝骨折皮下瘀斑的典型体征是

选项：

- A. 三主征
- B. “熊猫眼征”
- C. 三凹征
- D. Murphy 征
- E. 五联征

答案：B

解析：颅前窝骨折皮下瘀斑的典型体征是“熊猫眼征”“兔眼征”。

题型：A1 型题

题目：

患者，男，流浪人员，因车祸致右下肢开放性骨折被路人送入院，医生和护士及时为其止血，建立静脉通路并做好急救准备，护士保护了患者

选项：

- A. 人格受到尊重的权利

- B. 参与治疗的权利
- C. 选择诊疗方式的权利
- D. 知情同意权
- E. 享有平等医疗服务的权利

答案：E

解析：病人有平等享受医疗的权利，医护人员应平等地对待每一个病人，不论其社会地位，教育程度、经济状况有多大差异。自觉维护病人的权利。

题型：A1 型题

题目：

属于化学消毒法的是

选项：

- A. 燃烧法
- B. 湿热消毒法
- C. 环氧乙烷灭菌法
- D. 微波消毒灭菌法
- E. 压力蒸汽灭菌法

答案：C

解析：环氧乙烷灭菌法为化学灭菌法；燃烧法、湿热消毒法、微波消毒灭菌法和压力蒸汽灭菌法为物理灭菌法。

题型：A1 型题

题目：

带教老师在临床带教过程中为了给实习护创造机会，有合适的静脉穿刺对象时就对患者说：“她虽然是个学生，但穿刺技术非常熟练，很多者都是她穿刺的，而且每次都能成功，您能给她一次穿刺的机会吗？”在此护患沟通的过程中带教老师使用的是

选项：

- A. 劝说性语言
- B. 安慰性语
- C. 指令性语
- D. 鼓励性语言
- E. 积极的暗示语言

答案：E

解析：暂无解析。

题型：A1 型题

题目：

慢性胃炎患者应避免服用

选项：

- A. 青霉素
- B. 庆大霉素
- C. 阿司匹林
- D. 多潘立酮
- E. 胃得乐

答案：C

解析：口服阿司匹林可直接刺激胃黏膜引起上腹不适及恶心呕吐。长期使用易致胃黏膜损伤，引起胃溃疡及胃出血。

题型：A1 型题

题目：

患者，女，32岁，医嘱行¹³¹I甲状腺功能测定，护士指导患者在试验期间忌食的食物是选项：

- A. 芹菜
- B. 紫菜
- C. 花菜
- D. 黄瓜
- E. 西红柿

答案：B

解析：¹³¹I检查或治疗前7~60天，禁食含碘高的食物，海产品中碘含量高。

题型：A1 型题

题目：

下列缓解晨僵的措施中正确的是

选项：

- A. 起床后用先用冷水浸泡僵硬关节然后按摩
- B. 尽量不要活动僵硬关节
- C. 夜间睡眠带弹力手套保暖
- D. 关节内注射透明质酸
- E. 禁用止疼药

答案：C

解析：夜间睡眠戴弹力手套保暖，可减轻晨僵程度。

题型：A1 型题

题目：

患者，男，45岁颈椎骨折现需要搬运至平车上，平车与床的适当位置是

选项：

- A. 平车头端与床尾相接
- B. 平车头端与床头平齐
- C. 平车头端与床头呈锐角
- D. 平车头端与床尾呈锐角
- E. 平车头端与床头呈钝角

答案：B

解析：颈椎骨折患者须采用四人搬运法，所以平车应与病床平齐

题型：A1 型题

题目：

药效发挥最快的途径是

选项：

- A. 皮内注射
- B. 皮下注射
- C. 肌肉注射
- D. 静脉注射
- E. 舌下含服

答案：D

解析：药物通过不同途径吸收入血，并且达到有效血药浓度时，才能发挥作用。动、静脉注射药液直接进入血液循环，是所有给药方式中最快产生药效的，其他给药途径均有一个吸收过程。给药途径不同，药物吸收顺序依次为：静脉>吸入>舌下含服>直肠给药>肌肉注射>皮下注射>口服>皮肤。

题型：A1 型题

题目：

乙型脑炎患者常见的护理问题不包括

选项：

- A. 皮肤完整性受损
- B. 气体交换受损
- C. 意识障碍
- D. 体温过高
- E. 有受伤的危险

答案：A

解析：高热，惊厥，呼吸衰竭及意识障碍是乙型脑炎的主要症状，在上述选项中皮肤完整性受损不属于其主要护理问题。

题型：A1 型题

题目：

根据人体器官移植相关规定下列不属于活体器官的接受人的是

选项：

- A. 配偶
- B. 儿子
- C. 姑姑
- D. 姐姐
- E. 朋友

答案：E

解析：活体器官的接受人限于活体器官捐献人的配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲，或者有证据证明与活体器官捐献人存在因帮扶等形成亲情关系的人员。

题型：A1 型题

题目：

为防猝死，急性肾衰竭少尿期的患应密切监测的指标是

选项：

- A. 尿量
- B. 血压
- C. 血肌酐

D. 血钙

E. 血钾

答案：E

解析：钾离子随尿液排出，少尿期易出现高钾血症，是急性肾衰竭最严重的并发症，是起病第一周死亡最常见的原因，因高钾血症可诱发各种心律失常，重者心室颤动、心搏骤停，故需要密切监测。

题型：A1 型题

题目：

下列做法中不利于新生儿身心发展的是

选项：

A. 母乳喂养

B. 听音乐

C. 在母情况的允许下鼓励母亲与新生儿尽早进行皮肤接触

D. 母婴同室

E. 将新生儿包裹为蜡烛包，以维持体温稳定

答案：E

解析：暂无解析。

题型：A1 型题

题目：

三岁小儿向妈妈执意表达自己的需求，其心理发展特性是

选项：

A. 明显自主性

B. 有集体意识

C. 客观看问题

D. 克服自卑感

E. 有抽象思维

答案：A

解析：执意表达自己的需求，“自己”对应着“自主”。

题型：A1 型题

题目：

关于二甲双胍治疗糖尿病的叙述，错误的是

选项：

A. 每天最大剂量不应超过 2g

B. 可改善胰岛素敏感性，减轻胰岛素抵抗

C. 服用时应与第一口饭同时咀嚼

D. 可导致腹部不适、恶心腹泻等不良反应

E. 治疗肥胖或超重的 2 型糖尿病的首选药

答案：C

解析：双胍类药物进餐时或进餐后服，无需嚼碎服用；阿卡波糖应与第一口饭同时嚼服。

题型：A1 型题

题目：

卵巢动、静脉通过的韧带是

选项：

- A. 卵巢固有韧带
- B. 子宫圆韧带
- C. 宫骶韧带
- D. 卵巢悬韧带
- E. 主韧带

答案：D

解析：卵巢动、静脉和输尿管均从卵巢悬韧带（又称骨盆漏斗韧带）内通过。

题型：A1 型题

题目：

引起再生障碍性贫血最常见的药物是

选项：

- A. 氯霉素
- B. 保泰松
- C. 苯妥英钠
- D. 黄胺药
- E. 阿司匹林

答案：A

解析：引起再生障碍性贫血最常见的药物是氯霉素，其毒性可引起骨髓造血细胞受抑制及损害骨髓微环境。

题型：A1 型题

题目：

牛羊乳喂养的婴儿粪便颜色呈

选项：

- A. 绿色
- B. 淡黄色
- C. 白陶土色
- D. 黄绿色
- E. 深黄色

答案：B

解析：牛羊乳喂养的婴儿粪便颜色呈淡黄色。

题型：A1 型题

题目：

某心脏病患者坚持自测脉搏并随时记录，但最近其在做出心电图后发现自己的心率与脉率不一致，心率 90 次/分，脉率为 75 次/分，患者出现该现象最可能的原因是

选项：

- A. 颅内压过高
- B. 发生了三度房室传导阻滞
- C. 自测脉搏方法有误

- D. 发生了心房颤动
- E. 出现了洋地黄中毒

答案：D

解析：在同一时间内测定的脉率小于心率，为脉搏短绌，见于心房颤动的患者。

题型：A1 型题

题目：

由责任护士和其助护士负一定数量患者从入院到出院期间各种治疗、基础护理、专科护理、护理病例书写、病情观察、用药治疗及健康教育的护理方式属于

- 选项：
- A. 临床路径
 - B. 功能制护理
 - C. 个案护理
 - D. 小组护理
 - E. 责任制护理

答案：E

解析：责任制护理是由责任护士和相应辅助护士按护理程序对病人进行全面、系统和连续的整体护理，要求从病人入院到出院均由责任护士对病人实行 8 小时在岗，24 小时责任制。

题型：A1 型题

题目：

下列患者资料中于主观资料的是

- 选项：
- A. 颈项强直
 - B. 头晕、麻木、乏力
 - C. 体温 39℃
 - D. 黄疸、发绀
 - E. 心脏杂音

答案：B

解析：主观资料是指病人的主诉，包括病人所感觉的、所经历的以及看到的听到的，想到的内容的描述，如头晕、麻木、乏力、瘙痒、恶心、疼痛等。

题型：A1 型题

题目：

患者，男，33 岁，炼钢工人，工作中不慎被烧伤度烧伤面积 60%应采用隔离方式是

- 选项：
- A. 接触隔离
 - B. 消化道隔离
 - C. 呼吸道隔离
 - D. 保护性隔离
 - E. 严密隔离

答案：D

解析：保护性隔离亦称为反向隔离。适用于抵抗力低下或极易感染的病人，如大面积烧伤、早产儿、白血病及脏器移植、免疫缺陷的病人等。

题型：A1 型题

题目：

肺炎患儿发热，医生跟家属说给予口服退热药，忘记下医嘱，护士未给患儿应用口服退热药，受到家的抱怨护因此指该医生，导致这次医护关系冲突的原因是

选项：

- A. 角色心理错位
- B. 角色理解欠缺
- C. 角色压力过重
- D. 角色权利争议
- E. 角色期望冲突

答案：B

解析：暂无解析。

题型：A1 型题

题目：

关于焦虑症的叙述正确的是

选项：

- A. 焦虑发作是先天的对可怕情景的条件反射
- B. 焦虑是害怕某些环境刺激所形成的条件反射
- C. 女性患病率明显低于男性
- D. 发作时紧张度与现实环境相符
- E. 焦虑人格特质与遗传无关

答案：B

解析：焦虑症患者病前常经历了较多的生活事件，病后又总担心结局不妙。在过分警觉的状态下容易对某些环境和任务产生错误认知而产生条件反射。焦虑并非实际威胁所引起，其紧张程度与现实情况很不相称。患者病前大多具有一定的素质基础或个性特征。

题型：A1 型题

题目：

患者，男，26 岁，因上呼吸道感染，遵医嘱服用磺胺类药物，护士嘱其多饮水的主要目的是

选项：

- A. 降低药物毒性
- B. 减少对胃的刺激
- C. 减少对胃脏损害
- D. 提高疗效
- E. 较少对肝脏损害

答案：A

解析：磺胺类药物为人工合成的抗菌药，在处理急性泌尿系统感染中有其重要价值。磺胺类药物服药后宜多饮水，以防因尿少而析出结晶，堵塞肾小管，故多饮水的目的是减少药物毒性。

题型：A1 型题

题目：

患者，男，68岁，使用热水袋过程中发现局部皮肤潮红，应采取的措施是
选项：

- A. 将水温调低
- B. 改用湿热敷
- C. 立即停用，局部涂甲紫
- D. 立即停用，局部涂液状石蜡
- E. 立即停用，局部涂凡士林

答案：E

解析：用热水袋过程中发现皮肤潮红，提示有烫伤的迹象，应立即停用，局部涂凡士林以保护皮肤。

题型：A1型题

题目：

对于强迫症患者，在其自愿参与下，要求患者在出现强迫动作前与护士沟通，可
选项：

- A. 减少诱发因素
- B. 改善错误的认知
- C. 建立护患关系
- D. 落实护理计划
- E. 减少和控制症状

答案：E

解析：护理强迫症患者时，鼓励患者出现强迫症状前及时向医护人员汇报，护士帮助其减少和控制症状。

题型：A1型题

题目：

患儿男，8岁。来院时表情痛苦、呼吸急促、面颊红、鼻扇动。这种面容表现为
选项：

- A. 甲亢面容
- B. 急性面容
- C. 慢性面容
- D. 脱水面容
- E. 贫血面容

答案：B

解析：面部因发热而两颊潮红，口唇疱疹，鼻翼扇动，烦躁不安为急性面容。常见于急性传染病，如疟疾、大叶性肺炎等。

题型：A1型题

题目：

患者沟通提问过程中，如果护士采用的是封团式提问其主要的优点是
选项：

- A. 患者就可以更好的述自己的观点
- B. 护士可以在短时间内获得需要的信息

- C. 护士可以获得更多资料
- D. 护士可以获得更加真实全面的资料
- E. 患者可以更加全面的介绍自己的情况

答案：B

解析：封闭式提问又称限制性提问，是将问题限制在特定的范围内，患者回答问题的选择性很小，可以通过简单的“是”“不是”“有”“无”等即可回答。其优点是护士可以在短时间内获得需要的信息；其缺点是患者没有机会解释自己的想法。

题型：A1 型题

题目：

不属于患者家属角色特征的是
选项：

- A. 患者护理计划实施的参与者
- B. 患者生活的照顾者
- C. 患者原有社会功能的替代者
- D. 患者的心理支持者
- E. 患者病痛的共同承受者

答案：E

解析：暂无解析。

题型：A1 型题

题目：

患者对护理工作的满意度属于
选项：

- A. 护理服务质量评价指标
- B. 终末质量评价指标
- C. 主观感受度评价指标
- D. 要素质量评价指标
- E. 环节质量评价指标

答案：B

解析：终末质量是指患者所得到的护理效果的质量。如皮肤压疮发生率、差错发生率、一级护理合格率及住院满意度、出院满意度等患者对护理服务的满意度调查结果等。

题型：A1 型题

题目：

细菌性肝肿最常见的早期症状为
选项：

- A. 寒战高热
- B. 肝区疼痛
- C. 黄疸
- D. 食欲减退
- E. 乏力

答案：A

解析：寒战和高热是细菌性肝脓肿最常见的早期症状，体温可高达 39~40℃，一般为稽留热或弛张热，伴多汗，脉率增快。

题型：A1 型题

题目：

肾结核的原发病灶大多在

选项：

- A. 骨
- B. 肺
- C. 肠
- D. 肝
- E. 脑

答案：B

解析：肾结核的病原菌主要是来自肺结核。

题型：A1 型题

题目：

甲亢患者的饮食正确的是

选项：

- A. 高纤维素饮食
- B. 高热量高蛋白饮食
- C. 茶、咖啡
- D. 海带、紫菜等海产品
- E. 卷心菜、甘蓝

答案：B

解析：甲亢患者应给予高热量、高蛋白、高脂肪、高维生素饮食，限制含纤维素高的食物，注意补充水分。禁止摄入刺激性的食物及饮料，如浓茶、咖啡等，以免引起病人精神兴奋。减少食物中粗纤维的摄入，以减少排便次数避免进食含碘丰富的食物，应食用无碘盐，忌食海带、紫菜等海产品，慎食卷心菜、甘蓝等易致甲状腺肿食物。

题型：A1 型题

题目：

急性呼吸窘迫综合征早期的病理变化不包括

选项：

- A. 肺间质水肿
- B. 肺泡萎陷
- C. 肺泡内透明膜形成
- D. 肺充血
- E. 肺泡纤维化

答案：E

解析：急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的病理变化不包括肺纤维化，其他四项为 ARDS 的早期病理变化

题型：A1 型题

题目:

患者,女,72岁,因脑梗死入院治疗,护士为其进行口腔护理前义齿应如何处理

选项:

- A. 放入盛有 30%酒精的杯子里
- B. 放入盛有 75%酒精的杯子里
- C. 放入干燥的密封盒内
- D. 放入盛有热水的杯子里
- E. 放入盛有冷水的杯子里

答案: E

解析:活动义齿用冷水冲洗刷净,待病人漱口后戴上或浸于清水中备用,义齿的清水应每日更换,义齿不可浸泡在乙醇或热水中以免变色、变形和老化。

题型: A1 型题

题目:

患者,男,50岁,在建筑工地干活时被一铁钉扎伤,医嘱予以破伤风肌内注射,以下正确的是

选项:

- A. 当皮丘周围有伪足痒感时可以判断为阳性
- B. 试验结果为阳性时,可做破伤风脱敏试验
- C. 破伤风皮试液的浓度是 1500IU/ml
- D. 试验结果为阳性时,余液 0.9ml 与皮试剩余剂量做肌内注射
- E. 当皮丘直径大于 1.5cm 时,红晕超过 4cm 可以判断为结果阳性

答案: E

解析:破伤风皮试液的浓度是每毫升含 TAT150IU 的生理盐水溶液;试验结果为阳性:采用脱敏注射法;试验结果为阴性:应将余液 0.9ml 与皮试剩余剂量做肌内注射;阳性:局部皮丘红肿,硬结,直径大于 1.5cm、红晕直径超过 4cm,有时出现伪足,有痒感。

题型: A1 型题

题目:

某患者住院期间因输入不合格血液导致乙型肝炎,其索赔对象应为

选项:

- A. 当地疾病控制中心
- B. 当地卫生计划行政部门
- C. 血站和医院
- D. 当地公安部门
- E. 执行输血操作的护士

答案: C

解析:《侵权责任法》第 59 条规定:因药品、消毒药剂、医疗器械的缺陷,或者输不合格的血液造成患者损害的,患者可以向生产者、血液提供机构或者医疗机构请求赔偿。

题型: A1 型题

题目:

患者,女,18岁。经期持续 10 天,量较多诊断为功能失调性子宫出血,给予口服大剂量己烯雌酚治疗,患者询问用药的目的,正确的解释是

选项:

- A. 促进女性生殖器官全面发育而止血
- B. 促进宫内膜迅速转化而止血
- C. 促进子宫内膜分泌期而止血
- D. 增强子宫平滑肌张力而减少出血
- E. 短期内修复子宫内膜创面而止血

答案: E

解析: 该患者 18 岁, 经期持续 10 天, 量较多, 无排卵性功血的可能性大。治疗给己烯雌酚(人工合成的非甾体雌激素物质)可迅速促使子宫内膜生长, 短期内修复创面而止血。

题型: A1 型题

题目:

心包穿刺术后护理不正确的是

选项:

- A. 穿刺部分盖无菌纱布
- B. 若有引流管做好引流管护理
- C. 密切观察生命体征
- D. 指导患者立即下床活动
- E. 每天心包抽液量 < 25ml 时拔除导管

答案: D

解析: 穿刺后 2 小时内继续心电、血压监测, 嘱病人卧床休息, 并密切观察生命体征变化。

题型: A1 型题

题目:

初乳是指

选项:

- A. 产后 7 天内分泌的乳汁
- B. 产后 10 天内分泌的乳汁
- C. 产后 5~14 天分泌的乳汁
- D. 产后 7~1 天分泌的乳汁
- E. 产后 14~28 天分泌的乳汁

答案: A

解析: 初乳是指产后 7 天内分泌的乳汁。初乳易于消化吸收, 有防御感染及利于排出胎粪的作用。

题型: A1 型题

题目:

患者, 男, 30 岁, 持续高热, 医嘱: 血培养, 化验的目的是

选项:

- A. 测定肝功能
- B. 测定血清酶
- C. 测定非蛋白氮含量
- D. 查找血液中的致病菌
- E. 测定电解质

答案：D

解析：患者持续高热，很可能体内有病原体入侵，血培养的目的是查找血液中的病原体。

题型：A1 型题

题目：

口服补液盐中加入葡萄糖的主要作用是

选项：

- A. 补充电解质
- B. 降低血清钾浓度
- C. 使口服补液盐具有一定的透压
- D. 增加肠道对水钠吸收
- E. 预防症酸中毒

答案：D

解析：基础医学研究证实，1%~2.5%的葡萄糖能促进水和钠最大限度吸收。

题型：A1 型题

题目：

患者，男，30岁。7小时前行阑尾切除术，现患者主诉下腹胀痛，护士观察其下腹膀胱区隆起，该患者最主要的护理问题是

选项：

- A. 便秘
- B. 有感染的危险
- C. 疼痛
- D. 尿潴留
- E. 体液过多

答案：D

解析：手术中使用麻醉剂可干扰排尿反射的进行，该患者下腹胀痛及下腹膀胱区隆起，说明患者发生了尿潴留。

题型：A1 型题

题目：

为休克患者留导尿管最主要的目的是

选项：

- A. 保持床单位清洁干燥，使患者舒适
- B. 引流尿液，促进有毒物质排出
- C. 收集尿标本，作细菌培养
- D. 避免尿液潴留在膀胱内
- E. 测尿量和尿比重，了解肾血流灌注情况

答案：E

解析：留置导尿管用于抢救危重、休克病人时能准确记录尿量，测量尿比重，以观察病情变化。

题型：A1 型题

题目：

护士给某乙肝患者拔针时不小心被粘该患者血液的针头刺伤，伤口的即刻处理方法不妥的是

选项:

- A. 按压止血
- B. 用肥皂液和流动水冲洗
- C. 尽可能挤出损伤处的血液
- D. 消毒后包扎伤口
- E. 用 75%乙醇或 0.5%碘伏消毒

答案: A

解析: 锐器伤紧急处理方法: 立即从伤口的近心端向远心端挤压, 禁止伤口局部按压, 肥皂水、流动水冲洗皮肤; 等渗盐水冲洗黏膜; 用 0.5%碘伏或 75%乙醇溶液消毒并包扎; 报告并写锐器伤登记表; 根据病人血液中毒菌的多少和伤口情况的评估, 做相应处理。

题型: A1 型题

题目:

患者, 男, 30 岁, 身高 170 厘米, 体重 56 千克, 双下肢瘫, 护士于 6 时 40 分为其翻身检查见全身皮肤状况良好。该患者下一次翻身时间是

选项:

- A. 8 时 40 分
- B. 10 时 40 分
- C. 9 时 40 分
- D. 10 时 10 分
- E. 9 时 10 分

答案: A

解析: 瘫痪病人长期卧床, 为避免局部组织长期受压, 协助病人经常更换卧位: 一般每 2 小时翻身一次, 必要时可将间隔时间缩短。

题型: A1 型题

题目:

某市血站工作人员, 在进行血液质检查时发现某献血者为艾滋病病人

选项:

- A. 6 小时内向当地卫生防疫机构上报传染病报告卡
- B. 48 小时内向当地卫生防疫机构上报传染病报告卡
- C. 4 小时内向当地卫生防疫机构上报传染病报告卡
- D. 24 小时内向当地卫生防疫机构上报传染病报告卡
- E. 12 小时内向当地卫生防疫机构上报传染病报告卡

答案: D

解析: 《传染病防治法》规定艾滋病属于乙类传染病, 乙类、丙类传染病病人、病原携带者或疑似传染病病人时, 应于 24 小时内报告发病地的卫生防疫机构。

题型: A1 型题

题目:

吸氧持续 1~2 天患者会发生氧中毒的最低氧浓度是

选项:

- A. 60%
- B. 30%

- C. 45%
- D. 50%
- E. 70%

答案：A

解析：当氧浓度高于 60%，持续时间超过 24 小时，会出现氧疗副作用。常见的副作用有氧中毒、肺不张等。

题型：A1 型题

题目：

采用燃烧法灭菌搪瓷类物品时，可加入乙醇的浓度是

选项：

- A. 35%
- B. 50%
- C. 65%
- D. 75%
- E. 95%

答案：E

解析：搪瓷类容器可倒少量 95%乙醇溶液，慢慢转动使之分布均匀，点火燃烧至熄灭，注意燃烧时不可中途添加乙醇，同时远离易燃易爆物品。

题型：A1 型题

题目：

某护士使用臭氧灭菌灯对空气进行消毒消毒结束后，隔时间多久人员方可进入

选项：

- A. 30min
- B. 60min
- C. 45min
- D. 90min
- E. 20min

答案：A

解析：臭氧灭菌灯消毒法常用于空气、医院污水、诊疗用水、物品表面的消毒，使用时应关闭门窗，人员须离开现场，消结束后 30 分钟方进人。

题型：A1 型题

题目：

轻型急性胰腺炎患者开始进食无脂低蛋白液食的时间为患者病后

选项：

- A. 3~5 天
- B. 不超过 12 小时
- C. 5~7 天
- D. 7 天以上
- E. 1~2 天

答案：A

解析：轻症胰腺炎经过 3~5 天禁食和胃肠减压，当临床症状好转后即可进食少量无脂流食。

题型：A1 型题

题目：

患者，男、72 岁。因“急性左心衰、心房颤动”动急诊收入院，输液过程中突然出现肺栓塞经抢救无效死亡，提出医疗事故鉴定申请。当地卫生行政部门应在当事人提出几日内移送上一级主管部门

选项：

- A. 21 天
- B. 14 天
- C. 3 天
- D. 7 天
- E. 10 天

答案：D

解析：卫生行政部门应当自接到医疗机构的报告或者当事人提出医疗事故争议处理申请之日起 7 日内移送上一级人民政府卫生行政部门处理。

题型：A1 型题

题目：

申请护士执业注册，应具备“具有完全民事行为能力”条件。申请年龄至少应在

选项：

- A. 16 周岁以上
- B. 17 周岁以上
- C. 18 周岁以上
- D. 19 周岁以上
- E. 20 周岁以上

答案：C

解析：护士执业注册年龄至少应在 18 周岁以上。

题型：A1 型题

题目：

一般儿童患者输液速度为每分钟

选项：

- A. 10~15 滴
- B. 20~40 滴
- C. 40~50 滴
- D. 50~60 滴
- E. 60~80 滴

答案：B

解析：一般成人 40~60 滴/分，儿童 20~40 滴/分

题型：A1 型题

题目：

患者，女，26 岁下肢急性淋巴管炎，查体见肢体肿胀明显，局部应擦拭药液是

选项：

- A. 0.1%碘伏
- B. 50%硫酸镁
- C. 外用生理盐水
- D. 3%过氧化氢
- E. 75%酒精

答案：B

解析：50%硫酸镁溶液属于高渗性溶液，利于肿胀组织内的液体流出，达到消肿的目的；对抗肿胀组织中 Ca^{2+} 对平滑肌的收缩作用，减少组织液的渗出。

题型：A1 型题

题目：

每小时一次的外文缩写是

选项：

- A. DC
- B. pc
- C. qh
- D. st
- E. ac

答案：C

解析：DC 停止；pc 饭后；st 立即；ac 饭前；qh 每 1 小时 1 次。

题型：A1 型题

题目：

患者，女，42 岁、肝硬化腹水、重度高血压，但水肿较轻，因此给予低盐饮食，每日食盐不超过

选项：

- A. 3g
- B. 0.5g
- C. 1g
- D. 2g
- E. 5g

答案：D

解析：肝硬化有腹水进水 $<1000\text{ml/d}$ 左右，限制盐在 $1-2\text{g/d}$

题型：A1 型题

题目：

患者，女，60 岁，确诊为急性呼吸窘综合征，给予面罩吸氧。为了使吸入氧能够达到 53% 需将氧流量调到

选项：

- A. 10L/min
- B. 6L/min
- C. 4L/min
- D. 8L/min
- E. 2L/min

答案：D

解析：吸氧浓度和氧流量换算公式：吸氧浓度（%）=21+4×氧流量（L/min）。

题型：A1 型题

题目：

输卵管妊娠最常见的破裂部位是

选项：

- A. 壶腹部
- B. 峡部
- C. 间质部
- D. 伞部
- E. 卵巢

答案：B

解析：输卵管妊娠破裂多见于6周左右输卵管峡部妊娠。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者，男，72岁，下肢瘫痪长期卧床。患者压疮部位受压皮肤紫红色、皮下硬结、表皮水疱，属于

选项：

- A. 淤血红润期
- B. 炎性浸润期
- C. 轻度溃疡期
- D. 重度溃疡期
- E. 坏疽期

答案：B

解析：炎性浸润期特点：受压皮肤紫红色、皮下硬结、表皮水疱。水疱极易破溃，显露潮湿红润创面，病人疼痛。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者，男，72岁，下肢瘫痪长期卧床。水疱直径在2cm以下，应采取以下哪种措施

选项：

- A. 自行吸收，减少摩擦
- B. 剪去水疱表皮，并包扎
- C. 用注射器抽吸水疱
- D. 按外科无菌换药法处理
- E. 3%的过氧化氢溶液冲洗

答案：A

解析：未破的小水疱：用无菌纱布包扎，减少摩擦，促进其自行吸收；大水疱：应用无菌注射器抽出水疱内液体（不可剪去表皮），涂消毒液后用无菌敷料包扎。浅度溃疡可按外科无菌换药法处理，溃疡较深引流不畅者，应用3%的过氧化氢溶液冲洗，抑制厌氧菌生长。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者，女，53岁。乳腺癌晚期，身体极度衰竭，卧床不起，情绪暴躁、无端发脾气。此时患者的心理反应是

选项：

- A. 否认期
- B. 接受期
- C. 协议期
- D. 忧郁期
- E. 愤怒期

答案：E

解析：暂无解析。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者，女，53岁。乳腺癌晚期，身体极度衰竭，卧床不起，情绪暴躁、无端发脾气。护理该患者时，不恰当的护理措施是

选项：

- A. 给予精神支持
- B. 允许患者表达不良情绪
- C. 防止患者的过激行为
- D. 劝患者不要轻易表达不良情绪
- E. 做好与家属的沟通

答案：D

解析：暂无解析。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者，女，37岁以“右上阵发性绞痛”收入院，诊断为胆石症。行总管切开取石术、T管引流术”。术后5天，引流液每天2000ml，提示

选项：

- A. 胆总管下段梗阻
- B. 胆汁量正常
- C. 胆汁量减少
- D. 肝功能衰竭
- E. T形管堵塞

答案：A

解析：胆汁引流一般每天约300~700ml，量多可能是胆总管下端不够通畅，量过少可能因T形管阻塞或肝功能衰竭所致。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者，女，37岁以“右上阵发性绞痛”收入院，诊断为胆石症。行总管切开取石术、T管引流术”。术后15天，管引流液清亮，约200ml/日，无腹痛胀试夹管24~36小时未出现不适，皮肤及巩膜黄疸消退，T管造影显示胆道通畅，针对患者目前状况可考虑的是

选项:

- A. 带 T 管出院
- B. 拔出 T 管
- C. 继续更换
- D. 继续保留 T 管 2 周
- E. 继续保留 T 管 1 周

答案: B

解析: 一般术后 12~14 天, 无特殊情况, 可以拔除 T 形管。拔管指征为: 黄疸消退, 无腹痛、发热, 大便颜色正常; 胆汁引流量逐渐减少, 颜色呈透明金黄色, 无脓液、结石, 无沉渣及絮状物, 就可以考虑拔管。拔管前先在饭前、饭后各夹管 1 小时, 拔管前 1~2 天全日夹管, 如无腹胀、腹痛、发热及黄疸等症状, 说明胆总管通畅, 可予拔管。

题型: A3/A4 型题

题目:

患者, 女, 25 岁, 患风湿性心脏瓣膜病。不明原因持续发热 1 月余, 体温波动在 37.5~38.5℃ 之间, 应用多种抗生素治疗无效, 今晨以“感染性心内膜炎”收住入院。遵医嘱行血培养检查。抽取血培养标本时间的选择, 正确的是

选项:

- A. 第 1 日间隔 1h 采血, 共 3 次, 体温升高时采血
- B. 第 1 日间隔采血, 共 3 次, 无需体温升高时采血
- C. 第 1 日间隔 1h 采血, 共 3 次, 寒战时采血
- D. 入院 3 小时内采血, 间隔 1h, 共 3 次
- E. 停用抗生素 2~7 天后采血, 无需体温升高时采血

答案: E

解析: 已用过抗生素病人, 应停药 2~7 天后采血。3. 急性感染心内膜炎病人应在入院后 3 小时内, 每隔 1 小时 1 次共取 3 个血标本后开始治疗 4. 每次取 10~20ml, 做培养, 至少应培养 3 周。

题型: A3/A4 型题

题目:

患者, 女, 25 岁, 患风湿性心脏瓣膜病。不明原因持续发热 1 月余, 体温波动在 37.5~38.5℃ 之间, 应用多种抗生素治疗无效, 今晨以“感染性心内膜炎”收住入院。入院后心脏彩超检查示二尖瓣大小约为 10mm×10mm 赘生物。护士最应预防和关注的是

选项:

- A. 心力衰竭
- B. 肺部感染
- C. 动脉栓塞
- D. 出血
- E. 深静脉血栓

答案: C

解析: 感染性心内膜炎患者瓣膜有赘生物脱落时可发生动脉栓塞, 可发生于机体的任何部位, 常见于脑、心、脾、肺、肾、肠系膜和四肢, 引起相应的症状, 应注意预防, 故 C 正确。

题型: A3/A4 型题

题目：

患者，男，70岁因“慢性咳嗽、咳痰20年，进行性呼吸困难3年，症状加重1周”拟诊“慢性阻塞性肺疾病、肺心病”收入院。导致COPD最常见的因是

选项：

- A. 吸烟
- B. 职业粉尘
- C. 大气污染
- D. 感染
- E. 蛋白酶-抗蛋白酶失调

104. A

解析：上述选项均为COPD的病因，其中吸烟为重要的发病因素。

题型：A3/A4型题

题目：

患者，男，70岁因“慢性咳嗽、咳痰20年，进行性呼吸困难3年，症状加重1周”拟诊“慢性阻塞性肺疾病、肺心病”收入院。提示患者并发右心衰的体征是

选项：

- A. 半坐卧位
- B. 双侧颈静脉充盈
- C. 双肺弥漫性湿啰音
- D. 眼睑浮肿
- E. 口唇发绀

答案：B

解析：右心衰竭主要表现为体循环静脉淤血，早期在身体的下垂部位和组织疏松部位，出现凹陷性水肿；颈静脉充盈怒张和肝颈静脉反流征阳性；肝大和肝压痛等。

题型：A3/A4型题

题目：

患者，男，70岁因“慢性咳嗽、咳痰20年，进行性呼吸困难3年，症状加重1周”拟诊“慢性阻塞性肺疾病、肺心病”收入院。指导患者腹式呼吸锻炼正确的是

选项：

- A. 每次进行30~60分钟
- B. 每分钟18~20次
- C. 吸气时间短，呼气时间长
- D. 吸气收腹，呼气挺腹
- E. 用鼻吸气，用鼻呼气

答案：C

解析：每日训练2次，每次10~15分钟，每次腹式呼吸锻炼重复8~10次；用鼻吸气，经口呼气；呼与吸时间比例为2:1~3:1，即吸气时间短、呼气时间长，吸气时腹肌放松、腹部鼓起，呼气时腹肌收缩、腹部下陷。

题型：A3/A4型题

题目：

患儿，15岁，以流行性脑脊髓炎普通型入院。该病的皮疹特点是

选项:

- A. 麻疹
- B. 丘疹
- C. 斑丘疹
- D. 麻疹
- E. 瘀斑点

答案: E

解析: 流行性脑脊髓膜炎简称流脑, 是由脑膜炎奈瑟菌(又称脑膜炎球菌)引起的急性化脓性脑膜炎。小儿发病率高, 经呼吸道传播。临床以起病急、突起高热、头痛、呕吐、皮肤黏膜瘀点、瘀斑及脑膜刺激征为主要表现。

题型: A3/A4 型题

题目:

患儿, 15 岁, 以流行性脑脊髓炎普通型入院。对于其密切接触的妹妹, 预防措施正确的是选项:

- A. 隔离观察 5 天
- B. 隔离观察 7 天
- C. 医学观察 5 天
- D. 医学观察 7 天
- E. 不需要观察

答案: D

解析: 对密切接触乙脑接触者, 应医学观察 7 天, 可遵医嘱给予磺胺甲噁唑药物。

题型: A3/A4 型题

题目:

初产妇, 29 岁既往月经规律, 妊娠 38 周, 门诊查体: 宫高在脐剑之间, 胎心 140 次/分。孕妇进行的最简便有效的判断胎儿安危的方法是

选项:

- A. 胎儿电子监护
- B. B 超
- C. 羊膜镜检查
- D. OCT 检查
- E. 胎动计数

答案: E

解析: 胎动计数是孕妇自我监护胎儿宫内情况的一种重要手段, 嘱孕妇每日早中晚各数 1 小时胎动, 每小时胎动数应不少于 3 次, 12 小时内胎动计数累计不得小于 10 次, 凡 12 小时内胎动计数小于 10 次, 或逐日下降大于 50% 而不能恢复者, 均应视为子宫胎盘功能不足, 胎儿有宫内缺氧, 应立即就诊。OCT 检查是用刺激宫缩测定胎儿心率, 测定胎儿的储备能力, 也称缩宫素激惹试验。

题型: A3/A4 型题

题目:

初产妇, 29 岁既往月经规律, 妊娠 38 周, 门诊查体: 宫高在脐剑之间, 胎心 140 次/分。该产妇自然分娩 1 小时在产房观察, 应注意

选项:

- A. 泌乳量
- B. 会阴切口
- C. 心理状态
- D. 体温
- E. 宫缩情况

答案: E

解析: 分娩后继续在产房内观察 2 小时, 应重点观察血压、脉搏、子宫收缩情况、宫底高度及阴道出血量等, 因为此阶段产妇易发生并发症, 最常见的是产后出血。

题型: A3/A4 型题

题目:

患者, 男, 43 岁。因胸部挤压伤收住院。查体左侧胸陷畸形, 左侧第 3~7 肋骨骨折, 右侧第 3~8 肋骨骨折。此时该患者的首要评估内容

选项:

- A. 疼痛是否可以耐受
- B. 生命体征是否平稳
- C. 体温是否异常
- D. 是否有药物过敏史
- E. 是否可以维持有效气体交换

答案: E

解析: 相邻多根、多处骨折因前后端失去支撑, 使该部胸廓软化, 产生反常呼吸运动, 对该患者应重点评估呼吸功能。

题型: A3/A4 型题

题目:

患者, 男, 43 岁。因胸部挤压伤收住院。查体左侧胸陷畸形, 左侧第 3~7 肋骨骨折, 右侧第 3~8 肋骨骨折。一般患者最易发生骨折的肋骨是

选项:

- A. 第 11~12 肋
- B. 第 7~10 肋
- C. 第 4~7 肋
- D. 第 4~5 肋
- E. 第 1~3 肋

答案: C

解析: 4~7 肋较长且固定, 最易骨折。

题型: A3/A4 型题

题目:

患者, 女, 40 岁, 孕 2 产 2。因月经过多半年就诊, 检查: 子宫如孕 12 周大, 呈单个结节, 血红蛋白 90g/L, 诊断为子宫肌瘤。关于子宫肌瘤的叙述错误的是

选项:

- A. 是一种卵巢激素依赖性肿瘤
- B. 肌瘤周围有假包膜覆盖

- C. 是女性生殖器中最常见的良性肿瘤
- D. 通常分为肌壁间肌瘤、浆膜下肌瘤、黏膜下肌瘤三类
- E. 肌瘤一般呈白色，质软

答案：E

解析：肌瘤切面灰白色，质地较子宫肌层硬。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者，女，40岁，孕2产2。因月经过多半年就诊，检查：子宫如孕12周大，呈单个结节，血红蛋白90g/L，诊断为子宫肌瘤。患者行子宫肌瘤切除术后1天，此时应为患者采取选项：

- A. 中凹卧位
- B. 右侧卧位
- C. 去枕平卧位
- D. 半坐卧位
- E. 左侧卧位

答案：D

解析：腹部手术后血压平稳可采取半坐卧位。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者，男，23岁。因情绪激动突然出现剧烈头痛、头晕，脑膜刺激征阳性。腰椎穿刺脑脊液为血性，初步诊断为蛛网膜下腔出血。明确蛛网膜下腔出血病因最有效检查方法是选项：

- A. 头部彩超
- B. 血管造影
- C. CT
- D. 脑脊液检查
- E. MRI

答案：B

解析：血管造影简称DSA是确诊蛛网膜下腔出血病因特别是颅内动脉瘤最有价值的诊断方法。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者，男，23岁。因情绪激动突然出现剧烈头痛、头晕，脑膜刺激征阳性。腰椎穿刺脑脊液为血性，初步诊断为蛛网膜下腔出血。观察患者时，下列哪一项提示为急性颅内压增高早期表现

选项：

- A. 脉快呼吸急促
- B. 脉快，血压低
- C. 脉快，压高
- D. 脉慢，呼吸慢，血压高
- E. 脉慢，血压低

答案：D

解析：颅内压增高早期代偿性出现血压升高，脉压增大，脉搏慢而有力，呼吸深而慢（“二慢一高”），称为 Cushing 反应。

题型：A3/A4 型题

题目：

1 岁女婴，出生史正常，喂养正常，现进行常规生长发育检查。幼儿，4 个月早期萌牙，出了几颗牙齿

选项：

- A. 2 颗
- B. 4 颗
- C. 6 颗
- D. 8 颗
- E. 10 颗

答案：A

解析：小儿 4~10 个月乳牙萌出；平均 6 个月。

题型：A3/A4 型题

题目：

1 岁女婴，出生史正常，喂养正常，现进行常规生长发育检查。该女的左手腕部 X 线片，可显示的骨化中心数量最多为

选项：

- A. 4 个
- B. 2 个
- C. 0 个
- D. 6 个
- E. 8 个

答案：B

解析：1~9 岁腕部骨化中心数目约为小儿岁数加 1，10 岁时出全。

题型：A3/A4 型题

题目：

患者，女，16 岁。急性阑尾炎住院治疗临近中考，因担心住院影响复习和考试，忧心忡忡，不能安心养，不利于身体康复。此时患者出现了角色适应中的

选项：

- A. 角色行为缺如
- B. 角色行为冲突
- C. 角色行为强化
- D. 角色行为消退
- E. 角色行为紊乱

答案：B

解析：角色行为冲突是指患者在适应患者角色过程中，与其原有的各种角色发生心理冲突而引起行为矛盾。因为病前角色所形成的心理过程、状态、个性特征及患病后对某种需要的迫切要求等强烈干扰患者对新角色的适应。

题型：A3/A4 型题

题目：

目前影响患者角色适应的主要因素是

选项：

- A. 医院制度
- B. 疾病的性质
- C. 症状的可见性
- D. 疾病的严重程度
- E. 患者的社会特征

答案：E

解析：角色行为冲突主要发生于由常态下的社会角色转向患者角色时。